

## 一、蕨類植物 PTERIDOPHYTES

### P1. 松葉蕨科 Psilotaceae

#### 松葉蕨屬 *Psilotum* Sw.

松葉蕨 Pine-leaved Fern, Fork Fern

*Psilotum nudum* (L.) Griseb.

習性：草本。

產地：扯旗山、布力徑、大潭。生於林下樹上或石壁上。

分佈：華東、華南及西南。全球亞熱帶地區。

用途：藥用。

### P2. 石杉科 Huperziaceae

#### 石杉屬 *Huperzia* Bernh.

華南石杉

†*Huperzia austrosinica* Ching

習性：草本。

產地：鳳凰山。

分佈：華南。

蛇足石杉（千層塔）

*Huperzia serrata* (Thunb.) Trev.

(*Lycopodium serratum* Thunb.)

習性：草本。

產地：大帽山、大東山。生於林下或溝谷石上。

分佈：東北、華中、華東、華南及西南。亞洲。

用途：藥用。

#### 馬尾杉屬 *Phlegmariurus* (Heter)

Holub

龍骨馬尾杉

†\**Phlegmariurus carinatus* (Desv.) Ching

習性：草本。

產地：栽培。

分佈：華南。東南亞。

華南馬尾杉

*Phlegmariurus fordii* (Baker) Ching

(*Lycopodium fordii* Baker)

習性：草本。

產地：大帽山、大東山。生於林下樹幹上或石壁上。

分佈：臺灣、福建、廣東、廣西、雲南。日本及越南。

## P3. 石松科 Lycopodiaceae

### 藤石松屬 *Lycopodium* Holub

藤石松（石子藤） Climbed clubmoss

*Lycopodium casuarinoides* (Spring)

Holub (*Lycopodium casuarinoides* Spring)

習性：藤本。

產地：大帽山、大埔滘、馬鞍山、大嶼山。生灌叢中。

分佈：臺灣、福建、湖北、華南及西南。熱帶亞洲。

用途：藥用。

### 小石松屬 *Lycopodiella* Holub

廣東小石松

*Lycopodiella carolinianum* (L.) Holub

(*Lycopodium carolinianum* L.)

習性：草本。

產地：沙田、黃泥涌、柏架山。生於林下濕地。

分佈：福建、廣東。

### 燈籠草屬 *Palhinhaea* A. Franco & Vasc.

鋪地蜈蚣（燈籠草） Nodding Clubmoss

*Palhinhaea cernua* (L.) A. Franco & Vasc.

(*Lycopodium cernuum* L.)

習性：草本。

產地：香港各地。生於草坡上。

分佈：華東、華南及西南。熱帶亞洲。

用途：藥用。

## P4. 卷柏科 Selaginellaceae

### 卷柏屬 *Selaginella* Beauv.

二形卷柏

†*Selaginella biformis* A. Br. ex Kuhn

習性：草本。

產地：扯旗山、大欖涌、大帽山、大嶼山。生於林下。

分佈：廣東、海南、福建。印度及東南亞。

毛枝卷柏

\**Selaginella braunii* Baker

習性：草本。

產地：栽培。

分佈：華東及西南。

### 綠毛卷柏

**Selaginella ciliaris** (Retz.) Spring  
(*Selaginella proniflora* auct. non Baker: Check List HK Pl. 1993.)  
習性：草本。  
產地：大帽山、大嶼山。  
分佈：臺灣。南亞及東南亞。

### 薄葉卷柏

**Selaginella delicatula** (Desv. ex Poir.) Alston  
(*Selaginella canaliculata* Baker;  
*Selaginella flabellata* Spring)  
習性：草本。  
產地：香港各地。生於林下。  
分佈：長江以南。越南及緬甸。

### 深綠卷柏

**Selaginella doederleinii** Hieron. (*Selaginella plumosa* Baker)  
習性：草本。  
產地：香港各地。生於林下。  
分佈：浙江、福建、臺灣、廣東、廣西、江西、湖南、貴州、四川和雲南。越南和日本。  
用途：藥用。

### 兗州卷柏

**Selaginella involvens** (Sw.) Spring  
習性：草本。  
產地：香港各地。生於疏林下。  
分佈：華東、華中、華南及西南。越南、緬甸和尼泊爾。  
用途：藥用。

### 地柏

\***Selaginella kraussiana** (Kunze) A. Br.  
習性：草本。  
產地：栽培。  
分佈：原產非洲。

### 細葉卷柏

**Selaginella labordei** Hieron. (*Selaginella tenera* Spring)  
習性：草本。  
產地：香港島、大埔滘、大嶼山。生於林下。  
分佈：西南、華中及華南。

### 江南卷柏

†**Selaginella moellendorffii** Hieron.  
習性：草本。  
產地：香港仔、薄扶林。生於林下。  
分佈：長江以南。越南。  
用途：藥用。

### 疏葉卷柏

**Selaginella remotifolia** Spring (*Selaginella semicordata* Spring)  
習性：草本。  
產地：香港島、大圍、大嶼山。生於林下濕地。  
分佈：福建、江西、四川。熱帶亞洲。

### 卷柏 (還魂草)

†**Selaginella tamariscina** (Beauv.) Spring  
習性：草本。  
產地：香港各地。生於乾旱岩壁上。  
分佈：全國各地。亞洲東部。

### 粗葉卷柏 Rough-leaved Spikemoss

**Selaginella trachyphylla** A. Br. (*Selaginella atroviridis* auct. non Spring: Check List HK Pl. 1993, p. p.)  
習性：草本。  
產地：香港島。生於林下。  
分佈：華南。越南。

### 翠雲草 Blue Selaginella, Rainbow Moss

**Selaginella uncinata** (Desv.) Spring  
習性：草本。  
產地：扯旗山。生於林下。  
分佈：浙江、福建、臺灣、廣東、廣西、湖南及西南。  
用途：藥用、觀賞。

### 劍葉卷柏

†**Selaginella xipholepis** Bak.  
習性：草本。  
產地：扯旗山。生於林下。

## P6. 木賊科 Equisetaceae

### 木賊屬 Equisetum L.

筆管草 (纖弱木賊) Frail Horsetail  
**Equisetum debile** Roxb. ex Vauch.

習性：草本。  
產地：扯旗山、大埔、烏蛟騰。生於溝邊。  
分佈：長江以南。南亞至東南亞。  
用途：藥用。

**節節草** (分枝木賊) *Ramose Scouring Rush*  
***Equisetum ramosissimum* Desf.**

習性：草本。  
產地：大帽山、大埔滘。生於溪邊或濕地。  
分佈：全國各地。東半球溫帶及亞熱帶。  
用途：藥用。

## P9. 箭蕨科 *Ophioglossaceae*

### 箭蕨屬 *Ophioglossum* L.

#### 卵葉箭蕨

***Ophioglossum pedunculatum* Desv.**  
習性：草本。  
產地：大潭、布力徑、扯旗山。生於林下。  
分佈：臺灣、華南及西南。熱帶亞洲。  
用途：藥用。

#### 心葉箭蕨

†***Ophioglossum reticulatum* L.**  
習性：草本。  
產地：白牛石。生於林下。  
分佈：臺灣、福建、江西、貴州、雲南和四川。朝鮮、日本、越南、馬來西亞、印度和南美洲。

#### 狹葉箭蕨

***Ophioglossum thermale* Kom.**  
(*Ophioglossum nudicaule* L. f.)  
習性：草本。  
產地：僅見一份標本，於一九〇六年採自灣仔以南河谷。生於林下。  
分佈：我國東北、河南、江蘇、陝西、江西、廣東、四川、雲南。朝鮮、日本和俄羅斯。  
用途：藥用。

## P11. 蓮座蕨科 *Angiopteridaceae*

### 蓮座蕨屬 *Angiopteris* Hoffm.

#### 福建蓮座蕨

\****Angiopteris fokiensis* Hieron.** (*Angiopteris  
evecta* auct. non Hoffm.: Check List  
HK Pl. 1993.)

習性：草本。  
產地：柏架山、黃泥涌。生於山谷。  
分佈：福建、湖北、貴州、廣東和廣西。  
用途：食用。

## P13. 紫萁科 *Osmundaceae*

### 紫萁屬 *Osmunda* L.

#### 狹葉紫萁

***Osmunda angustifolia* Ching**  
習性：草本。  
產地：香港島、沙田、大嶼山。生於山谷。  
分佈：臺灣、廣東和海南。

#### 粗齒紫萁

†***Osmunda banksiifolia* (C. Presl) Kuhn**  
習性：草本。  
產地：沙頭角。生於山溝邊。  
分佈：廣東、福建、臺灣、浙江。日本、菲律賓。

#### 紫萁

***Osmunda japonica* Thunb.** (*Osmunda regalis*  
auct. non L.: Check List HK Pl. 1993.)  
習性：草本。  
產地：城門。生於林下。  
分佈：秦嶺以南。朝鮮、日本和印度。

#### 粵紫萁

***Osmunda mildei* C. Chr.**  
習性：草本。  
產地：柏架山、大嶼山、大帽山。生於林下。  
分佈：香港特有。

#### 華南紫萁

***Osmunda vachelii* Hook.**  
習性：草本。  
產地：香港島、大帽山、大埔、大嶼山。生於山坡或溪邊。  
分佈：福建、廣東、廣西、貴州和雲南。越南、緬甸和印度。  
用途：觀賞。

## P14. 瘤足蕨科 Plagiogyriaceae

瘤足蕨屬 *Plagiogyria* (Kunze) Mett.

華南瘤足蕨

*Plagiogyria tenuifolia* Cop.

習性：草本。

產地：馬鞍山、大東山。生於林下濕地。

分佈：臺灣。

## P15. 裏白科 *Gleicheniaceae*

芒萁屬 *Dicranopteris* Bernh.

鐵芒萁

†*Dicranopteris linearis* (Burm. f.) Underw.

習性：草本。

產地：柏架山。

分佈：廣東、海南、雲南。南亞及東南亞。

芒萁

*Dicranopteris pedata* (Houtt.) Nakaike  
[*Dicranopteris dichotoma* Bernh;  
*Dicranopteris linearis* auct. non (Burm.  
f.) Underw.: Check List HK Pl. 1993.]

習性：草本。

產地：香港各地。生於山坡。

分佈：長江以南。日本、越南和印度。

用途：藥用。酸性土指示植物。

大羽芒萁

†*Dicranopteris splendida* (Hand.-Mazz.)  
Tagawa

習性：草本。

產地：扯旗山、大帽山、白芒、萬丈布。生於林緣。

分佈：海南、廣西和雲南。緬甸和越南。

裏白屬 *Diplopterygium* (Diels)  
Nakai

粵裏白

†*Diplopterygium cantonensis* (Ching) Nakai  
(*Gleichenia cantonensis* Ching)

習性：草本。

產地：香港島、大帽山、火炭。生於疏林下。

分佈：廣東。

中華裏白

†*Diplopterygium chinensis* (Ros.) DeVol

習性：草本。

產地：大嶼山、大帽山。生於溝邊或疏林下。

分佈：臺灣、福建、廣東、廣西、貴州及四川。越南。

裏白

*Diplopterygium glaucum* (Thunb. ex Houtt.)  
Nakai (*Hicriopteris glauca* Ching)

習性：草本。

產地：獅子山、柏架山、大帽山。生於疏林下。

分佈：長江以南。日本和印度。

## P17. 海金沙科 *Lygodiaceae*

海金沙屬 *Lygodium* Sw.

掌葉海金沙

*Lygodium conforme* C. Chr. (*Lygodium  
dichotomum* auct. non Sw.: Check List  
HK Pl. 1993.)

習性：攀援草本。

產地：鶴咀、青衣、青山。生於疏林下。

分佈：廣東、廣西、海南和雲南。越南。

曲軸海金沙

*Lygodium flexuosum* (L.) Sw.

習性：攀援草本。

產地：香港各地。生於林緣。

分佈：廣東、海南、廣西、貴州和雲南。越南、泰國、印度、馬來西亞及澳大利亞。

海金沙 Climbing Fern

*Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw.

習性：攀援草本。

產地：香港各地。生於林緣。

分佈：長江以南。日本、菲律賓、馬來西亞、印度和澳大利亞。

用途：藥用。

小葉海金沙

*Lygodium scandens* (L.) Sw.

習性：攀援草本。  
產地：香港各地。生灌叢中。  
分佈：臺灣、福建、廣東、海南、廣西及雲南。印度、緬甸和馬來西亞。

## P18. 膜蕨科 Hymenophyllaceae

### 假脈蕨屬 *Crepidomanes* Presl

#### 南洋假脈蕨

†*Crepidomanes bipunctatum* (Poir.) Cop.

習性：草本。  
產地：香港記錄。生於潮濕岩石上。  
分佈：臺灣、海南、廣東、雲南。廣佈于非洲東部、南亞、東南亞、日本、澳大利亞及新西蘭。

#### 邊內假脈蕨

*Crepidomenes intramarginale* (Hook. & Grev.) Cop. (*Trichomanes intramarginale* Hook. & Grev.)

習性：草本。  
產地：僅見一份標本，於一九〇六年採自柏架山。生於林下石上。  
分佈：廣東。斯里蘭卡。

#### 闊邊假脈蕨

*Crepidomanes latemarginale* (Eaton) Cop. (*Trichomanes latemarginale* Eaton)

習性：草本。  
產地：柏架山、聶高信山、大帽山。生於山谷石上。  
分佈：臺灣和廣東。越南、泰國和印度。

#### 長柄假脈蕨

*Crepidomanes racemosum* (van den Bosch) Ching (*Trichomanes orientale* auct. non C. Chr.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：草本。  
產地：僅見一份標本，於一九〇七年採自大帽山。生於林下樹幹或石上。  
分佈：華南及西南。越南和印度。

## 團扇蕨屬 *Gonocormus* van den Bosch

### 團扇蕨

*Gonocormus minutus* van den Bosch (*Trichomanes parvulum* auct. auct. non Baker: Check List HK Pl. 1993.)

習性：草本。  
產地：聶高信山。生於潮濕岩石上。  
分佈：東北、華東、華南及西南。俄羅斯、朝鮮、日本、越南、印度尼西亞和波利尼西亞。

### 細口團扇蕨

*Gonocormus nitidulus* (van den Bosch) Prantl

習性：草本。  
產地：大埔滘。  
分佈：臺灣。斯里蘭卡、越南、馬來西亞及澳大利亞。

## 膜蕨屬 *Hymenophyllum* Sm.

### 華南膜蕨

\**Hymenophyllum austrosinicum* Ching (*Hymnophyllum oxyodon* auct. non Baker: Check List HK Pl. 1993.)

習性：草本。  
產地：大帽山、馬鞍山。生於林下石上。  
分佈：臺灣、福建和廣東。

## 露蕨屬 *Mecodium* Presl

### 露蕨

*Mecodium badium* (Hook. & Grev.) Cop. (*Hymnophyllum javanicum* auct. non Baker: Check List HK Pl. 1993.)

習性：草本。  
產地：大嶼山、大帽山。生於林下石上。  
分佈：臺灣、福建、浙江、江西、安徽、湖南和廣東。朝鮮、日本、越南和印度。

### 小果露蕨

*Mecodium microsorum* (van den Bosch) Ching (*Hymnophyllum polyanthes* auct. non Sw.; *Hymnophyllum tenellum* auct. non Kuhn: Check List HK Pl. 1993.)

習性：草本。

產地：大嶼山、大帽山、馬鞍山。生於林下石上。

分佈：華東、華南及西南。日本、越南和緬甸。

### 長柄露蕨

†**Mecodium osmundoides** (van den Bosch)  
Ching

習性：草本。

產地：大嶼山、大帽山、八仙嶺。

分佈：華南及西南。中南半島至印度。

長筒蕨屬 **Selenodesmium** (Prantl)  
Cop.

### 華南長筒蕨

**Selenodesmium siamense** (Christ) Ching & C.  
H. Wang (*Trichomanes obscurum* auct.  
non Blume, *Trichomanes rigidum* auct.  
non Sw.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：草本。

產地：香港島、大帽山、九龍坑山、大埔滘、深涌。生於林下石上。

分佈：廣東、海南和廣西。越南和泰國。

瓶蕨屬 **Trichomanes** L.

### 瓶蕨

**Trichomanes auriculatum** Blume

習性：草本。

產地：僅見一份標本，於一九〇七年採自大帽山。生於溪邊樹幹上。

分佈：浙江、臺灣、江西、廣東、海南、廣西、雲南、貴州和四川。日本、馬來西亞、越南至印度。

### 華東瓶蕨

†\***Trichomanes orientale** C. Chr.

習性：草本。

產地：香港有記錄。生於溪邊岩石上。

分佈：華東、華南及西南。日本及朝鮮。

## P19. 蚌殼蕨科

### Dicksoniaceae

金毛狗屬 **Cibotium** Kaulf.

#### 金毛狗

**Cibotium barometz** (L.) J. Sm.

習性：樹形蕨類。

產地：香港各地。生於林下。

分佈：西南、華南及華東。日本、越南、緬甸、印度及馬來西亞。

用途：藥用和食用。熱帶、亞熱帶地區的酸性土指示植物。

## P20. 桫欏科 Cyatheaceae

木桫欏屬 **Alsophila** R. Br.

#### 刺桫欏

**Alsophila spinulosa** (Wall. ex Hook.) Tryon  
(*Cyathea spinulosa* Wall. ex Hook.)

習性：樹形蕨類。

產地：香港島、大嶼山、大帽山、大欖。生於溝谷。

分佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、貴州和四川。

黑桫欏屬 **Gymnosphaera** Blume

#### 細齒黑桫欏

†**Gymnosphaera hancockii** (Cop.) Ching  
[*Cyathea hancockii* Cop.;  
*Gymnosphaera denticulata* (Baker)  
Cop.]

習性：樹形蕨類。

產地：大帽山、東涌。生於溝谷林下。

分佈：臺灣、福建、江西和廣東。日本。

黑桫欏 Black Tree Fern

**Gymnosphaera podophylla** (Hook.) Cop.  
(*Cyathea podophylla* Cop.)

習性：樹形蕨類。

產地：石澳、清水灣、井欄樹。生於溝谷。

分佈：浙江、福建、臺灣、廣東、廣西和雲南。越南。

白桫欏屬 **Sphaeropteris** Bernh.

筆筒樹 Flying Spider Monkey Tree Fern

†\**Sphaeropteris lepifera* (J. Sm. ex Hook.)

Tryon (*Cyathea lepifera* Cop.)

習性：樹形蕨類。

產地：扯旗山（歸化）。生於溝谷林下。

分佈：臺灣。原產菲律賓。

用途：觀賞。

## P22. 碗蕨科 Dennstaedtiaceae

鱗蓋蕨屬 *Microlepia* Presl

華南鱗蓋蕨

*Microlepia hancei* Prantl

習性：草本。

產地：香港島、西貢。生於林下。

分佈：臺灣、廣東和廣西。越南。

虎克鱗蓋蕨

*Microlepia hookeriana* (Wall. ex Hook.)

Presl

習性：草本。

產地：薄扶林、紫羅蘭山、大帽山、馬鞍山。  
生於林下。

分佈：臺灣、福建、廣東、廣西和雲南。熱帶亞洲。

邊緣鱗蓋蕨

*Microlepia marginata* (Houtt.) C. Chr.

習性：草本。

產地：香港仔、大帽山。生於林下。

分佈：長江以南。日本和越南。

粗毛鱗蓋蕨

*Microlepia strigosa* (Thunb.) Presl

習性：草本。

產地：黃竹坑。生於林下。

分佈：東南沿海省區及四川、雲南。日本、菲律賓和馬來西亞。

## P23. 鱗始蕨科 Lindsaeaceae

鱗始蕨屬 *Lindsaea* Dry.

劍葉鱗始蕨（雙唇蕨）

*Lindsaea ensifolia* Sw. (*Schizoloma ensifolium* J. Sm.)

習性：草本。

產地：香港各地。生於山坡路邊。

分佈：臺灣、福建、廣東和雲南。熱帶亞洲至西南非洲。

異葉鱗始蕨（異葉雙唇蕨）

*Lindsaea heterophylla* Dry. (*Schizoloma heterophyllum* J. Sm.)

習性：草本。

產地：香港各地。生於山地。

分佈：臺灣、福建、廣東、廣西和雲南。菲律賓、越南、馬來西亞、緬甸、印度和斯里蘭卡。

團葉鱗始蕨

*Lindsaea orbiculata* (Lam.) Mett. ex Kuhn

習性：草本。

產地：香港各地。生於林下。

分佈：臺灣、福建、廣東、廣西、貴州及四川。亞洲及大洋洲熱帶地區。

烏蕨屬 *Stenoloma* Fée

闊片烏蕨

\**Stenoloma biflorum* (Kaulf.) Ching  
[*Sphenomeris chinensis* (L.) Maxon  
var. *littorale* auct. non (Tagawa) Ohwi:  
Check List HK Pl. 1993.]

習性：草本。

產地：赤柱、果洲群島。生於岸邊石上。

分佈：臺灣、福建和廣東。日本南部及菲律賓。

烏蕨（烏韭）

*Stenoloma chusanum* (L.) Ching  
[*Odontosoria chinensis* (L.) J. Sm.]

習性：草本。

產地：香港各地。生於灌叢中。

分佈：長江以南。日本、菲律賓至波利尼西亞及馬達加斯加。

用途：藥用。

## P25. 姬蕨科 Hypolepidaceae

姬蕨屬 *Hypolepis* Bernh.

姬蕨

*Hypolepis punctata* (Thunb.) Mett.

習性：草本。

產地：僅見一份標本，於一九〇七年採自大帽山。生於林下。

分佈：臺灣、福建、江西、浙江、安徽、廣東、雲南、四川和貴州。亞洲熱帶及亞熱帶地區。

## P26. 蕨科 Pteridiaceae

### 蕨屬 *Pteridium* Scop.

蕨 Bracken Fern

\**Pteridium aquilinum* var. *latiusculum* (Desv.) Underw. [*Pteridium aquilinum* auct. non (L.) Kuhn: Check List HK Pl. 1993.]

習性：草本。

產地：香港各地。生於林緣或山坡。

分佈：全國各地。熱帶及溫帶地區。

用途：藥用、食用。

## P27. 鳳尾蕨科 Pteridaceae

栗蕨屬 *Histiopteris* (Agardh) J. Sm.

栗蕨

*Histiopteris incisa* (Thunb.) J. Sm.

習性：草本。

產地：僅見一份標本，於一九七四年採自馬鞍山近烏溪沙。生於疏林下。

分佈：臺灣、福建、廣東、廣西和雲南。日本、越南、馬來西亞及非洲與美洲熱帶地區。

鳳尾蕨屬 *Pteris* L.

狹眼鳳尾蕨

*Pteris biaurita* L.

習性：草本。

產地：香港各地。生於林下。

分佈：臺灣、海南、廣東、廣西和雲南。熱帶地區。

條紋鳳尾蕨

*Pteris cadieri* Christ (*Pteris dimorpha* Cop.)

習性：草本。

產地：僅見一份標本，於一九一一年採自粉嶺。生於林下。

分佈：臺灣、福建、廣東、廣西、貴州和雲

南。日本和越南。

岩鳳尾蕨

*Pteris deltodon* Baker

習性：草本。

產地：僅見一份標本，於一九七五年採自馬鞍山河谷。生於石灰岩壁。

分佈：臺灣、廣西、貴州、四川、雲南。越南和日本。

刺齒鳳尾蕨

†\**Pteris dispar* Kunze [*Pteris semipinnata* var. *dispar* (Kunze) Hook. & Baker]

習性：草本。

產地：香港各地。生於疏林下。

分佈：長江以南。朝鮮、日本、菲律賓、馬來西亞和越南。

劍葉鳳尾蕨 Sword Brake

*Pteris ensiformis* Burm.

習性：草本。

產地：香港各地。生於林下。

分佈：華東、華南及西南。日本、越南、緬甸、印度、斯里蘭卡、馬來西亞至波利尼西亞。

用途：藥用和觀賞。

金釵鳳尾蕨

*Pteris fauriei* Hieron. (*Pteris quodriaurita* auct. non Retz.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：草本。

產地：柏架山、南丫島。生於林下。

分佈：浙江、福建、臺灣、江西、湖南、廣東、廣西和雲南。日本和越南。

疏裂鳳尾蕨

\**Pteris finotii* Christ (*Pteris excelsa* auct. non Gaudich.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：草本。

產地：南涌、梧桐寨。生於林下。

分佈：廣東、海南和雲南。越南。

林下鳳尾蕨

**Pteris grevilleana** Wall. ex Agardh

習性：草本。

產地：北大刀岩、馬鞍山。生於林下。

分佈：臺灣、廣東、海南、廣西和雲南。日本、越南、泰國、印度、尼泊爾和馬來西亞。

**全緣鳳尾蕨** Conspicuous Brake

**Pteris insignis** Mett. ex Kuhn

習性：草本。

產地：大帽山、馬鞍山、大東山、雞公山。生於溝谷林下。

分佈：長江以南。越南和馬來西亞。

**線羽鳳尾蕨**

†\***Pteris linearis** Poir.

習性：草本。

產地：石澳。生於林下。

分佈：臺灣、廣東、海南、廣西、貴州和雲南。熱帶亞洲和馬達加斯加。

**井欄邊草** Chinese Brake

**Pteris multifida** Poir.

習性：草本。

產地：香港各地。

分佈：秦嶺以南。日本、菲律賓和越南。

用途：藥用。

**斜羽鳳尾蕨**

†**Pteris oshimensis** Hieron.

習性：草本。

產地：大鴉洲。生於林下。

分佈：廣東、廣西及雲南。越南及日本。

**半邊旗**

**Pteris semipinnata** L.

習性：草本。

產地：香港各地。生於林下。

分佈：長江以南。日本、越南、馬來西亞、斯里蘭卡和印度。

用途：藥用。

**蜈蚣草** Ladder Brake

**Pteris vittata** L. (*Pteris longifolia* auct. non

L.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：草本。

產地：香港各地。生於鈣質土。

分佈：秦嶺以南。東半球熱帶、亞熱帶地區。

用途：藥用。

## P28. 鹵蕨科 Acrostichaceae

### 鹵蕨屬 Acrostichum L.

**鹵蕨** Leather Fern

**Acrostichum aureum** L.

習性：草本。

產地：米埔、大水坑、黃泥涌峽、沙田、西貢。生於海岸泥灘。

分佈：廣東、海南和雲南。全球熱帶地區。

## P29. 光葉藤蕨科

### Stenochlaenaceae

#### 光葉藤蕨屬 Stenochlaena J. Sm.

**光葉藤蕨** Palustral Vine Fern

†\***Stenochlaena palustris** (Burm.) Bedd.

習性：攀援。

產地：米埔、沙洲。生於疏林中濕地。

分佈：海南和雲南。亞熱帶地區。

## P30. 中國蕨科

### Sinopteridaceae

#### 粉背蕨屬 Aleuritopteris Fée

**粉背蕨**

†**Aleuritopteris farinosa** (Forsk.) Fée

習性：草本。

產地：大帽山。生於牆壁上。

分佈：福建、廣東、廣西、江西、湖南、四川和雲南。老撾、緬甸、印度、伊朗、阿富汗及非洲與南美洲。

#### 碎米蕨屬 Cheilosoria Trev.

**毛軸碎米蕨**

†**Cheilosoria chusana** (Hook.) Ching & K. H.

Shing

習性：草本。

產地：西貢、摩星嶺。生於林下。

分佈：秦嶺以南。日本、菲律賓和越南。

### 碎米蕨

**Cheilosoria mysurensis** (Wall. ex Hook.)  
Ching & K. H. Shing (*Cheilanthes*  
*mysurensis* auct. non Wall : Check List  
HK Pl. 1993.)

習性：草本。

產地：大尾篤、西貢大灘。生於灌叢下或溪邊。

分佈：臺灣、福建、廣東、海南。熱帶亞洲。

### 薄葉碎米蕨

**Cheilosoria tenuifolia** (Burm.) Trev.  
(*Cheilanthes tenuifolia* Sw.)

習性：草本。

產地：香港各地。生於山坡村邊。

分佈：臺灣、福建、廣東、海南、廣西和雲南。熱帶亞洲。

### 烏軸蕨屬 *Dorypteris* J. Sm.

#### 烏軸蕨

**Dorypteris concolor** (Langsd. & Fisch.)  
Kuhn

習性：草本。

產地：僅見一份標本，於一九〇六年採自大鵬灣。生於林下。

分佈：臺灣、海南、廣東和廣西。全球熱帶地區。

### 隱囊蕨屬 *Notholaena* R. Br.

#### 隱囊蕨

**Notholaena hirsuta** (Poir.) Desv.  
(*Cheilanthes hirsuta* Desv.)

習性：草本。

產地：石澳、蠔涌、龍鼓灘、蒲台島。生河溪邊。

分佈：臺灣、福建、廣東和廣西。熱帶亞洲及波利尼西亞。

### 金粉蕨屬 *Onychium* Kaulf.

日本金粉蕨 Japanese Claw Fern

**Onychium japonicum** (Thunb.) Kunze

習性：草本。

產地：香港仔、赤柱、大嶼山。生於林下。

分佈：秦嶺以南。日本、菲律賓、印度尼西亞、波利尼西亞。

用途：藥用。

## P31. 鐵線蕨科 *Adiantaceae*

### 鐵線蕨屬 *Adiantum* L.

鐵線蕨 Maidenhair

**Adiantum capillus-veneris** L.

習性：草本。

產地：香港各地。生於鈣質土。

分佈：秦嶺以南。全球溫帶地區。

用途：藥用、觀賞。

鞭葉鐵線蕨 Walking Maidenhair

**Adiantum caudatum** L.

習性：草本。

產地：九龍城、烏石角、大嶼山。生於林下。

分佈：臺灣、福建、廣東、海南、廣西、貴州和雲南。亞洲熱帶及亞熱帶地區。

#### 扇葉鐵線蕨

**Adiantum flabellulatum** L.

習性：草本。

產地：香港各地。生於陽光充足的山坡。

分佈：長江以南。日本、馬來西亞、越南、印度和斯里蘭卡。

用途：藥用。酸性土指示植物。

#### 南洋鐵線蕨

†**Adiantum malesianum** Ghatak

習性：草本。

產地：香港各地。生於灌叢下。

分佈：華南及西南。馬來西亞、越南、泰國、緬甸、印度和斯里蘭卡。

半月鐵線蕨 (菲島鐵線蕨) Philippine Maidenhair

**Adiantum philippense** L. (*Adiantum lunulatum* Burm.)

習性：草本。

產地：香港仔、城門、沙田。生於林下。

分佈：臺灣、廣東、海南、廣西、貴州、雲南和四川。亞洲熱帶及亞熱帶地區。

## P32. 水蕨科 Parkeriaceae

水蕨屬 *Ceratopteris* Brongn.

水蕨 Floating Fern, Water Fern

*Ceratopteris thalictroides* (L.)  
Brongn. [*Ceratopteris siliquosa* Cop.]

習性：草本。

產地：荔枝莊、深涌、三桠村、蒲台島、大鵬灣平洲、錦田、船灣。生於水田或濕地。

分佈：長江以南。熱帶及亞熱帶地區。

用途：藥用、食用。

## P33. 裸子蕨科 Hemionitidaceae

粉葉蕨屬 *Pityrogramma* Link

粉葉蕨 Silver Fern

†\**Pityrogramma calomelanos* (L.) Link.  
(*Pityrogramma tartarea* auct. non  
Maxon: Check List HK Pl. 1993.)

習性：草本。

產地：北角、油麻地、粉嶺。生於林緣。

分佈：臺灣、海南和雲南。熱帶地區。

用途：觀賞。

## P35. 書帶蕨科 Vittariaceae

書帶蕨屬 *Vittaria* Sm.

書帶蕨

*Vittaria flexuosa* Fée (*Vittaria lineata* auct.  
non Sm.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：草本。

產地：大帽山、鳳凰山。生於樹幹上或岩石上。

分佈：長江以南。日本、越南、尼泊爾和印度。

## P36. 蹄蓋蕨科 Athyriaceae

短腸蕨屬 *Allantodia* R. Br.

邊生短腸蕨

†*Allantodia contermina* (Christ) Ching

習性：草本。

產地：香港有記錄。生於林下。

分佈：華南及西南。越南和日本。

膨大短腸蕨

†\**Allantodia dilatata* (Blume) Ching  
(*Asplenium latifolium* Don; *Diplazium crinipes* Ching)

習性：草本。

產地：大帽山。生於林下。

分佈：臺灣、福建、華南及西南各省區。東南亞至波利尼西亞。

闊葉短腸蕨

*Allantodia matthewii* (Cop.) Ching  
(*Asplenium matthewii* Cop.)

習性：草本。

產地：大帽山、大東山。生於林下。

分佈：福建、廣東、廣西和雲南。越南。

江南短腸蕨

*Allantodia metteniana* (Miq.) Ching  
(*Athyrium japonicum* auct. non (Thbg.)  
Cop.: Check List HK Pl. 1993 p.p.,  
*Diplazium mettenianum* (Miq.) C.  
Chr.)

習性：草本。

產地：跑馬地、大帽山、馬鞍山、大東山、鳳凰山。生於林下。

分佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州和四川。日本和越南。

淡綠短腸蕨

*Allantodia virescens* (Kunze) Ching

習性：草本。

產地：柏架山、大帽山。生於林下。

分佈：長江以南。越南和日本。

假蹄蓋蕨屬 *Athyriopsis* Ching

假蹄蓋蕨

*Athyriopsis japonica* (Thunb.) Ching  
(*Athyrium japonicum* (Thunb.) Cop.;  
*Lunathyrium japonicum* (Thunb.);  
*Lunathyrium conilii* Kurata)

習性：草本。

產地：香港各地。生於林下。

分佈：長江以南。朝鮮和日本。

毛軸假蹄蓋蕨

\***Athyriopsis petersenii** (Kunze) Ching  
[*Athyrium japonica* auct. non (Thunb.)  
Cop. : Check List HK Pl.1993.]

習性：草本。

產地：扯旗山、黃竹坑、大帽山。生於林下。

分佈：長江以南。日本、東南亞。

菜蕨屬 *Callipteris* Bory

菜蕨

**Callipteris esculenta** (Retz..) J. Sm.  
[*Athyrium esculentum* (Retz.)Cop.]

習性：草本。

產地：香港仔。生於潮濕處。

分佈：臺灣、福建、廣東、海南、廣西和雲南。亞洲及大洋洲熱帶地區。

用途：食用。

雙蓋蕨屬 *Diplazium* Sw.

雙蓋蕨 Twin-sorus Fern

**Diplazium donianum** (Mett.) Tard.-Blot  
[*Athyrium bantamense* auct. non Milde:  
Check List HK Pl. 1993.)

習性：草本。

產地：黃泥涌、東涌。生於林下。

分佈：臺灣、福建、廣東、廣西和雲南。印度、越南、馬來西亞和日本。

馬鞍山雙蓋蕨

**Diplazium maonense** Ching [*Athyrium pinnatum* auct. non (Blanco) Cop.:  
Check List HK Pl. 1993.]

習性：草本。

產地：聶高信山、鳳凰山、馬鞍山。生於林下。

分佈：福建。

毛子蕨屬 *Monomelangium* Hayata

毛子蕨

**Monomelangium pullingeri** (Baker) Tagawa  
[*Athyrium pullingeri* (Baker) Cop.]

習性：草本。

產地：大帽山、馬鞍山。生於林下。

分佈：廣東、海南、福建和臺灣。東南亞。

單葉雙蓋蕨屬 *Triblemma* (J. Sm.)

Ching

單葉雙蓋蕨

**Triblemma lancea** (Thunb.) Ching [*Athyrium lanceum* (Thunb.) Milde]

習性：草本。

產地：香港各地。生於林下。

分佈：西南、華南及東南。亞洲東南部及南部。

裂葉雙蓋蕨

**Triblemma zeylanica** (Hook.) Ching  
[*Asplenium zeylanicum* Hook.]

習性：草本。

產地：僅見一份標本，於一九〇七年採自堅道。生於溪邊石上。

分佈：臺灣、福建、廣東、廣西、海南、四川和湖南。日本、東南亞和斯里蘭卡。

P38. 金星蕨科

**Thelypteridaceae**

星毛蕨屬 *Ampelopteris* Kunze

星毛蕨

†**Ampelopteris prolifera** (Retz.) Cop.

習性：草本。

產地：洲頭。生於疏林下、路旁。

分佈：華南及西南。亞洲及非洲熱帶地區。

毛蕨屬 *Cyclosorus* Link

漸尖毛蕨

**Cyclosorus acuminatus** (Houtt.) Nakai

習性：草本。

產地：香港各地。生於林下或路旁。

分佈：秦嶺以南。朝鮮、日本和越南。

乾旱毛蕨

**Cyclosorus aridus** (Don) Tagawa

習性：草本。

產地：香港各地。生於林下或路旁。

分佈：華東、華南及西南。東南亞、印度和尼泊爾。

齒牙毛蕨

†**Cyclosorus dentatus** (Forssk.) Ching

習性：草本。

產地：大帽山。生於山谷濕地。

分佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、雲南和貴州。越南、泰國、緬甸、印度和熱帶美洲等地。

#### 異子毛蕨

**Cyclosorus heterocarpus** (Blume) Ching

習性：草本。

產地：香港各地。生於山谷。

分佈：廣東和海南。東南亞。

#### 間斷毛蕨

**Cyclosorus interruptus** (Willd.) H. Ito  
(*Cyclosorus gongylodes* Link)

習性：草本。

產地：香港各地。生濕地。

分佈：臺灣、福建、江西、廣東、海南和廣西。南亞、東南亞至波利尼西亞。

#### 寬羽毛蕨

**Cyclosorus latipinnus** (Benth.) Tard.-Blot

習性：草本。

產地：香港各地。生於山谷或溪邊。

分佈：福建、廣東、海南、廣西。亞洲東南部。

#### 華南毛蕨

**Cyclosorus parasiticus** (L.) Farw.

習性：草本。

產地：香港各地。生於林緣或路旁。

分佈：臺灣、福建、湖南、廣東、海南、廣西、貴州和四川。全球熱帶地區。

#### 聖蕨屬 *Dictyocline* Moore

##### 聖蕨

**Dictyocline wilfordii** (Hook.) J. Sm.  
(*Dictyocline griffithii* auct. non Moore:  
Check List HK Pl. 1993.)

習性：草本。

產地：大帽山、大東山、鳳凰山。生於林下。

分佈：浙江、臺灣、福建、廣東、廣西、貴州、雲南和四川。越南和日本。

針毛蕨屬 *Macrothelypteris* (H. Ito)  
Ching

##### 普通針毛蕨

**Macrothelypteris torresiana** (Gaudich.)  
Ching (*Dryopteris setigera* C. Chr.)

習性：草本。

產地：香港各地。生於山谷濕地。

分佈：長江以南。熱帶亞洲。

金星蕨屬 *Parathelypteris* (H. Ito)  
Ching

##### 鈍頭金星蕨

†**Parathelypteris angulariloba** (Ching)  
Ching

習性：草本。

產地：扯旗山。生於林下。

分佈：福建、廣東和廣西。日本。

##### 金星蕨

**Parathelypteris glanduligera** (Kunze) Ching  
[*Dryopteris gracilescens* (Blume)  
Kuntze; *Lastrea thelypteris* auct. non  
(L.) Bory : Check List HK Pl.1993.]

習性：草本。

產地：扯旗山、歌賦山、柏架山、大埔滘。  
生於林下。

分佈：長江以南。朝鮮、日本至印度。

##### 新月蕨屬 *Pronephrium* Presl

##### 新月蕨

\***Pronephrium aspera** (Presl) Shieh & Tsai  
[*Cyclosorus urophyllus* auct. non Cop.:  
Check List HK Pl. 1993.]

習性：草本。

產地：柏架山、大帽山、青山。生於林下。

分佈：臺灣、廣東、廣西和雲南。熱帶亞洲。

##### 紅色新月蕨

†**Pronephrium lakhimpurens** (Ros.) Holtt.

習性：草本。

產地：大帽山。

分佈：福建、江西、廣東、廣西、四川及雲南。印度、泰國及越南。

### 微紅新月蕨

**Pronephrium sampsoni** (Baker) Ching  
[*Cyclosorus sampsoni* (Baker) Donk;  
*Pronephrium megacuspe* (Baker)  
Holtum]

習性：草本。

產地：大帽山、八仙嶺。生於山谷。

分佈：福建、廣東、廣西和雲南。日本、越南和泰國。

### 單葉新月蕨

**Pronephrium simplex** (Hance)  
Holt. [*Cyclosorus simplex* (Hook.)  
Cop.]

習性：草本。

產地：香港各地。生於山谷。

分佈：臺灣、福建、廣東、海南、廣西和雲南。越南。

### 三羽新月蕨

**Pronephrium triphyllum** (Sw.) Holt.  
[*Cyclosorus triphyllum* (Sw.) Cop.]

習性：草本。

產地：北大刀崩。生於林下。

分佈：臺灣、福建、廣東、廣西和雲南。

### 假毛蕨屬 *Pseudocyclosorus* Ching

#### 溪邊假毛蕨

**Pseudocyclosorus ciliatus** (Wall.) Ching  
(*Lastrea calcarata* Moore)

習性：草本。

產地：香港各地。生於溪邊。

分佈：廣東、海南、廣西、貴州和雲南。東南亞及南亞。

#### 鐮片假毛蕨

**Pseudocyclosorus falcilobus** (Hook.) Ching  
(*Lastrea falciloba* Hook.)

習性：草本。

產地：大帽山。生於山谷溪邊。

分佈：華東及華南。日本、中南半島及印度。

#### 普通假毛蕨

**Pseudocyclosorus subochthodes** (Ching)

Ching [*Pseudocyclosorus esquirolii*  
auct. non (Christ) Ching; *Lastrea*  
*esquirolii* (Christ) Copel.]

習性：草本。

產地：大帽山、火炭。生於林下。

分佈：長江以南。朝鮮、日本至印度。

### 假毛蕨

†**Pseudocyclosorus tylodes** (Kunze) Ching

習性：草本。

產地：大帽山。

分佈：華南及西南。南亞至中南半島。

## P39. 鐵角蕨科 *Aspleniaceae*

### 鐵角蕨屬 *Asplenium* L.

#### 合生鐵角蕨

**Asplenium adnatum** Cop.

習性：草本。

產地：僅見一份標本，於一九〇七年採自大帽山。生於溪邊。

分佈：廣東。

#### 華南鐵角蕨 South China Spleenwort

**Asplenium austrochinense** Ching (*Asplenium*  
*wilfordii* auct. non. Mett. ex Kuhn.:  
Check List HK Pl. 1993.)

習性：草本。

產地：大帽山、大東山。生於林下。

分佈：長江以南。越南。

#### 齒果鐵角蕨

**Asplenium cheilosorum** Kunze ex Mett.

習性：草本。

產地：柏架山、大帽山。生於林下。

分佈：臺灣、福建、海南、廣西及西南各省。  
日本、東南亞、南亞。

#### 毛軸鐵角蕨

**Asplenium crinicaule** Hance

習性：草本。

產地：香港島、大帽山。生於林下。

分佈：江西、廣東、海南、廣西、雲南、貴州和四川。南亞、東南亞至澳大利亞。

### 劍葉鐵角蕨

**Asplenium ensiforme** Wall. ex Hook. & Grev.  
(*Asplenium holosorum* Christ)

習性：草本。

產地：大帽山。生於林下。

分佈：臺灣、廣東、廣西、湖南、四川、貴州、雲南和西藏。印度、尼泊爾、斯里蘭卡至日本。

### 鎌葉鐵角蕨

**Asplenium falcatum** Lam. (*Asplenium macrophyllum* auct. non Sw: Check List HK Pl. 1993.)

習性：草本。

產地：香港島、大嶼山、青山、赤洲。生於林下。

分佈：雲南、貴州、廣東、海南和臺灣。南亞、東南亞至波利尼西亞及南非。

### 厚葉鐵角蕨

†**Asplenium griffithianum** Hook.

習性：草本。

產地：梧桐寨。生於林中、溪邊石上。

分佈：臺灣、福建、湖南、華南、西南。印度、緬甸、越南至日本。

### 大羽鐵角蕨

**Asplenium neolaserpitifolium** Tard.-Blot & Ching (*Asplenium cuneatum* Lam., p.p.)

習性：草本。

產地：香港有記錄。生於林中、溪邊石上。

分佈：臺灣、海南、雲南。日本南部至越南、印度及馬來西亞。

### 倒掛鐵角蕨

**Asplenium normale** Don

習性：草本。

產地：香港島、馬鞍山。生於林下。

分佈：長江以南。南亞、東南亞、日本、夏威夷及馬達加斯加。

### 長葉鐵角蕨

**Asplenium prolongatum** Hook. (*Asplenium rutaefolium* Kunze)

習性：草本。

產地：香港各地。生樹上及石上。

分佈：長江以南。日本、朝鮮、印度、斯里蘭卡、緬甸、越南及斐濟群島。

用途：觀賞。

### 假大羽鐵角蕨

†**Asplenium pseudolaserpitifolium** Ching

習性：草本。

產地：香港島、梧桐寨。生於林下。

分佈：臺灣、廣東、海南、廣西和雲南。印度至東南亞。

### 半邊鐵角蕨

**Asplenium unilaterale** Lam. (*Asplenium resectum* Smith)

習性：草本。

產地：大帽山。生於林下。

分佈：長江以南。熱帶亞洲及東非。

### 翅柄鐵角蕨

**Asplenium wrightii** Eaton ex Hook.

習性：草本。

產地：大帽山、馬鞍山。生於溪旁。

分佈：長江以南。越南及日本。

## 巢蕨屬 *Neottopteris* J. Sm.

巢蕨 Bird-nest Fern

**Neottopteris nidus** (L.) J. Sm. (*Asplenium nidus* L.)

習性：草本。

產地：柏架山、鶴咀、大潭、大鵬灣。生於樹上或石上。

分佈：臺灣、廣東、廣西和雲南。菲律賓、越南和馬來西亞。

## P42. 烏毛蕨科 *Blechnaceae*

### 烏毛蕨屬 *Blechnum* L.

烏毛蕨

**Blechnum orientale** L.

習性：草本。

產地：香港各地。生於疏林下。

分佈：長江以南。南亞及東南亞。

### 蘇鐵蕨屬 *Brainea* J. Sm.

蘇鐵蕨 Cycad-fern

*Brainea insignis* (Hook.) J. Sm.

習性：草本。

產地：香港各地。生山坡草地或灌叢。

分佈：臺灣、福建、廣東、海南、廣西和雲南。印度及東南亞。

用途：觀賞。

### 崇澗蕨屬 *Chieniopteris* Ching

崇澗蕨

*Chieniopteris harlandii* (Hook.) Ching  
(*Woodwardia harlandii* Hook.)

習性：草本。

產地：柏架山、大帽山。生於山谷。

分佈：臺灣、福建、廣東、海南、廣西和湖南。越南和日本。

裂羽崇澗蕨

†*Chieniopteris kempii* (Cop.) Ching  
(*Woodwardia harlandii* auct. non Hook:  
Check List HK Pl. 1993, p. p.)

習性：草本。

產地：僅見一份標本，於一八九九年採自大帽山。生於林下。

分佈：臺灣、福建、廣東和廣西。日本。

### 狗脊屬 *Woodwardia* Smith

狗脊 Japanese Chain Fern

*Woodwardia japonica* (L. f.) J. Sm.

習性：草本。

產地：香港島、大帽山。生於疏林下。

分佈：長江以南。朝鮮和日本。

用途：藥用。

東方狗脊

*Woodwardia orientalis* Sw.

習性：草本。

產地：扯旗山、沙頭角、大帽山、馬鞍山。生於山坡。

分佈：臺灣、福建、江西和廣東。日本和菲律賓。

芽珠狗脊。

†*Woodwardia prolifera* Hook. & Arn.

習性：草本。

產地：河背水塘。

分佈：華東及華南。日本。

頂芽狗脊

†*Woodwardia unigemimata* (Makino) Nakai

習性：草本。

產地：香港有記錄。

分佈：秦嶺以南。日本經東南亞至南亞。

## P45. 鱗毛蕨科

### Dryopteridaceae

芒蕨屬 *Arachniodes* Blume

中華芒蕨

†*Arachniodes chinensis* (Ros.) Ching

習性：草本。

產地：扯旗山、梧桐寨。生於林下。

分佈：長江以南。越南和日本。

芒蕨

*Arachniodes exilis* (Hance) Ching [*Rumohra aristata* auct. non (Forst) Ching:  
Check List HK Pl. 1993.]

習性：草本。

產地：梧桐寨。生於林下。

分佈：長江以南。

黑鱗芒蕨

†*Arachniodes nigrospinosa* (Ching) Ching

習性：草本。

產地：大帽山。生於林下。

分佈：華南。

斜方芒蕨

\**Arachniodes rhomboidea* (Wall. ex Mett.)  
Ching [*Rumohra amabilis* auct. non  
(Blume) Ching: Check List HK Pl.  
1993.]

習性：草本。

產地：香港有記錄。生於林下。

分佈：長江以南。日本、緬甸、印度和尼泊爾。

**鞭葉蕨屬 *Cyrtomidictyum* Ching**

**單葉鞭葉蕨**

***Cyrtomidictyum basipinnatum* (Baker)**

Ching (*Aspidium basipinnatum* Baker)

習性：草本。

產地：僅見一份標本，於一九〇六年採自聶高信山。生於林下。

分佈：華南。

**貫衆屬 *Cyrtomium* Presl**

**鎌羽貫衆**

***Cyrtomium balansae* (Christ) C. Chr.**

(*Phanerophlebia vittata* Cop.)

習性：草本。

產地：馬鞍山、大嶼山。生於林下。

分佈：長江以南。越南和日本。

**全緣貫衆 Asian Holly Fern**

***Cyrtomium falcatum* (L. f.) Presl**

(*Phanerophlebia falcata* (L. f.) Cop.)

習性：草本。

產地：石澳、塔門、果洲群島。生於岩石上。

分佈：山東、江蘇、浙江、臺灣、福建和廣東。日本。

用途：藥用。

**鱗毛蕨屬 *Dryopteris* Adans.**

**闊鱗毛蕨**

***Dryopteris championii* (Benth.) C. Chr. ex**

Ching [*Dryopteris filix-mas* auct. non

(L.) Schott: Check List HK Plants.

1993.]

習性：草本。

產地：扯旗山、柏架山。生於林下。

分佈：長江以南。日本。

**異蓋鱗毛蕨**

***Dryopteris decipiens* (Hook.) Kuntze**

習性：草本。

產地：大帽山。生於林下。

分佈：福建、江西、廣東、廣西和貴州。日本。

**黑足鱗毛蕨**

***Dryopteris fuscipes* C. Chr. [*Dryopteris***

*erythrosora* auct. non (Eaton) Kuntze:

Check List HK Pl. 1993.]

習性：草本。

產地：大帽山。

分佈：長江以南。日本及中南半島。

**柄葉鱗毛蕨**

***Dryopteris podophylla* (Hook.) Kuntze**

習性：草本。

產地：香港各地。生於林下。

分佈：福建和廣東。

**稀疏鱗毛蕨**

***Dryopteris sparsa* (Don) Kuntze**

習性：草本。

產地：大帽山、馬鞍山。生於林下。

分佈：長江以南。印度、越南和日本。

**嶺南鱗毛蕨**

**†*Dryopteris tenuicula* Matthew & Christ**

習性：草本。

產地：香港有記錄。

分佈：廣東。

**變異鱗毛蕨**

***Dryopteris varia* (L.) Kuntze [*Polystichum***

*varium* (L.) Presl]

習性：草本。

產地：香港各地。生於林下。

分佈：長江以南。日本。

**耳蕨屬 *Polystichum* Roth**

**華南耳蕨**

**†*Polystichum eximium* (Mett. ex Kuhn) C.**

Chr.

習性：草本。

產地：大帽山。生於山坡。

分佈：華南和臺灣。越南和日本。

**P46. 叉蕨科 *Aspidiaceae***

**沙皮蕨屬 *Hemigramma* Christ**

**沙皮蕨**

***Hemigramma decurrens* (Hook.) Cop.**

習性：草本。  
產地：香港島、南涌、沙頭角。生於林下。  
分佈：臺灣、福建、廣東、海南、雲南。越南和日本。

### 黃腺蕨屬 *Pleocnemia* Presl

#### 有蓋黃腺蕨

***Pleocnemia conjugata*** (Blume) Presl  
[*Tectaria leuzeana* auct. non (Gaudich)  
Cop.: Check List HK Pl.1993, p. p.]

習性：草本。  
產地：柏架山、蠔涌。生於林下。  
分佈：東南亞、緬甸及印度。

#### 黃腺蕨

***Pleocnemia winitii*** Holtt. [*Tectaria leuzeana*  
auct. non (Gaudich) Cop.: Check List  
HK Pl. 1993, p. p.]

習性：草本。  
產地：歌賦山、八仙嶺。生於林下。  
分佈：臺灣、福建、廣東、海南、廣西和雲南。越南、泰國和印度。

### 地耳蕨屬 *Quercifilix* Cop.

#### 地耳蕨

***Quercifilix zeylanica*** (Houtt.) Cop. [*Tectaria*  
*zeilanica* (Houtt.) Sledge]

習性：草本。  
產地：香港各地。生於林下。  
分佈：臺灣、福建、廣東、廣西、雲南和貴州。越南、馬來西亞、印度和斯里蘭卡。

### 叉蕨屬 *Tectaria* Cav.

#### 下延叉蕨

†***Tectaria decurrens*** (Presl) Cop.  
習性：草本。  
產地：柏架山。生於林下。  
分佈：臺灣、華南及雲南。印度、錫金、緬甸、越南、菲律賓和日本。

#### 條裂叉蕨

***Tectaria phaeocaulis*** (Ros.) C. Chr. (*Tectaria*  
*laciniata* Ching)  
習性：草本。

產地：新界、柏架山、大帽山、大老山、馬鞍山。生於林下。  
分佈：臺灣、福建、廣東和廣西。越南和日本。

#### 叉蕨

***Tectaria subtriphylla*** (Hook. & Arn.) Cop.  
習性：草本。  
產地：香港各地。生於林下。  
分佈：臺灣、華南及西南。印度、斯里蘭卡、緬甸、越南和印度尼西亞。

## P47. 實蕨科 *Bolbitidaceae*

### 實蕨屬 *Bolbitis* Schott

#### 華南實蕨

***Bolbitis subcordata*** (Cop.) Ching [*Bolbitis*  
*quoyana* auct. non (Gaut.) Ching:  
Check List HK Pl. 1993.]

習性：草本。  
產地：大帽山、大埔滘。生於林下溪邊。  
分佈：華東及華南。越南和日本。

### 刺蕨屬 *Egenolfia* Schott

#### 刺蕨

***Egenolfia appendiculata*** (Willd.) J. Sm.  
習性：草本。  
產地：大帽山、柏架山。生於林下。  
分佈：臺灣、廣東、廣西和雲南。東南亞、日本及印度。

#### 中華刺蕨

†***Egenolfia sinensis*** (Baker) Maxon  
習性：草本。  
產地：大東山、大埔滘。生於林下。  
分佈：雲南、貴州。南亞及東南亞。

## P48. 藤蕨科 *Lomariopsidaceae*

### 藤蕨屬 *Lomagamma* J. Sm.

#### 網藤蕨

†***Lomagamma matthewii*** (Ching) Houtt.  
習性：攀援。  
產地：梧桐寨。生於瀑布旁岩壁上。  
分佈：福建、廣東及雲南。

## P49. 舌蕨科 Elaphoglossaceae

舌蕨屬 *Elaphoglossum* Schott

華南舌蕨

**Elaphoglossum yoshinagae** (Yatabe) Makino  
(*Elaphoglossum austrosinicum*  
Matthew & Christ)

習性：草本。

產地：大帽山、大東山、鳳凰山。生於林下石上。

分佈：華東、華南及湖南、貴州。日本。

## F50. 腎蕨科 Nephrolepidaceae

腎蕨屬 *Nephrolepis* Schott

腎蕨 Tuberos Sword Fern

**Nephrolepis auriculata** (L.) Trimem  
(*Nephrolepis cordifolia* auct. non C.  
Presl: Check List HK Pl. 1993.)

習性：草本。

產地：香港各地。生於林下。

分佈：華東、華南及西南。熱帶及亞熱帶地區。

用途：藥用、觀賞。

長葉腎蕨

**Nephrolepis biserrata** (Sw.) Schott

習性：草本。

產地：香港島。生於林下。

分佈：臺灣、廣東、海南和雲南。日本、越南、印度至馬來西亞。

毛葉腎蕨 Rough Sword Fern

**Nephrolepis hirsutula** (Forst.) Presl  
[*Nephrolepis exaltata* auct. non (L.)  
Schott: Check List HK Pl. 1993.]

習性：草本。

產地：香港島。生於林下。

分佈：臺灣、華南及雲南。印度、越南和馬來西亞。

## P51. 條蕨科 *Oleandraceae*

條蕨屬 *Oleandra* Cav.

圓基條蕨

**Oleandra intermedia** Ching (*Oleandra cumingii* auct. non J. Sm.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：草本。

產地：僅見二份標本，於一九〇六年至一九〇七年採自柏架山。生石壁上。

分佈：廣東、貴州和雲南。

## P52. 骨碎補科 *Davalliaceae*

骨碎補屬 *Davallia* Sm.

華南骨碎補

†**Davallia austrosinica** Ching

習性：草本。

產地：香港有記錄。

分佈：廣東。

大葉骨碎補

**Davallia formosana** Hayata (*Davallia orientalis* C.Chr.)

習性：草本。

產地：扯旗山、大帽山。生於山谷。

分佈：臺灣、福建、廣東、海南、廣西和雲南。越南和柬埔寨。

陰石蕨屬 *Humata* Cav.

陰石蕨

**Humata repens** (L. f.) Diels

習性：草本。

產地：扯旗山、香港仔、大嶼山。生於樹上或石上。

分佈：華東、華南及西南。

用途：藥用、觀賞。

圓蓋陰石蕨

**Humata tyermanni** Moore

習性：草本。

產地：黃泥涌、大潭、石崗。生於樹上或石上。

分佈：華南、華東、西南。越南和老撾。

用途：藥用。

## P56. 水龍骨科 Polypodiaceae

### 線蕨屬 *Colysis* Presl

#### 線蕨

*Colysis elliptica* (Thunb.) Ching

習性：草本。

產地：香港各地。生於林下。

分佈：長江以南。越南和日本。

#### 斷線蕨

*Colysis hemionitidea* (Wall. ex Mett.) Presl

習性：草本。

產地：柏架山、大帽山。生於林下。

分佈：臺灣、福建、廣東、廣西、貴州和雲南。日本、菲律賓、越南、緬甸和印度。

#### 寬羽線蕨

*Colysis pothifolia* (D. Don) C. Presl

習性：草本。

產地：西貢、大帽山、大刀岩。生於林下。

分佈：長江以南。南亞及東南亞。

#### 褐葉線蕨

*Colysis wrightii* (Hook.) Ching

習性：草本。

產地：北大刀岩、大菴、上禾坑、新娘潭。生於溪邊。

分佈：臺灣、福建、江西、廣東和廣西。越南和日本。

### 伏石蕨屬 *Lemmaphyllum* Presl

#### 伏石蕨

*Lemmaphyllum microphyllum* Presl

習性：草本。

產地：香港各地。生於樹上或石上。

分佈：長江以南。朝鮮、日本和越南。

### 骨牌蕨屬 *Lepidogrammitis* Ching

#### 披針骨牌蕨

†*Lepidogrammitis diversa* (Ros.) Ching

習性：草本。

產地：大東山。生於林下石上。

分佈：安徽、浙江、江西、福建、湖南、廣

東、廣西和貴州。

用途：藥用。

#### 骨牌蕨

*Lepidogrammitis rostrata* (Bedd.) Ching

[*Lemmaphyllum subrostratum* auct. non (C. Chr.) Ching; Check List HK Pl. 1993.]

習性：草本。

產地：馬鞍山。生於林下石上。

分佈：臺灣、廣東、廣西、雲南和貴州。越南、緬甸和印度。

### 瓦韋屬 *Lepisorus* (J. Sm.) Ching

#### 粵瓦韋

†*Lepisorus obscure-venulosus* (Hayata) Ching

習性：草本。

產地：大帽山、鳳凰山。生樹幹上。

分佈：華東及華南。日本。

#### 瓦韋

*Lepisorus thunbergianus* (Kaulf.) Ching

習性：草本。

產地：柏架山、新界。生於樹上或石上。

分佈：長江以南。日本和朝鮮。

用途：藥用。

### 星蕨屬 *Microsorium* Link

#### 攀援星蕨

*Microsorium buergerianum* (Miq.) Ching

習性：草本。

產地：香港各地。生於樹上或石上。

分佈：長江以南。越南和日本。

#### 羽裂星蕨

*Microsorium insigne* (Blume) Cop.

[*Microsorium dilatatum* (Bedd.) Sledge; *Microsorium hancockii* Ching]

習性：草本。

產地：香港仔、歌賦山、新娘潭、大帽山、梅子林。生於林下石上。

分佈：臺灣、福建、廣東、廣西、雲南、貴州和四川。印度、馬來西亞、越南和日本。

### 江南星蕨

**Microsorium fortunei** (Moore) Ching

習性：草本。

產地：青山。生於樹幹上或石上。

分佈：長江以南。越南和日本。

用途：藥用、觀賞。

### 有翅星蕨

**Microsorium pteropus** (Blume) Cop.

習性：草本。

產地：香港仔、城門、粉嶺。生於溪邊。

分佈：臺灣、福建、廣東、廣西、貴州和雲南。印度和越南。

### 星蕨

**Microsorium punctatum** (L.) Cop.

習性：草本。

產地：大帽山、青山、丹竹坑、赤洲。生樹幹上。

分佈：臺灣、廣東、海南、雲南和貴州。熱帶亞洲和非洲。

### 顯脈星蕨

**Microsorium zippelii** (Blume) Ching

習性：草本。

產地：大帽山。生於林下溪邊石壁上。

分佈：華南、雲南、和貴州。菲律賓、蘇門答臘、馬來西亞和印度北部。

### 瘤蕨屬 *Phymatodes* Presl

#### 多羽瘤蕨

**Phymatodes longissima** (Blume) J. Sm.

習性：草本。

產地：大帽山、西貢、烏蛟騰、南丫島、喜靈洲。生於疏林下溪邊。

分佈：臺灣和海南。熱帶亞洲。

#### 瘤蕨

**Phymatodes scolopendria** (Burm. f.) Ching

[*Microsorium scolopendria* (Burm.) Copel.]

習性：草本。

產地：北角、大坑、塔門、丫洲、赤洲、白

沙洲、沙洲。生於林下石上。

分佈：臺灣、海南、廣東和雲南。熱帶亞洲、非洲。

### 石韋屬 *Pyrrosia* Mirbel

#### 貼生石韋

**Pyrrosia adnascens** (Sw.) Ching [*Pyrrosia lanceolata* (L.) Farw.]

習性：草本。

產地：香港各地。生石上或樹上。

分佈：臺灣、福建、廣東、廣西和雲南。越南、印度和馬來西亞。

用途：藥用。

#### 石韋 Japanese Felt Fern

**Pyrrosia lingua** (Thunb.) Farw.

習性：草本。

產地：香港各地。生樹上或石上。

分佈：長江以南。越南和日本。

用途：藥用、觀賞。

## P57. 槲蕨科 *Drynariaceae*

### 崖薑屬 *Pseudodrynaria* C. Chr.

#### 崖薑 Rock-ginger Fern

**Pseudodrynaria coronans** (Wall. ex Mett.) Ching

習性：大型草本。

產地：香港各地。生於林下。

分佈：臺灣、福建、廣東、廣西、貴州和雲南。印度、越南和馬來西亞。

用途：藥用、觀賞。

## P59. 禾葉蕨科

### *Grammitidaceae*

#### 禾葉蕨屬 *Grammitis* Sw.

#### 紅毛禾葉蕨

**Grammitis hirtella** (Blume) Tuyame

習性：草本。

產地：大帽山。生於溪邊石上。

分佈：廣東。熱帶亞洲。

#### 兩廣禾葉蕨

†**Grammitis lasiosora** (Blume) Ching

習性：草本。

產地：大帽山、大東山。生於林下。  
分佈：福建、廣東、廣西、江西和湖南。印度和馬來西亞。

分佈：長江以南。朝鮮和日本。  
用途：藥用、飼料、綠肥。

## P60. 劍蕨科 Loxogrammaceae

劍蕨屬 *Loxogramme* (Blume) Presl

柳葉劍蕨

*Loxogramme salicifolia* (Makino) Makino  
(*Loxogramme lanceolata* C. Presl)

習性：草本。

產地：大帽山、鳳凰山。生於樹上或石上。  
分佈：長江以南各省區。朝鮮、日本和越南。

## P61. 蘋科 Marsileaceae

蘋屬 *Marsilea* L.

蘋 Water Shamrock

*Marsilea quadrifolia* L.

習性：草本。

產地：沙田、米埔、貝澳。生於水田或溝塘。  
分佈：長江以南及華北。全球溫帶和熱帶地區。

用途：藥用。

## P62. 槐葉蘋科 Salviniaceae

槐葉蘋屬 *Salvinia* Adans.

槐葉蘋 Water Spangles

*Salvinia natans* (L.) All.

習性：草本。

產地：茅坪、坑下莆。生水田或溝塘。  
分佈：我國除西北外均有。印度、越南、日本及歐洲。

用途：藥用。

## P63. 滿江紅科 Azollaceae

滿江紅屬 *Azolla* Lam.

滿江紅 Mosquito Fern

*Azolla imbricata* (Roxb.) Nakai (*Azolla pinnata* R. Br. var. *africana* auct. non Baker: Check List HK Pl. 1993.)

習性：草本。

產地：大埔、沙頭角、丹竹坑。生水田、水溝或池塘。

## 二、裸子植物

### GYMNOSPERMS

#### G1. 銀杏科 Ginkgoaceae

##### 銀杏屬 Ginkgo L.

銀杏 (白果樹) Maidenhair Tree, Ginkgo

\**Ginkgo biloba* L.

習性：喬木。授粉期：3—4 月；種子成熟期：9—10 月。

產地：大埔滘、遮打公園有栽培。

分佈：浙江天目山。全國及世界各地庭園均有栽培。

用途：觀賞、藥用、食用。

#### G2. 南洋杉科

##### Araucariaceae

##### 貝殼杉屬 Agathis Salisb.

貝殼杉

\**Agathis damara* (Lamb.) Rich. (*Agathis robusta* auct. non F. Muell.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：喬木。

產地：香港動植物公園有栽培。

分佈：廣東、福建等地有引種。原產馬來半島和菲律賓。

用途：觀賞。

##### 南洋杉屬 Araucaria Juss.

大葉南洋杉 (塔杉) Bunya-bunya

\**Araucaria bidwillii* Hook.

習性：喬木。

產地：香港動植物公園、大埔滘。

分佈：廣東、海南、福建等地有引種。原產澳大利亞。

用途：觀賞。

南洋杉 (花旗杉) Hoop Pine

\**Araucaria cunninghamii* Sweet

習性：喬木。

產地：公園及庭園栽培。

分佈：廣東、海南、福建等地有引種。原產澳大利亞。

用途：觀賞。

異葉南洋杉 (南洋杉) Norfolk Island Pine

\**Araucaria heterophylla* (Salisb.) Franco

習性：喬木。

產地：公園及庭園栽培。

分佈：廣東、福建等地有引種。原產大洋洲諾和克島。

用途：觀賞。

#### G3. 松科 Pinaceae

##### 油杉屬 Keteleeria Carr.

油杉 Fortune Keteleeria

*Keteleeria fortunei* (Murr.) Carr.

習性：喬木。授粉期：3—4 月；種子成熟期：10 月。

產地：鶴咀、赤柱。

分佈：廣東、廣西、浙江、江西、湖南、貴州及雲南。越南。

##### 松屬 Pinus L.

濕地松 (愛氏松) Slash Pine

\**Pinus elliotii* Engelm.

習性：喬木。

產地：香港各地。

分佈：廣東、廣西、福建、臺灣、江西、浙江、江蘇、安徽、湖北有引種。原產美國東南部。

用途：材用。

馬尾松 Chinese Red Pine

*Pinus massoniana* Lamb.

習性：喬木。授粉期：4—5 月；種子成熟期：次年 10—12 月。

產地：零星分佈香港各地。生於丘陵、山坡。

分佈：長江流域以南各省區。

用途：材用。

火炬松 Loblolly Pine

\**Pinus taeda* L.

習性：喬木。

產地：西貢。

分佈：廣東、廣西、湖南、福建、江西、浙江、江蘇等地有引種。原產北美東南部。

用途：材用。

## G5. 杉科 Taxodiaceae

### 柳杉屬 *Cryptomeria* D. Don

日本柳杉 Peacock Pine

\**Cryptomeria japonica* (L. f.) D. Don

習性：喬木。授粉期：2—4月；種子成熟期：10月。

產地：香港仔道、香港動植物公園、大埔滘、奇力山。生於林中。

分佈：華南、華東、西南和湖北、甘肅等省均有栽培。原產日本。

用途：觀賞、材用。

### 杉木屬 *Cunninghamia* R. Brown

杉木 China Fir

\**Cunninghamia lanceolata* (Lamb.) Hook.

習性：喬木。授粉期：1—5月；種子成熟期：8—11月。

產地：香港各郊野公園。生於林中。

分佈：秦嶺以南地區廣泛栽培。

用途：材用。

### 水松屬 *Glyptostrobus* Endl.

水松 Water Pine

*Glyptostrobus pensilis* (Staunton) K. Koch

習性：喬木。

產地：早於1912年記錄於粉嶺泰亨村，該樹已不存在。現公園及庭園有栽培。

分佈：廣東、廣西、雲南、四川、江西、福建。

用途：觀賞。

### 水杉屬 *Metasequoia* Miki ex Hu & Cheng

水杉 Dawn Redwood, Shui-Sha

\**Metasequoia glyptostroboides* Hu & Cheng

習性：喬木。授粉期：1—3月；種子成熟期：9—10月。

產地：公園及標本林有栽培。

分佈：全國各地廣泛栽培。原產四川、湖北。

用途：觀賞、材用。

### 落羽杉屬 *Taxodium* Rich.

落羽杉 Deciduous Cypress, Common Cypress

\**Taxodium distichum* (L.) Rich.

習性：喬木。授粉期：3—4月；種子成熟期：7—10月。

產地：公園有栽培。

分佈：廣東、江西、浙江、上海、江蘇、湖北、河南等地有引種。原產北美東南部。

用途：觀賞、材用。

## G6. 柏科 Cupressaceae

### 柏松屬 *Callitris* Vent.

彎垂柏松 Drooping Callitris

\**Callitris cupressiformis* F. Muell.  
(*Callitris rhomboidea* Rich.)

習性：喬木

產地：大埔滘。

分佈：原產澳大利亞。

用途：觀賞。

柏松 Cypress Pine

\**Callitris robusta* R. Br.

習性：喬木。

產地：栽培。

分佈：原產澳大利亞。

用途：觀賞。

### 扁柏屬 *Chamaecyparis* Spach

絨柏（雲松） Yellow Sawara Cypress

\**Chamaecyparis pisifera* (Sieb. & Zucc.)  
Endl. cv. *Squarrosa*

習性：灌木或小喬木。

產地：栽培。

分佈：江西、浙江、江蘇有引種。原產日本。

用途：觀賞。

### 柏木屬 *Cupressus* L.

柏木（垂柏） Weeping Cypress

\**Cupressus funebris* Endl.

習性：喬木。授粉期：3—5月；種子成熟期：5—6月。

產地：栽培。

分佈：廣東、廣西、貴州、雲南、四川、福建、浙江、江西、湖南、湖北、安徽、河南、陝西、甘肅。

用途：觀賞。

### 福建柏屬 *Fokienia* Henry & Thomas

#### 福建柏 *Fokien Cypress*

\**Fokienia hodginsii* (Dunn) Henry & Thomas

習性：喬木。授粉期：3—4 月；種子成熟期：10—11 月。

產地：栽培。

分佈：廣東、廣西、貴州、湖南、江西、福建及浙江。

用途：觀賞。

### 刺柏屬 *Juniperus* L.

#### 圓柏 *Chinese Juniper*

\**Juniperus chinensis* L.

習性：喬木。

產地：公園及庭園有栽培。

分佈：全國各地及朝鮮、日本。

用途：觀賞。

#### 龍柏 *Dragon Juniper*

\**Juniperus chinensis* L. cv. **Kaizuca**

習性：喬木。

產地：栽培。

分佈：長江流域及各大城市庭園有栽培。

用途：觀賞。

### 崖柏屬 *Thuja* L.

#### 側柏 *Chinese Arborvitae*

\**Thuja orientalis* L.

習性：喬木。授粉期：3—4 月；種子成熟期 10 月。

產地：公園及庭園有栽培。

分佈：廣東、廣西、貴州、雲南、福建、江西、浙江、江蘇、安徽、山東、湖南、湖北、四川、河南、陝西、甘肅、山西、河北、內蒙古、吉林、遼寧。朝鮮、俄羅斯。

## G8. 羅漢松科

### Podocarpaceae

#### 竹柏屬 *Nageia* Gaertn.

#### 竹柏

\**Nageia nagi* Kuntze [*Podocarpus nagi* (Thunb.) Pilger]

習性：喬木。授粉期：3—5 月；種子成熟期：8—11 月。

產地：公園及庭園有栽培。

分佈：廣東、廣西、四川、湖南、江西、福建、浙江及日本。

用途：觀賞、材用。

### 羅漢松屬 *Podocarpus* L'Hert. Ex Pers.

#### 羅漢松 *Buddhist Pine*

\**Podocarpus macrophyllus* (Thunb.) D. Don

習性：喬木。授粉期：4—5 月；種子成熟期：8—9 月。

產地：鶴咀、薄扶林、西貢。

分佈：廣東、廣西、貴州、雲南、四川、湖南、安徽、江西、福建、浙江、江蘇及日本。

用途：觀賞。

#### 短葉羅漢松

\**Podocarpus macrophyllus* var. **maki** Endl.

習性：小喬木或灌木狀。授粉期：4—5 月；種子成熟期：8—9 月。

產地：香港動植物公園、扯旗山、鶴咀。

分佈：廣東、廣西、貴州、雲南、四川、陝西、湖南、湖北、江西、福建、浙江、江蘇等地有栽培。

用途：觀賞。

#### 百日青 *Thitmin*

*Podocarpus neriifolius* D. Don

習性：喬木。授粉期：5 月；種子成熟期：8—11 月。

產地：扯旗山。生於山地林中。

分佈：廣東、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、湖南、江西、浙江、福建、臺灣及尼泊爾、錫金、不丹、緬甸、越南、老撾、印度尼西亞、馬來西亞。

用途：材用。

## G9. 三尖杉科 *Taxaceae*

### 穗花杉屬 *Amentotaxus* Pilger

#### 穗花杉 *Amentotaxus*

*Amentotaxus argotaenia* (Hance) Pilger

習性：喬木。授粉期：4月，種子成熟期：10月。

產地：馬鞍山、大帽山、柏架山、大東山、鳳凰山、西貢。生於林中。

分佈：廣東、廣西、貴州、四川、西藏、甘肅、湖北、湖南、江西、福建、臺灣、浙江、江蘇。越南。

用途：材用。

## G12. 蘇鐵科 Cycadaceae

### 蘇鐵屬 *Cycas* L.

澳洲蘇鐵 Australian Nut Palm

\**Cycas media* Br.

習性：喬木。

產地：香港動植物公園。

分佈：原產澳大利亞。

用途：觀賞。

蘇鐵 Sago Palm

\**Cycas revoluta* Thunb.

習性：喬木。授粉期：5—7月；種子成熟期：9—10月。

產地：香港各地庭園常見。

分佈：廣東、福建、臺灣。全國各地常見栽培。

用途：觀賞。

廣東蘇鐵（臺灣蘇鐵）

\**Cycas taiwaniana* Carruthers (*Cycas siamensis* non Miq.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：喬木。

產地：香港動植物公園。

分佈：廣東、海南、福建、廣西、湖南、雲南。

用途：觀賞。

## G14. 澤米蘇鐵科 Zamiaceae

### 澤米蘇鐵屬 *Zamia* L.

澤米蘇鐵（牙買加蘇鐵） Jamaica Sagotree

\**Zamia furfuracea* L. f.

習性：灌木。

產地：公園及庭園有栽培。

分佈：原產墨西哥、哥倫比亞。

用途：觀賞。

## G17. 買麻藤科 Gnetaceae

### 買麻藤屬 *Gnetum* L.

羅浮買麻藤 Luofushan Jointfir

*Gnetum lofuense* C. Y. Cheng (*Gnetum montanum* auct. non Markgraf.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：藤本。授粉期：5—7月；種子成熟期：8—10月。

產地：香港各地。

分佈：廣東、海南、福建、江西、湖南、廣西、貴州、雲南。

小葉買麻藤 Smallleaf Jointfir

*Gnetum parvifolium* (Warb.) C. Y. Cheng

習性：藤本。授粉期：4—6月；種子成熟期：6—11月。

產地：香港各地。

分佈：廣東、海南、福建、江西、湖南。