

三、被子植物 ANGIOSPERMS

(一) 木蘭亞綱 Magnoliidae

6. 木蘭科 Magnoliaceae

木蘭屬 *Magnolia* L.

香港木蘭 *Hong Kong Magnolia*

Magnolia champonii Benth. (*Magnolia paenetauma* Dandy)

習性：常綠灌木或小喬木。花期：5-6 月；
果期：9-10 月。

產地：大潭、大嶼山、大埔滘、大嶼山。生
於山地常綠闊葉林。

分佈：海南、廣東、廣西。

夜香木蘭（夜合花） *Chinese Mangolia*

****Magnolia coco*** (Lour.) DC.

習性：常綠灌木或小喬木。花期：5 月。

產地：栽培。

分佈：廣東、廣西、雲南、浙江、福建、臺
灣。越南。

用途：藥用、觀賞。

玉蘭（玉堂春） *Yulan*

****Magnolia denudata*** Desr.

習性：喬木。

產地：栽培。

分佈：江西、浙江、湖南、貴州。

用途：材用、藥用、觀賞。

荷花玉蘭（洋玉蘭） *Bull Bay, Southern
Magnolia*

****Magnolia grandiflora*** L.

習性：喬木。花期：5 月。

產地：栽培。

分佈：長江流域以南各城市有栽培。原產北
美洲東南部。

用途：觀賞、園林綠化樹種。

紫玉蘭（辛夷） *Purple Magnolia*

****Magnolia liliiflora*** Desr.

習性：灌木。花期：3 月。

產地：栽培。

分佈：福建、湖北、四川、雲南。

用途：藥用、觀賞。

二喬木蘭 *Saucer Magnolia*

****Magnolia soulangeana*** Soul.-Bod.

習性：小喬木。花期：2 月。

產地：栽培。

分佈：杭州、昆明、廣州有栽培。

用途：觀賞。

木蓮屬 *Manglietia* Blume

木蓮（綠楠） *Ford's Manglietia*

Manglietia fordiana Oliv.

習性：喬木。花期：5 月；果期：10 月。

產地：扯旗山、馬鞍山、大帽山、大東山。
生於山地丘陵。

分佈：福建、廣東、廣西、貴州、雲南。

用途：藥用。

含笑屬 *Michelia* L.

白蘭 *White Jade Orchid Tree*

****Michelia × alba*** DC.

習性：喬木。花期：4-9 月；少見結實。

產地：栽培。

分佈：南方各地栽培。原產印度尼西亞爪
哇。

用途：庭園觀賞。

黃蘭 *Champac*

****Michelia champaca*** L.

習性：喬木。花期：6-7 月。

產地：栽培。

分佈：西藏、雲南、印度、尼泊爾、緬甸、
越南。

用途：材用，觀賞。

樂昌含笑（景烈含笑）

Michelia chapensis Dandy

習性：喬木。花期：4 月。

產地：大帽山、梧桐寨。生於山地林中。

分佈：江西、湖南、廣東、廣西。越南。

含笑 *Banana Shrub*

**Michelia figo* (Lour.) Spreng.

習性：灌木。花期：3-5月；果期：7-8月。

產地：照鏡潭。多見於栽培。

分佈：華南南部各省區，現廣植於全國各地。

用途：觀賞。

醉香含笑（火力楠） McClure's *Michelia*

†**Michelia macclurei* Dandy

習性：喬木。花期：2月；果期：7月。

產地：屯門。栽培。

分佈：廣東、海南、廣西、越南。

用途：材用、庭園觀賞。

深山含笑（莫氏含笑）

Michelia maudiae Dunn

習性：喬木。花期：2月；果期10月。

產地：鳳凰山、大東山。生於密林中。

分佈：廣東、廣西、貴州、福建、浙江、湖南。

用途：材用，觀賞。

觀光木屬 *Tsoongiodendron* Chun

觀光木 *Tsoong's Tree*

†**Tsoongiodendron odorum* Chun

習性：喬木。花期：3月。

產地：大帽山。生於山地闊葉林下。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、福建。

用途：觀賞。

8. 番荔枝科 *Annonaceae*

番荔枝屬 *Annona* L.

圓滑番荔枝（牛心果） *Pond-apple*

†**Annona glabra* L.

習性：喬木。花期：5-6月；果期：7-8月。

產地：栽培。

分佈：雲南、廣西、海南、浙江、臺灣等地栽培。原產熱帶美洲，現亞洲熱帶地區常見栽培。

用途：熱帶果樹。

番荔枝 *Sugar-apple, Sweetsop*

**Annona squamosa* L.

習性：喬木。花期：5-6月；果期：6-11月

產地：果園或庭園栽培。

分佈：雲南、廣東、福建、海南、浙江、臺灣等地栽培。原產熱帶美洲，現全球熱帶地區有栽培。

用途：熱帶果樹。

鷹爪花屬 *Artabotrys* R. Br. ex Ker

鷹爪花 *Eagle's Claw*

**Artabotrys hexapetalus* (L. f.) Bhandari

習性：攀援灌木。花期：5-8月；果期：6-12月。

產地：公園或庭園栽培。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、福建、江西、浙江、臺灣等地多見栽培，少數野生。印度、斯里蘭卡、泰國、越南、柬埔寨、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓等栽培或野生。

用途：觀賞、藥用、芳香油植物。

香港鷹爪花 *Hong Kong Eagle's Claw*

Artabotrys hongkongensis Hance

習性：攀援灌木。花期：4-7月；果期：5-12月

產地：柏架山、跑馬地、大潭、林村、粉嶺、上水、元朗、大嶼山。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、貴州、湖南、越南。

用途：觀賞、藥用、芳香油植物。

依蘭屬 *Cananga* (DC.) Hook. f. & Thoms.

依蘭（依蘭香）*Ylang-ylang*

**Cananga odorata* (Lam.) Hook. f. & Thoms.

習性：喬木。花期：4-8月；果期：12月至翌年3月。

產地：石澳、香港動植物公園有栽培。

分佈：廣東、廣西、海南、雲南、四川、臺灣、福建等地栽培。緬甸、印度尼西亞、菲律賓、馬來西亞。現世界熱帶地區有栽培。

用途：觀賞。花可提取香精油。

假鷹爪屬 *Desmos* Lour.

假鷹爪（酒餅葉）

Desmos chinensis Lour. (*Desmos cochinchinensis* auct. non Lour.:

Check List HK Pl. 1993.)

習性：灌木。花期：4-6 月；果期：6 月至翌年 3 月。

產地：香港各地。生於林緣。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、貴州。印度、越南、柬埔寨、馬來西亞、老撾、印度尼西亞、菲律賓、新加坡。

用途：觀賞、藥用。

瓜馥木屬 *Fissistigma* Griff.

白葉瓜馥木 *White-leaved Fissistigma*

Fissistigma glaucescens (Hance) Merr.

習性：藤本。花期：1-9 月；果期：幾乎全年。

產地：跑馬地。

分佈：廣西、廣東、雲南、福建、臺灣。越南。

用途：觀賞、藥用。

瓜馥木 *Oldham Fissistigma*

Fissistigma oldhamii (Hemsl.) Merr.

習性：藤本。花期：4-9 月；果期：7 月至翌年 2 月。

產地：柏架山、石澳、大埔滘、大帽山、大嶼山。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、湖南、江西、福建、浙江。

用途：觀賞、藥用；花可提制瓜馥木花油。

香港瓜馥木 *Hong Kong Fissistigma*

Fissistigma uonicum (Dunn) Merr.

習性：藤本。花期：3-6 月；果期：6-12 月。

產地：黃泥涌、大埔滘、大帽山、大嶼山。

分佈：海南、廣東、廣西、貴州、湖南、福建。

用途：觀賞、藥用、食用。

嘉陵花屬 *Popowia* Endl.

嘉陵花 *Pealikefruit Popowia*

†*Popowia pisocarpa* (Blume) Endl.

習性：藤本。花期：1-7 月；果期：9-11 月。

產地：大菴、梧桐寨。

分佈：海南、廣東。緬甸、泰國、越南、馬來西亞、菲律賓、印度尼西亞。

用途：觀賞、藥用；花可提制芳香油。

紫玉盤屬 *Uvaria* L.

光葉紫玉盤 *Glabrous leaf Uvaria*

†*Uvaria boniana* Finet & Gagnep.

習性：藤本。花期：5-10 月；果期：6 月至翌年 4 月。

產地：馬鞍山、大埔滘。

分佈：海南、廣東、廣西、江西。越南。

用途：觀賞、藥用。

刺果紫玉盤 *Spinyfruit Uvaria*

Uvaria calamistrata Hance

習性：藤本。花期：5-7 月；果期：7-12 月。

產地：香港仔、黃竹坑、大帽山、聶高信山、大嶼山。

分佈：海南、廣東、廣西。越南。

用途：藥用。

大花紫玉盤 *Largeflower Uvaria*

Uvaria grandiflora Roxb. ex Hornem.

習性：藤本。花期：3-11 月；果期：5-11 月。

產地：香港島、城門、大帽山、大埔滘、青州(南)。

分佈：海南、廣東、廣西。印度、緬甸、泰國、越南、馬來西亞、菲律賓、印度尼西亞。

用途：藥用、食用(果)、觀賞。

紫玉盤 *Uvaria*

Uvaria macrophylla Roxb. [*Uvaria microcarpa* Champ. ex Benth. ; *Uvaria cordata* (Dunal) Alston]

習性：藤本。花期：3-8 月；果期：7 月至翌年 3 月。

產地：香港各地。

分佈：海南、廣東、廣西、臺灣。越南、老撾。

用途：藥用、食用(果)、觀賞。

9. 肉豆蔻科 *Myristicaceae*

肉豆蔻屬 *Myristica* Gronov.

肉豆蔻 *Nutmeg*

†**Myristica fragrans* Houtt.

習性：喬木。花期：8 月；果期：10-11 月。

產地：香港動植物公園栽培。

分佈：廣東、雲南、臺灣有引進栽培。原產馬魯古群島，世界熱帶地區廣泛栽培。

用途：觀賞、藥用。

短梗肉豆蔻

†**Myristica guateriifolia* A. DC.

習性：喬木。

產地：香港動植物公園栽培。

分佈：原產菲律賓。

用途：觀賞、藥用。

15. 臘梅科 *Calycanthaceae*

臘梅屬 *Chimonanthus* Lindl.

臘梅 *Wintersweet*

**Chimonanthus praecox* (L.) Link

習性：落葉灌木。花期：11月至翌年3月；果期：4-11月。

產地：公園及庭園有栽培。

分佈：華南、華東、華中。全國各地有栽培。

17. 樟科 *Lauraceae*

瓊楠屬 *Beilschmiedia* Nees

廣東瓊楠 *Ford's Beilschmiedia*

Beilschmiedia fordii Dunn

習性：喬木。花期：6-12月；果期：12月至翌年6月。

產地：跑馬地。生於溝谷疏或密林中。

分佈：廣東、廣西、湖南、四川、越南。

網脈瓊楠 *Tsang's Beilschmiedia*

Beilschmiedia tsangii Merr.

習性：喬木。花期：夏季；果期：7-12月。

產地：香港仔、施勳道、深水灣道、大潭、柏架山、大嶼山。生於較濕潤的山坡疏林中。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、臺灣。

無根藤屬 *Cassytha* L.

無根藤 *Cassytha*

Cassytha filiformis L.

習性：寄生纏繞草本。花期：5-12月；果期：12月至翌年5月。

產地：香港各地。生於陽處山坡灌叢中。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、貴州、湖南、江西、浙江、福建、臺灣。非洲、亞洲熱帶及澳大利亞。

用途：藥用。

樟屬 *Cinnamomum* Trew

毛桂 *Hair-Twig-Cassia*

†*Cinnamomum appelianum* Schewe
(*Cinnamomum taimoshanicum* Chun ex Chang)

習性：大灌木至小喬木。花期：4-6月；果期：6-8月。

產地：大東山、馬鞍山、大帽山、城門、大潭。生於溝旁或山坡下部濕潤處。

分佈：廣東、廣西、湖南、江西、貴州、雲南、四川。

用途：藥用。

陰香 *Batavia Cinnamom*

Cinnamomum burmannii (Nees) Blume

習性：喬木或大灌木。花期：秋冬季；果期：冬至春末。

產地：香港各地。生於山坡或溪邊混交林中。有栽培作庭園觀賞。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、福建、臺灣。亞洲西南部經南部到東南部。

用途：藥用、材用。

樟 *Camphor Tree*

Cinnamomum camphora (L.) Presl

習性：大喬木。花期：4-5月；果期：8-11月。

產地：香港各地。野生或栽培。

分佈：西南至華南及華東各地。越南、朝鮮及日本。

用途：藥用、材用。

肉桂 *Cassia Bark Tree*

**Cinnamomum aromaticum* Nees
(*Cinnamomum cassia* auct non Nees ex Blume: Check List HK Pl. 1993.)

習性：喬木。花期：6-8月；果期：10-12月。

產地：青山寺、城門、柏架山。栽培。

分佈：原產我國，華南至華東溫暖地區廣為栽培。印度、越南、老撾、印度尼西亞等亦有栽培。

用途：藥用、香料。

野黃桂 Jensen's Cassia

†**Cinnamomum jensenianum** Hand.-Mazz.

習性：喬木。

產地：大東山。生於溝谷或較濕潤山坡疏林中。

分佈：廣東、廣西、湖南、湖北、江西、福建、四川。

黃樟 Yellow Cinnamomum

Cinnamomum parthenoxylon (Jack) Meissn.

習性：大喬木。

產地：香港各地。生於陽處雜木林中，以中海拔至低地為多。

分佈：廣東、廣西、雲南、貴州、湖南、江西、福建。亞洲西南至東南部。

粗脈桂 Thicknerved Cassia

Cinnamomum validinerve Hance

(*Cinnamomum japonicum* auct. non Sieb.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：大灌木。花期：4-6月。

產地：柏架山、馬鞍山、大嶼山。生於山坡疏林中。

分佈：廣東、廣西。

厚殼桂屬 *Cryptocarya* R. Br.

厚殼桂 Chinese *Cryptocarya*

Cryptocarya chinensis (Hance) Hemsl.

習性：喬木。花期：4-5月；果期：6-12月。

產地：香港各地。生於山坡或溪谷林中。

分佈：海南、廣東、廣西、福建、臺灣、四川。

黃果厚殼桂 (黃果桂) Elegant *Cryptocarya*

Cryptocarya concinna Hance

習性：喬木。花期：3-5月；果期：6-12月。

產地：司徒拔道、鶴咀。生於緩坡疏林中。

分佈：海南、廣東、廣西、江西、臺灣。越南。

叢花厚殼桂 Denseflower *Cryptocarya*

†***Cryptocarya densiflora*** Blume

習性：喬木。花期：4-6月；果期：7-11月。

產地：馬鞍山。生於林中。

分佈：廣西、福建、雲南。老撾、越南、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓。

山胡椒屬 *Lindera* Thunb.

烏藥 Tien-tai Spicebush

†***Lindera aggregata*** (Sims) Kosterm.

習性：小喬木或灌木。花期：3-4月；果期：5-11月。

產地：八仙嶺、荔枝窩、吉澳。生於陽處山坡疏林中。

分佈：華南、華東。越南、菲律賓。

用途：藥用。

小烏藥 Playfair's Spicebush

†***Lindera aggregata*** var. ***playfairii*** (Hemsl.)

H. P. Tsui

習性：灌木。

產地：吉澳。生於向陽山坡疏林中。

分佈：海南、廣東、廣西。

用途：藥用。

香葉樹 Chinese Spicebush

Lindera communis Hemsl. (*Lindera laureola*

auct. non Collett & Hemsl.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：喬木。花期：3-4月；果期：9-10月。

產地：香港各地。生於山坡混交林中。

分佈：廣東、廣西、湖南、湖北、江西、浙江、福建、臺灣、貴州、雲南、四川、陝西、甘肅。中南半島。

黑殼楠 Large-leaf Spicebush

Lindera megaphylla Hemsl. [*Lindera*

touyunense (H. Lévl.) Chun]

習性：喬木。花期：2-4月；果期：9-12月。

產地：梧桐寨。

分佈：湖北、湖南、廣西、廣東、安徽、江西、福建、四川、雲南、貴州、陝西、甘肅。

滇粵山胡椒 Metcalf Spicebush

†***Lindera metcalfiana*** Atten

習性：喬木。花期：3-5 月；
產地：扯旗山、大嶼山。
分佈：廣東、廣西、福建、雲南。

絨毛山胡椒 Hairy Spicebush

Lindera nacusua (D. Don) Merr. [*Lindera bifaria* (Nees) Horreus]

習性：灌木至喬木。花期：5-6 月；果期：7-10 月。

產地：香港島。多生於山坡疏林中，少見於溪邊溝谷。

分佈：海南、廣東、廣西、江西、福建、雲南、四川、西藏。

木薑子屬 *Litsea* Lam.

尖脈木薑子 Sharpvein Litsea

Litsea acutivena Hayata

習性：喬木。花期：7-8 月；果期：12 月至翌年 2 月。

產地：香港島。生於疏或密林中，山坡下部較常見。

分佈：海南、廣東、廣西、福建、臺灣。中南半島。

木薑子 (山蒼樹) Mountain-pepper

Litsea cubeba (Lour.) Pers.

習性：小喬木至灌木。花期：2-3 月；果期：7-8 月。

產地：香港各地。生於向陽山坡曠野或疏林中。

分佈：西藏、四川、雲南、貴州經華南至華東、華中各地。亞洲東南部各國。

用途：藥用、香料。

黃丹木薑子 (黃丹) Yellow Litsea

Litsea elongata (Wall. ex Nees) Benth. & Hook. f.

習性：灌木至小喬木。花期：5-11 月；果期：2-6 月。

產地：大潭、烏蛟騰、荔枝窩。生於山坡、溪邊疏林中。

分佈：西南部經華南至華中。印度、尼泊爾。

潺槁樹 Pond Spice

Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob.

習性：喬木。花期：5-6 月；果期：9-10 月。
產地：香港各地。生於山坡陽處疏林中或曠野。

分佈：廣東、廣西、福建、雲南。印度經越南至菲律賓。

用途：藥用、糊料。

華南木薑子 Greenman's Litsea

†**Litsea greenmaniana** Allen (*Litsea variabilis* auct. non Hemsl.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：小喬木。花期：7-8 月；果期：12 月至翌年 3 月。

產地：扯旗山、跑馬地、聶高信山、香港仔、馬鞍山。多生於溝谷及山坡疏林中。

分佈：廣東、廣西及福建。

假柿木薑子 (假柿樹) Persimmon-leaved Litsea

Litsea monopetala (Roxb.) Pers.

習性：小喬木。花期：11-6 月；果期：6-7 月。

產地：香港島、大嶼山、西貢等地。生於谷地疏林中。

分佈：廣東、廣西、貴州、雲南。亞洲西南部至東南部。

圓葉豺皮樟 Round-leaf Litsea

Litsea rotundifolia Hemsl.

習性：灌木。花期：8-9 月；果期：9-11 月。

產地：香港島、粉嶺。生於灌木林或疏林中。

分佈：廣東、廣西。

豺皮樟 Oblong-leaf Litsea

Litsea rotundifolia var. **oblongifolia** (Nees) Allen

習性：灌木。花期：8-9 月；果期：9-11 月。

產地：香港各地。生於低地林緣或疏林中。

分佈：海南、廣東、湖南、江西、浙江、福建、臺灣。越南。

用途：藥用。

輪葉木薑子 (槁樹) Litsea

Litsea verticillata Hance

習性：灌木。花期：4-11 月；果期：11 月至

翌年 1 月。

產地：香港島、林村、大埔、大帽山、馬鞍山、大嶼山。生於溝谷或山坡疏林中。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南。越南、柬埔寨。

潤楠屬 *Machilus* Nees

短序潤楠（短花楠） Short-flowered *Machilus*

Machilus breviflora (Benth.) Hemsl.

習性：小喬木。花期：7-8 月；果期：10-12 月。

產地：香港各地。生於低地山坡或溪旁混交林中。

分佈：海南、廣西。

浙江潤楠（長序潤楠） Chekiang *Machilus*

†*Machilus chekiangensis* S. Lee (*Machilus longipedunculata* S. Lee & F. N. Wei)

習性：喬木。花期：12 至翌年 1 月；果期：5-6 月。

產地：香港各地。多見於山坡中上部至山頂，星散或成片，為香港數量最多、分佈最廣的一種楠木。

分佈：廣東、福建、浙江。

華潤楠（香港楠） Hong Kong *Machilus*

Machilus chinensis (Champ. ex Benth.) Hemsl.

習性：喬木。花期：1-2 月；果期：5-6 月。

產地：香港仔、跑馬地、黃竹坑、黃泥涌、南風道、烏蛟騰。生於山坡下部或溝谷混交林中。

分佈：海南、廣東、廣西。越南。

黃心樹（芳槁潤楠） Silky *Machilus*

†*Machilus gamblei* King ex Hook. f. (*Machilus suaveolens* S. Lee)

習性：喬木。

產地：大埔、大埔滘、梧桐寨。生於溝谷或山坡中下部混交林中，在大埔滘較多。

分佈：海南、廣西、貴州、雲南。印度、尼泊爾至越南北部。

黃絨潤楠（黃楠） Yellow *Machilus*

Machilus grijsii Hance

習性：小喬木或灌木。花期：2-3 月；果期：4 月。

產地：馬鞍山。生於山坡疏林中。

分佈：海南、廣東、廣西、浙江、江西、福建。

廣東潤楠

†*Machilus kwangtungensis* Yang

習性：喬木。花期：3—4 月；果期：5—7 月。

產地：古洞、河上鄉。生於山谷林中或水旁。

分佈：廣東、廣西、貴州、湖南。

薄葉潤楠

†*Machilus leptophylla* Hand.-Mazz.

習性：喬木。

產地：大帽山。生於溝谷疏（密）林中。

分佈：廣東、湖南、貴州、江蘇、浙江、福建。

刨花潤楠（多脈潤楠、密脉潤楠）

Manynerved *Machilus*

†*Machilus pauhoi* Kanehira (*Machilus polyneura* H. T. Chang)

習性：喬木。

產地：柏架山、大埔滘、西貢、蕉坑、城門、梧桐寨、大帽山等。生於山坡中上部至山頂，零星或純林，數量之多僅次於浙江潤楠。

分佈：廣東。

粗壯潤楠 Strong *Machilus*

†*Machilus robusta* W. W. Sm.

習性：喬木。花期：1-4 月；果期：4-6 月。

產地：青山、梧桐寨。生於山坡下部或溪邊疏林中。

分佈：海南、廣東、廣西、貴州、雲南。緬甸。

紅楠 Red *Machilus*

Machilus thunbergii Sieb. & Zucc.

習性：喬木。花期：1-2 月；果期：5-6 月。

產地：大帽山、馬鞍山、大東山。生於山坡上部至山頂，常與浙江潤楠混生，但數量遠比後者少。

分佈：廣東、廣西至華東各地。日本、朝鮮。

絨毛潤楠 Woolly Machilus

Machilus velutina Champ. ex Benth.

習性：喬木或大灌木。花期：12月至翌年1月；果期：3-4月。

產地：香港各地。生於山坡疏林中。

分佈：廣東、廣西、江西、福建。中南半島。

信宜潤楠 (嘉道理楠) Xinyi Machilus

Machilus wangchiana Chun (*Persea kadooriei* Kosterm.)

習性：喬木。花期：12月至翌年2月；果期：5-6月。

產地：大帽山、嘉道理農場、柏架山南坡。生於較濕潤的溝谷或山坡中下部林中。

分佈：廣東、廣西。

新木薑子屬 *Neolitsea* Merr.

香港新木薑子 Hong Kong *Neolitsea*

Neolitsea cambodiana var. ***glabra*** Allen
[*Neolitsea hongkongensis* (Chun) C.K. Allen]

習性：小喬木或灌木。花期：10-12月；果期：7-8月。

產地：香港島、大帽山、大東山。生於山坡中下部疏林中。

分佈：廣東、廣西、福建。

廣西新木薑子 Guangxi *Neolitsea*

†***Neolitsea kwangsiensis*** Liou

習性：灌木。花期：12月；果期：7-8月。

產地：大東山。生於山坡或溝谷疏林中。

分佈：廣東、廣西。

大葉新木薑子 Largeleaf *Neolitsea*

†***Neolitsea levinei*** Merr.

習性：小喬木或大灌木。花期：3-4月；果期：8-10月。

產地：大帽山、馬鞍山。生於溝谷旁濕潤處。

分佈：湖南、湖北、雲南、四川。

用途：藥用。

顯脈新木薑子 *Conspicuous-Nerved Neolitsea*

Neolitsea phanerophlebia Merr.

習性：小喬木。花期：10-11月；果期：7-8月。

產地：大東山、鳳凰山。生於溝谷兩旁雜木林中或山坡中下部林中。

分佈：廣東、廣西、湖南、江西。

美麗新木薑子 *Neolitsea*

Neolitsea pulchella (Meissn.) Merr.

習性：小喬木或灌木。花期：10月至翌年1月；果期：8-9月。

產地：鶴咀、芬梨道、種植道、香港仔、歌賦山、石澳、灣仔道。

分佈：廣東、廣西、福建。

鱷梨屬 *Persea* Mill.

鱷梨 *Avocado*

****Persea americana*** Mill.

習性：喬木。花期：2-3月；果期：9-10月。

產地：庭園栽培。

分佈：原產熱帶美洲。廣東、廣西、福建、雲南、四川、臺灣有栽培。

用途：食用。

油果樟屬 *Syndiclis* Hook. f.

鱗秕油果樟 *Scurfy Fruit Syndiclis*

†***Syndiclis furfuracea*** H. W. Li

習性：喬木。花期：11-12月；果期：10月。

產地：大帽山。

分佈：雲南。

18·蓮葉桐科 *Hernandiaceae*

青藤屬 *Illigera* Blume

寬藥青藤 *Illigera*

Illigera celebica Miq. (*Illigera platyandra* Dunn)

習性：常綠藤本。花期：4-10月；果期：6-11月。

產地：鳳園、社山村。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南。中南半島、馬來西亞。

19. 金粟蘭科

Chloranthaceae

金粟蘭屬 *Chloranthus* Swartz

及己 (四葉對)

Chloranthus serratus (Thunb.) Roem. & Schult.

習性：多年生草本。花期：4-5 月；果期：6-8 月。

產地：大帽山、梧桐寨、甲龍。生於林下濕潤處。

分佈：廣東、廣西、貴州、四川、湖北、安徽、湖南、江西、福建、浙江、江蘇。日本。

用途：藥用。

金粟蘭 (珍珠蘭) *Pearl-orchid*

**Chloranthus spicatus* (Thunb.) Makino

習性：半灌木。花期：4-7 月；果期：8-9 月。

產地：栽培。

分佈：海南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、福建。日本、越南、印度、印度尼西亞。

用途：觀賞、藥用。

草珊瑚屬 *Sarcandra* Gardn.

草珊瑚 (雞爪蘭)

Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai

習性：亞灌木。花期：6 月；果期：8-10 月。

產地：全港各地常見。生於山坡、山谷林下。

分佈：華南、西南、華中、華東各省區。亞洲東南部。

用途：藥用。

20. 三白草科 *Saururaceae*

蕺菜屬 *Houttuynia* Thunb.

蕺菜 (魚腥草)

Houttuynia cordata Thunb.

習性：匍匐草本。花期：4-7 月。

產地：林村、沙螺洞。生於潮濕沼澤地、林下、溝邊。

分佈：華南、華東、華中、西南及西北。亞洲東南部。

用途：藥用。

三白草屬 *Saururus* L.

三白草 *Lizard's Tail*

Saururus chinensis (Lour.) Baill.

習性：多年生草本。花期：4—6 月。

產地：大潭、沙田、大埔、沙螺洞、大尾篤。生於溝邊或溪旁。

分佈：河北、河南、山東及長江以南各省區。日本、菲律賓至越南。

用途：藥用。

21. 胡椒科 *Piperaceae*

草胡椒屬 *Peperomia* Ruiz & Pavon

石蟬草

Peperomia blanda (Jacquin) Kunth
(*Peperomia dindygulensis* Miq.)

習性：多年生草本。花期：4-12 月。

產地：馬鞍山、大帽山。生於林中或陰濕地。

分佈：臺灣、福建、海南、廣東、廣西、貴州、雲南。日本、印度、孟加拉、斯里蘭卡、泰國、緬甸、柬埔寨、越南北部、馬來西亞及非洲和南美洲。

用途：藥用。

草胡椒 *Clearweed*

**Peperomia pellucida* (L.) Kurith

習性：一年生草本。花期：4-7 月。

產地：香港島、新界。生於林中濕地或牆腳。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、福建。原產熱帶美洲，在熱帶非洲和亞洲廣泛歸化。

鈍葉豆瓣綠 *Pepper Face*

**Peperomia obtusifolia* A. Dietr.

習性：草本。

產地：香港有栽培。

分佈：華南、西南有栽培。原產委內瑞拉，現熱帶地區廣泛栽培。

用途：觀賞。

西瓜皮 *Sander's Peperomia*, *Watermelon Peperomia*

**Peperomia sandersii* C. DC.

習性：草本。

產地：栽培。

分佈：華南、西南有栽培。原產巴西，現熱帶地區廣泛栽培。

用途：觀賞。

胡椒屬 *Piper* L.

萋葉

**Piper betle* L.

習性：攀援藤本。

產地：栽培

分佈：華南、西南、華東等地有栽培。印度、斯里蘭卡、越南、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓及馬達加斯加。

用途：香料、藥用。

華山萋（青萋）

Piper cathayanum M. G. Gilbert & N. H. Xia
(*Piper sinense* C. DC.)

習性：藤本。花期：3—6月。

產地：歌賦山、扯旗山、大埔滘。生於林中。

分佈：海南、廣東、廣西、貴州、四川。

山萋 *Hance's* Pepper

Piper hancei Maxim. (*Piper matthewii* Dunn)

習性：藤本。花期：3-8月。

產地：香港各地。生於林中石上或樹上。

分佈：廣東、廣西、湖南、貴州、雲南、浙江、福建。

用途：藥用。

毛萋

Piper hongkongense Hatusima [*Piper puberulum* (Benth.) Maxim.]

習性：藤本。花期：3-5月。

產地：大帽山、馬鞍山、大東山。生於灌叢或林中，攀援於樹上或石上。

分佈：海南、廣東、廣西。

假萋

Piper sarmentosum Roxb.

習性：匍匐直立草本。花期：4-11月。

產地：香港島、青山、大帽山、沙田、粉嶺、馬鞍山。生於林中或村邊濕地。

分佈：福建、海南、廣東、廣西、貴州、雲南、西藏。印度、柬埔寨、老撾、越

南、馬來西亞、菲律賓、印度尼西亞。
用途：藥用。

22. 馬兜鈴科

Aristolochiaceae

細辛屬 *Asarum* L.

香港細辛 *Hong Kong Asarum*

Asarum hongkongensis S. M. Huang & T. P. Wong Siu

習性：草本。花期：4-7月。

產地：大東山。生於山坡灌叢中、疏林下。

用途：藥用。

馬兜鈴屬 *Aristolochia* L.

長葉馬兜鈴 *Long-leaf Birthwort*

Aristolochia championii Merr. & Chun

習性：木質藤本。花期：4-6月；果期：8-10月。

產地：扯旗山、西高山、馬鞍山、大帽山。生於山坡灌叢、疏林中。

分佈：廣東、廣西、四川、貴州、雲南。

福氏馬兜鈴（通城虎） *Ford's Birthwort*

Aristolochia fordiana Hemsl.

習性：藤本。花期：3-4月；果期：5-7月。

產地：扯旗山、大帽山、大東山、鳳凰山。生於山谷林下、灌叢中和山地岩石縫隙中。

分佈：廣東、廣西、江西、浙江、福建。

用途：藥用。

印度馬兜鈴（耳葉馬兜鈴） *India Birthwort*

Aristolochia tagala Champ.

習性：藤本。花期：5-8月；果期：10-12月。

產地：大埔、鴉山、粉嶺、蠔涌。生於灌叢中。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、和臺灣。

印度、越南、馬來西亞、菲律賓。

用途：藥用。

海邊馬兜鈴（田氏馬兜鈴） *Seaside Dutchmanspipe*

Aristolochia thwaitesii Hook.f.

習性：藤本。花期：3-5月；果期：8-9月。
產地：黃泥涌峽、大嶼山。生於山地灌叢、
竹林中和山坡石縫中。
分佈：廣東。
用途：藥用。

香港馬兜鈴 (威氏馬兜鈴) Westland's
Birthwort

Aristolochia westlandii Hemsl.

習性：藤本。花期：3-4月。
產地：大帽山。生於山谷林下。
分佈：雲南。

23. 八角科 Illiciaceae

八角屬 *Illicium* L.

大嶼八角 Lantau Star-anise

Illicium angustisepalum A. C. Smith

習性：小喬木。花期：2月；果期：8月。
產地：大東山、鳳凰山。
分佈：廣東沿海島嶼。

紅花八角 (鄧氏八角) Dunn's Star-anise

Illicium dunnianum Tutch.

習性：灌木。花期：3-5月；果期：7-10月。
產地：烏蛟騰、新娘潭、南涌、鹿頸。生於
山地林中，河流沿岸。
分佈：福建、廣東、廣西、湖南、貴州。

平滑葉八角 (野八角)

Illicium leiophyllum Smith.

習性：灌木。
產地：聶高信山。
分佈：香港特有。

小花八角 Small-flowered Star-anise

Illicium micranthum Dunn

習性：灌木或小喬木。花期：4-6月；果期：
7-9月。
產地：歌賦山、馬鞍山。
分佈：湖北、湖南、廣東、廣西、四川、貴
州、雲南。

匙葉八角 Wild Star-anise

†**Illicium spathulatum** Y. C. Wu

習性：灌木。花期：2月。
產地：大東山。生於林中。
分佈：福建、廣東、廣西、湖南、雲南。
用途：藥用。

24. 五味子科 Schisandraceae

南五味子屬 *Kadsura* Kaempf. ex
Juss.

黑老虎 (冷飯團) Scarlet Kadsura

Kadsura coccinea (Lem.) A. C. Smith
(*Kadsura chinensis* Hance ex Benth.)

習性：藤本。花期：4-7月；果期：7-11月。
產地：大潭、掃桿埔、城門、大帽山、馬鞍
山、石板潭。生於林中。
分佈：海南、廣東、廣西、貴州、雲南、四
川、江西、湖南、越南。

用途：藥用。

異形南五味子 (過山龍藤) Dragon Kadsura

Kadsura heteroclita (Roxb.) Craib (*Kadsura*
roxburgiana Arn.)

習性：藤本。花期：7月。
產地：香港島、深井、三楹村、大嶼山。
分佈：海南、廣東、廣西、貴州、雲南、湖
北。東亞和東南亞。
用途：藥用。

25. 蓮科 Nelumbonaceae

蓮屬 *Nelumbo* Adans.

蓮 (荷花) Hindu Lotus.

***Nelumbo nucifera** Gaertn.

習性：草本。花果期：6-10月。
產地：香港動植物公園。栽培於水塘中。
分佈：我國南北各省。俄羅斯、朝鮮、日本、
印度、越南、亞洲南部和大洋洲。

26. 睡蓮科 Nymphaeaceae

睡蓮屬 *Nymphaea* L.

紅睡蓮 Red Waterlily

***Nymphaea alba** var. **rubra** Lonnr.

習性：草本。花期：6-8月；果期：8-10月。
產地：公園栽培。生於池塘中。
分佈：河北、山東、陝西、浙江。印度、俄
羅斯高加索及歐洲。

睡蓮 (白睡蓮) Pygmy Waterlily

**Nymphaea tetragona* Georgi

習性：草本。花期：5-8 月；果期：8-10 月。

產地：田園、庭園、池塘或公園栽培。

分佈：我國南北各省。俄羅斯、朝鮮、日本、印度、越南、亞洲南部和大洋洲。

29. 金魚藻科

Ceratophyllaceae

金魚藻屬 *Ceratophyllum* L.

金魚藻 Coontail

**Ceratophyllum demersum* L.

習性：水生草本。

產地：栽培或野生。

分佈：全國各地。全世界溫帶及熱帶地區。

30. 毛茛科 Ranunculaceae

錢線蓮屬 *Clematis* L.

威靈仙 Chinese Clematis

Clematis chinensis Osbeck

習性：木質藤本。花期：6 月；果期：8 月。

產地：大坑、大埔、鹿頸。生於灌叢、溝邊草叢。

分佈：華東、華中、華南及西南。越南。

用途：藥用。

厚葉鐵線蓮 Thick-leaf Clematis

Clematis crassifolia Benth.

習性：藤本。花期：12 月；果期：2 月。

產地：燕岩、大帽山、大嶼山。生於山地林中。

分佈：廣東、廣西、湖南、福建、臺灣。日本。

絲鐵線蓮 (甘木通) Long-hairy Clematis

Clematis filamentosa Dunn

習性：木質藤本。花期：12 月；果期：1-2 月。

產地：下坑、粉嶺、鳳園、蓮麻坑。生於溪邊、山谷、灌叢中。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南。

用途：藥用。

毛柱鐵線蓮 (甘草藤) Meyen's Clematis

Clematis meyeniana Walp.

習性：木質藤本。花期：6-8 月；果期：9-10 月。

產地：香港各地。生於山地灌叢、山谷。

分佈：廣東、廣西、雲南、四川、貴州、湖南、福建、江西、浙江、臺灣。老撾、越南、日本。

用途：藥用。

沙葉鐵線蓮 Granulate Clematis

†*Clematis meyeniana* var. *granulata* Finet & Gagnep.

習性：藤本。花期：7 月；果期：9 月。

產地：扯旗山、馬鞍山、大帽山。生於山地灌叢和林緣。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南。老撾、越南。

裂葉鐵線蓮 Small-lobed Clematis

Clematis parviloba Garden. & Champ.

習性：藤本。花期：4-6 月；果期：7-9 月。

產地：香港島。生於山谷灌叢、村邊或溝旁。

分佈：廣東、廣西、貴州、雲南、四川、江西、浙江、臺灣。日本。

柱果鐵線蓮 (鈎葉鐵線蓮) Hook-leaved Clematis

Clematis uncinata Champ.

習性：藤本。花期：7 月；果期：9 月。

產地：香港島、城門。生於山谷、溪邊的灌叢或林緣。

分佈：雲南、四川、貴州、甘肅、陝西、廣西、廣東、湖南、福建、臺灣、江西、安徽、浙江、江蘇。

用途：藥用。

毛茛屬 *Ranunculus* L.

禺毛茛 (自扣草) Moslem Garlic

Ranunculus cantoniensis DC.

習性：草本。花果期：4-6 月。

產地：香港島、沙田。生於丘陵田邊、溝旁水濕地。

分佈：華南、華東、華中及西南。印度、越

南、朝鮮、日本。
用途：藥用。

石龍芮 Celery-leaved Crowfoot

Ranunculus sceleratus L.

習性：草本。花果期：3-6 月。
產地：新界。生於河溝邊和濕地。
分佈：全國均有分佈。廣佈於亞洲、歐洲、
北美洲的亞熱帶至溫帶地區。
用途：藥用。

唐松草屬 *Thalictrum* L.

尖葉唐松草 (白蓬草)

Thalictrum acutifolium (Hand.-Mazz.)
Boivin (*Thalictrum clavatum* DC.)

習性：草本。花果期：4-7 月。
產地：馬鞍山、大東山、鳳凰山。生於山谷
坡地或林緣處。
分佈：廣東、廣西、貴州、四川、湖南、江
西、福建、浙江。
用途：全草藥用。

32. 小檗科 Berberidaceae

十大功勞屬 *Mahonia* Nutt.

闊葉十大功勞

†***Mahonia bealii** (Fort.) Carr.
習性：常綠灌木。花期：8-10 月。
產地：公園栽培。
分佈：秦嶺至大別山以南和四川、貴州以東
各省區。
用途：觀賞、藥用。

十大功勞 Chinese Mahonia

†***Mahonia fortunei** (Lindl.) Fedde
習性：常綠灌木。花期：6-10 月。
產地：公園栽培。
分佈：湖北、四川。
用途：觀賞、藥用。

海島十大功勞

Mahonia oiwakensis Hayata

習性：常綠灌木。花期：6-9 月。
產地：大東山。生於林下、溪邊。
分佈：臺灣。

用途：觀賞、藥用。

南天竺屬 *Nandina* Thunb.

南天竺 Sacred Bamboo

***Nandina domestica** Thunb.

習性：常綠灌木。花期：6-9 月；果期：冬
季。
產地：公園栽培。
分佈：中南和華東各省區。
用途：觀賞、藥用。

33. 大血藤科

Sargentodoxaceae

大血藤屬 *Sargentodoxa* Rehd. &
Wils.

大血藤 (千年健) *Sargent gloryvine*

Sargentodoxa cuneata (Oliv.) Rehd. & Wils.
(*Holboellia cuneata* Oliv.)

習性：木質藤本。花期：春季。
產地：黃泥涌、梧桐寨、柏架山。生於林下、
溪邊。
分佈：陝西以南各省區。老撾、越南。
用途：藥用、纖維。

34. 木通科 Lardizabalaceae

木通屬 *Akebia* Decne.

木通 Fiveleaf Akebia

†**Akebia quinata** (Thunb.) Decne.

習性：木質藤本。花期：3 月。
產地：柏架山。生於山坡灌叢。
分佈：陝西以南、四川以東各省區。
用途：藥用、食用。

白木通 Austral Akebia

†**Akebia trifoliata** var. **australis** (Diels)
Rehd.

習性：木質藤本。花期：春夏。
產地：大帽山、荃錦公路(石崗)、馬鞍山。
生於灌叢。
分佈：陝西以南至廣東、廣西。
用途：食用、藥用、油料。

野木瓜屬 *Stauntonia* DC.

野木瓜 (華野木瓜) Chinese Stauntonia

Stauntonia chinensis DC. (*Stauntonia hexaphylla* auct. non Decne.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：木質藤本。花期：春季。
產地：香港島、大帽山。生於林下。
分佈：海南、廣東、廣西、雲南、貴州、湖南、江西、福建、浙江、安徽。
用途：藥用。

倒卵葉野木瓜 *Ovate-leaf Stauntonia*

Stauntonia obovata Hemsl.

習性：木質藤本。花期：2-3 月。
產地：香港島、大帽山。生於灌叢或林中。
分佈：廣東、臺灣。

35. 防已科 *Menispermaceae*

木防已屬 *Cocculus* DC.

木防已 *Snail seed*

Cocculus orbiculatus (L.) DC.

習性：藤本。花期：4-8 月；果期：8-10 月。
產地：香港各地。生於灌叢中。
分佈：除西北地區外幾全國分佈。亞洲東南部、東部及夏威夷群島。

輪環藤屬 *Cyclea* Arn. ex Wight

粉葉輪環藤

Cyclea hypoglauca (Schauer) Diels

習性：藤本。花期：5-7 月；果期：8-10 月。
產地：薄扶林、黃泥涌、大潭、扯旗山、高信山、城門、馬鞍山、青衣。生於灌叢中。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南東部、湖南南部、江西中部和福建。越南。

秤鉤風屬 *Diploclisia* Miers

蒼白秤鉤風 (防已) *Glaucous Diploclisia*

Diploclisia glaucescens (Blume) Diels

習性：木質藤本。花期：4 月；果期：8 月。
產地：柏架山、鶴咀、灣仔、大埔滘、大嶼山。生於林中。

分佈：海南、廣東東部及南部、廣西西部至南部、雲南南部至東南部。

用途：藥用。

夜花藤屬 *Hypserpa* Miers

夜花藤 *Shining Hypserpa*

Hypserpa nitida Miers

習性：木質藤本。花果期：5-8 月。
產地：香港各地。生於林中或林緣。
分佈：海南、福建南部、廣東南部、廣西、雲南南部。
用途：藥用。

細圓藤屬 *Pericampylus* Miers

細圓藤 (豬菜藤)

Pericampylus glaucus (Lam.) Merr.

習性：木質藤本。花期：4-6 月；果期：9-10 月。
產地：掃桿埔、大坑、金馬倫山、大埔。生於林中、林緣和灌叢中。
分佈：華南、華東及西南各省區。亞洲東南部。
用途：編織器具。

千金藤屬 *Stephania* Lour.

糞箕篤 *Long Stephania*

Stephania longa Lour. (*Stephania hermandifolia* auct. non Walp.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：藤本。花期：4-6 月；果期：8-10 月。
產地：香港仔、大埔滘、馬鞍山、上水、大網仔、橫洲。生於灌叢中或林緣。
分佈：海南、廣東、廣西、雲南東南部、福建、臺灣。

粉防已 (石蟾蜍) *Four-stamen Stephania*

Stephania tetrandra S. Moore.

習性：藤本。花期：6-8 月；果期：8-10 月。
產地：梧桐寨、高流灣。生於空曠路邊、灌叢中。

分佈：海南、廣東、廣西、江西、湖南、福建、安徽、浙江、臺灣。

用途：藥用。

青牛膽屬 *Tinospora* Miers

青牛膽 *Arrowshaped Tinospora*

Tinospora sagittata (Oliv.) Gagnep.

習性：藤本。花期：4-5 月；果期：7-8 月。
產地：西貢、柏架山。生於林下、林緣、竹

林及草地上。

分佈：海南、廣東、廣西、福建、江西、湖南、貴州、四川、西藏、陝西、湖北。越南北部。

中華青牛膽（寬筋藤） Chinese *Tinospora*
Tinospora sinensis (Lour.) Merr.

習性：藤本。花期：4月；果期：5-6月。
產地：鶴咀、大網仔、茅坪、榕樹澳、平洲、青洲。生於林中。

分佈：廣東南部、廣西和雲南南部。斯里蘭卡、印度、越南、泰國。

用途：藥用。

37. 清風藤科 **Sabiaceae**

泡花樹屬 *Meliosma* Blume

香皮樹（福氏泡花樹） Ford's *Meliosma*
Meliosma fordii Hemsl.

習性：喬木。花期：5-7月；果期：8-10月。
產地：大埔滘。生於林中。

分佈：海南、廣東、廣西、貴州、雲南、湖南、江西、福建。越南、老撾、柬埔寨、泰國。

用途：藥用。

筆羅子（筆實子） Stiff-leaf *Meliosma*

Meliosma rigida Sieb. & Zucc. (*Meliosma*
patens Hemsl.)

習性：喬木。花期：夏季；果期：9-10月。
產地：香港島、清水灣、大埔滘、大刀岩、大帽山、大嶼山。生於林中。

分佈：廣東、海南、廣西、貴州、雲南、湖南、湖北、江西、福建、浙江、臺灣。日本。

樟葉泡花樹（綠樟） Chinese *Meliosma*

Meliosma squamulata Hance

習性：小喬木。花期：夏季；果期：9-10月。
產地：扯旗山、大帽山、梧桐寨、馬鞍山、大東山。生於常綠闊葉林中。

分佈：海南、廣東、廣西、貴州、湖南、江西、福建、臺灣。日本琉球。

用途：木材供建築用。

山欒葉泡花樹

†***Meliosma thorellii*** Lec.

習性：喬木。花期：夏季；果期：10-11月。
產地：大帽山。生於林中。

分佈：福建、海南、廣東、廣西、貴州、雲南。越南、老撾。

清風藤屬 *Sabia* Colebr.

檸檬清風藤（清風藤）

Sabia limonacea Wall. ex Hook. f. & Thoms.

習性：攀援木質藤本。花期：8-11月；果期：1-5月。

產地：香港各地。生於林中。

分佈：福建、海南、廣東、廣西、雲南西南部。

尖葉清風藤

†***Sabia swinhoei*** Hemsl.

習性：攀援藤本。花期：3-4月；果期：7-9月。

產地：飛鵝山、大帽山、大東山。生於山谷、林緣、灌叢。

分佈：海南、廣東、廣西、貴州、四川、湖北、湖南、江西、江蘇、浙江、福建、臺灣。

38. 罌粟科 **Papaveraceae**

薊罌粟屬 *Argemone* L.

罌粟屬 *Papaver* L.

虞美人 Corn Poppy

†****Papaver rhoeas*** L.

習性：草本。花期：3-5月。

產地：栽培觀賞。

分佈：全國南北各省區。廣佈於亞洲、非洲、大洋洲。

用途：觀賞。

39. 荷包牡丹科

Fumariaceae

紫堇屬 *Corydalis* DC.

臺灣黃堇 Taiwan *Corydalis*

†***Corydalis balansae*** Prain (*Corydalis*
tashiroi Makino)

習性：草本。花果期：3-7 月。
產地：大嶼山（東涌）。生於林下。
分佈：華南、華東、西南各省區。日本、越南。

44. 懸鈴木科 *Platanaceae*

懸鈴木屬 *Platanus* L.

二球懸鈴木 *London Planetree*

**Platanus × acerifolia* (Ait.) Willd.

習性：落葉喬木。
產地：庭園栽培。
分佈：亞熱帶和溫帶各地庭園廣泛栽培。原產地不詳，是 *P. occidentalis* 和 *P. orientalis* 的雜交種。
用途：綠化樹種。

45. 金縷梅科 *Hamamelidaceae*

蕁樹屬 *Altingia* Noronha

蕁樹（阿丁楓、山荔枝）*Mountain Litchi*
Altingia chinensis (Champ.) Oliver ex Hance
習性：喬木。花期：3-4 月。
產地：馬鞍山、香港島、八仙嶺、石板潭。生於林中。
分佈：海南、廣東、廣西、貴州、雲南、湖南、福建、江西、浙江。越南。
用途：材用、藥用。

細柄蕁樹

†*Altingia gracilipes* Hemsl.
習性：喬木。花期：4-5 月。
產地：八仙嶺、烏蛟騰、南涌。生於林中。
分佈：廣東、福建、浙江。
用途：藥用。

細齒蕁樹

Altingia gracilipes var. *serrulata* Tutcher
習性：喬木。花期：4-5 月。
產地：烏蛟騰。生於林中。
分佈：廣東、福建。
用途：藥用。

蚊母樹屬 *Distylium* Sieb. & Zucc.

蚊母樹

Distylium racemosum Sieb. & Zucc.

習性：灌木或小喬木。花期：4-5 月。
產地：香港島、馬鞍山、大帽山、東涌、鳳凰山。生於林中。
分佈：海南、廣東、福建、浙江、臺灣。朝鮮、日本琉球。

秀柱花屬 *Eustigma* Gardn. & Champ.

秀柱花 *Oblong-leaved Eustigma*

Eustigma oblongifolium Gardn. & Champ.
習性：灌木或小喬木。花期：1-2 月。
產地：香港島、大帽山、大嶼山。生於林中。
分佈：海南、廣東、廣西、貴州、江西、福建、臺灣。

馬蹄荷屬 *Exbucklandia* R. W. Brown

大果馬蹄荷

Exbucklandia tonkinensis (Lec.) Steenis
習性：喬木。花期：4-8 月。
產地：大東山。生於林中。
分佈：海南、廣東、廣西、雲南、湖南、江西、福建。越南。

楓香屬 *Liquidambar* L.

楓香 *Sweet Gum*

Liquidambar formosana Hance
習性：落葉喬木。花期：4-6 月。
產地：香港島。栽種或生於林中。
分佈：華南、西南、華東、華中。越南。
用途：藥用。

欖木屬 *Loropetalum* R. Brown

欖木（紙末花） *Strap Flower*

Loropetalum chinense (R. Brown) Oliver
習性：落葉灌木或小喬木。花期：3-5 月。
產地：大嶼山、城門、青山、北角、大嶼山。生於灌叢。
分佈：我國長江流域以南至北回歸線附近。日本、印度。
用途：藥用、觀賞。

紅花欖木

†**Loropetalum chinense* f. *rubrum* H. T.

Chang

習性：灌木。花期：3—5月。

產地：公園栽培。

分佈：湖南、江西。

用途：觀賞。

紅花荷屬 *Rhodoleia* Champ. ex
Hook. f.

紅花荷 (吊鐘王) *Rhodoleia*

Rhodoleia championii Hook. f.

習性：喬木。花期：3-4月。

產地：聶高信山、金馬倫山、香港仔。生於林中。

分佈：廣東。

用途：觀賞。

水絲梨屬 *Sycopsis* Oliver

尖葉水絲梨

†***Sycopsis dunnii*** Hemsl.

習性：灌木或小喬木。花期4-5月。

產地：大帽山。生於林中。

分佈：廣東、廣西、貴州、雲南、湖南、江西、福建。

鈍葉水絲梨 (廣東水絲梨) Tutchér's Fig hazel

Sycopsis tutcherii Hemsl.

習性：灌木或小喬木。花期4-5月。

產地：大嶼山。生於林中。

分佈：海南、廣東、福建。

四藥門花屬 *Tetrathyrium* Benth.

四藥門花

Tetrathyrium subcordatum Benth.

習性：灌木或小喬木。花期：9-10月。

產地：渣甸山、寶雲道、黃龍坑。生於林中。

分佈：廣東、廣西。

47. 交讓木科

Daphniphyllaceae

交讓木屬 *Daphniphyllum* Blume

牛耳楓

Daphniphyllum calycinum Benth.

習性：常綠灌木。花期：5-8月；果期：10-12月。

產地：香港各地。生於疏林下、灌叢中。

分佈：廣東、廣西、貴州、湖南、江西、福建。日本。

虎皮楠 (交讓木)

Daphniphyllum oldhami (Hemsl.) Rosenth.

(*Daphniphyllum glaucescens* auct. non Blume: Check List HK Pl. 1993.)

習性：常綠喬木。

產地：香港各地。生於山谷溪邊。

分佈：長江以南各省區。朝鮮，日本。

51. 榆科 **Ulmaceae**

糙葉樹屬 *Aphananthe* Planch.

糙葉樹 Scabrous *Aphananthe*

†***Aphananthe aspera*** (Thunb.) Planch.

習性：落葉喬木。花期：3-5月；果期：8-10月。

產地：沙頭角。生於林中。

分佈：華南、華東、西南和湖北、山西等省區。朝鮮、日本和越南。

滇糙葉樹 (坡命工) Smallleaf *Gironniera*

Aphananthe cuspidata (Blume) Planch.

[*Galumpita cuspidata* Bo.; *Gironniera cuspidata* (Blume) Kurz; *Gironniera nitida* Benth.]

習性：喬木。花期：3-4月與9-11月；果期：7-9月與11-12月。

產地：香港島、沙田、大埔、林村、大嶼山。生於林中。

分佈：海南、廣東和雲南。印度、斯里蘭卡、越南、泰國、緬甸、馬來西亞和印度尼西亞。

朴屬 *Celtis* L.

紫彈朴 Biond Hackberry

†***Celtis biondii*** Pamp.

習性：落葉喬木。花期：4-5月；果期：9-10月。

產地：香港島、坪洲。生於林中。

分佈：華南、華東、華中、西南和甘肅、陝西等省區。日本、朝鮮。

朴樹 Chinese Hackberry

Celtis sinensis Pers. [*Celtis tetrandra* subsp.]

sinensis (Pers.) Y.C. Tang]

習性：落葉喬木。花期：3-4 月；果期：9-10 月。

產地：香港各地。生於疏林中。

分佈：華南、華東、華中、西南等省區。

用途：材用；根皮、葉藥用；莖纖維可代麻和造紙用；果可食；種子油供工業用。

假玉桂 (樟葉朴) Philippine Hackberry

Celtis timorensis Span. (*Celtis philippinensis* auct. non Blanco: Check List HK. Pl. 38. 1993.)

習性：常綠喬木。花期：3-5 月。

產地：香港島、沙田、城門、林村、大嶼山。

分佈：西藏、雲南、貴州、廣西、福建和臺灣。東亞。

用途：莖皮纖維可供造人造棉；材用；種子油工業用；葉供牛馬飼料。

白顏樹屬 *Gironniera* Gaudich.

白顏樹 Subaequal *Gironniera*

Gironniera subaequalis Planch. (*Gironniera chinensis* Benth.)

習性：常綠喬木。花期：2-4 月；果期：7-11 月。

產地：香港島、大圍、大埔滘、林村、上禾坑、新娘潭。

分佈：廣東、廣西、雲南。中南半島、泰國、緬甸、斯里蘭卡、馬來西亞、印度尼西亞。

用途：材用、葉藥用。

山黃麻屬 *Trema* Lour.

異色山黃麻 India-Charcoal *Trema*

†***Trema orientalis*** (L.) Blume (*Celtis orientalis* L.)

習性：小喬木。花期：3-5 月；果期：6-11 月。

產地：石崗。

分佈：華南、西南和福建、臺灣等省區。喜馬拉雅南坡、印度、斯里蘭卡、孟加拉、緬甸、中南半島、馬來半島、印度尼西亞、菲律賓、日本、波利尼西亞、澳大利亞至熱帶非洲廣泛分佈。

用途：莖皮可代纖維，供造紙、紡織，材用；根、葉藥用；種子油供工業用。

山黃麻 India-Charcoal *Trema*

Trema tomentosa (Roxb.) Hara [*Trema orientalis* auct. non (L.) Blume: Check List HK. Pl. 1993.]

習性：小喬木或灌木。花期：12 月；果期：次年 4 月。

產地：香港各地。

分佈：西藏、四川、雲南、貴州、廣西、海南、廣東、福建、臺灣。錫金、不丹、尼泊爾、印度、斯里蘭卡、孟加拉、緬甸、中南半島、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓、日本和南太平洋諸島。

用途：纖維、材用、藥用。

52. 大麻科 **Cannabidaceae**

大麻屬 *Cannabis* L.

大麻 Hemp

****Cannabis sativa*** L.

習性：草本。花期：8-11 月。

產地：栽培。

分佈：中國各地栽培。原產亞洲西部。

用途：纖維、油料、藥用。

葎草屬 *Humulus* L.

葎草 Japanese Hop

****Humulus japonicus*** Sieb. & Zucc.

(*Humulus scandens* (Lour.) Merr.)

習性：草本。花期：夏、秋季。

產地：西貢。生於村旁路邊。

分佈：除新疆、青海外，各地均有。俄羅斯（亞洲地區）、日本、朝鮮、越南。

53. 桑科 **Moraceae**

桂木屬 *Artocarpus* J. R. & J. G. A. Forster

麵包樹 Breadfruit

****Artocarpus altilis*** (Park.) Fosb. [*Artocarpus communis* J. R. & J. G. A. Forster; *Artocarpus incisa* (Thunb.) L. f.]

習性：喬木。花期：春、夏季。

產地：公園栽培。
分佈：海南有栽培。原產波利尼西亞，熱帶地區栽培。
用途：食用、材用、纖維。

白桂木 Silverback Artocarpus

Artocarpus hypargyreus Hance

習性：喬木。花期：5-8月；果期：6-8月。
產地：香港島、大帽山、馬鞍山、大嶼山。生於林中，路邊。
分佈：海南、廣東、廣西、雲南、湖南、江西、福建。
用途：材用、食用。

菠蘿蜜 Jack fruit

***Artocarpus macrocarpus** Dancer [*A. heterophyllus* Lam.; *A. integer* (Thunb.) Merr.]

習性：喬木。花期：春、夏季；果期：夏、秋季。
產地：果園、庭園及公園栽培。
分佈：海南、廣東、廣西、雲南、福建有栽培。原產印度；熱帶地區廣泛栽培。
用途：食用、材用、藥用。

桂木（紅桂木） Lingnan Artocarpus

***Artocarpus nitidus** subsp. **lingnanensis** (Merr.) Jarr. (*Artocarpus lignanensis* Merr.)

習性：喬木。花期：3-5月；果期：5-9月。
產地：引種栽培種植。
分佈：海南、廣東、廣西、雲南、四川東部、泰國、越南、柬埔寨。
用途：材用、食用。

二色菠蘿蜜 Bicolor Artocarpus

†**Artocarpus styracifolius** Pierre

習性：喬木。花期：6-8月；果期：8-12月。
產地：馬鞍山、大埔、烏蛟騰。生於林中。
分佈：海南、廣東、廣西、雲南、貴州、越南、老撾。
用途：材用、食用。

胭脂樹 Tonkin Artocarpus

Artocarpus tonkinensis A. Chev. ex Gagnep.

習性：喬木。花期：夏、秋季；果期：秋冬季。

產地：城門、大埔、林村、荔枝窩。生於林中。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、貴州、福建、越南、柬埔寨。

用途：材用、食用。

構屬 **Broussonetia** L'Hérit. ex Vent.

藤構（葡蟠） Vine **Broussonetia**

†**Broussonetia kaempferii** var. **australis** Suzuki (*Broussonetia kaempferi* auct. non Sieb. & Zucc.: Check List HK Pl.1993.)

習性：蔓生藤狀灌木。花期：2-6月；果期：3-7月。

產地：大嶼山、香港島、沙田、蠔涌、大帽山、新娘潭、大埔滘。生於山邊、灌叢。

分佈：陝西以南各省區。朝鮮、日本、越南。
用途：纖維、藥用。

構樹 Paper Mulberry

Broussonetia papyrifera (L.) L'Hérit. ex Vent.

習性：喬木。花期：3-5月；果期：4-8月。
產地：香港島，新界。生於路旁、曠野、林中。
分佈：山西以南各省區。日本、印度、越南。
用途：纖維、油料、栲膠、藥用、材用。

柘屬 **Cudrania** Tréc

構棘（蓑芝） **Cochinchina Cudrania**

Cudrania cochinchinensis (Lour.) Kudo & Masamune [*Maclura cochinchinensis* (L.) Corner; *Cudrania rectispina* Hance]

習性：直立或攀援狀灌木。花期：4-7月；果期：5-11月。

產地：香港島、西貢、大坳門、大埔、大帽山、馬鞍山、大嶼山。生於曠野灌叢或林中、村邊。

分佈：中國西南部至東南部。非洲東部、亞洲東部、南部和東南部至澳大利亞、新喀里多尼亞。

用途：藥用、纖維、食用、染料。

柘樹 *Tricuspid Cudrania*

Cudrania tricuspidata (Carr.) Bureau ex Lavallée

習性：灌木或喬木。花期：夏初；果期：夏、秋季。

產地：粉嶺。生於灌叢。

分佈：河北以南各省區。朝鮮、日本、越南。

用途：葉供養蠶、纖維、藥用、材用、食用。

木蛇麻屬 *Fatoua* Gaudich.

水蛇麻（桑草） *Villous Fatoua*

Fatoua villosa (Thunb.) Nakai (*Fatoua pilosa* auct. non Gaudich.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：草本。花果期：春末至秋季。

產地：銅鑼灣。生於路邊、水邊。

分佈：河南以南各省區。亞洲東部、東南部至澳大利亞、新喀里多尼亞。

榕屬 *Ficus* L.

高山榕（雞榕） *Lofty Fig*

Ficus altissima Blume (*Ficus benghalensis* auct. non L.: Check List HK 1993.)

習性：喬木。花果期：3-10月。

產地：灣仔、堅道。生於林中、林緣；栽培或野生。

分佈：西藏、雲南、廣西、海南、廣東。亞洲南部至東南部。

用途：觀賞、紫膠蟲寄主樹。

垂葉榕

****Ficus benjamina*** L.

習性：喬木。花期：11月。

產地：栽培。

分佈：華南至西南。亞洲南部至大洋洲。

用途：行道樹。

無花果 *Edible Fig*

****Ficus carica*** L.

習性：灌木或喬木。花果期：5-11月。

產地：庭園栽培。

分佈：中國各地栽培。原產亞洲西部至地中海地區，現廣植於全世界的溫暖地

區。

用途：食用、藥用。

雅榕

†***Ficus concinna*** (Miq.) Miq.

習性：喬木。花果期：5-10月。

產地：馬鞍山村。

分佈：廣東、廣西、福建、雲南。

印度榕（印度橡樹） *Caoutchuc*

****Ficus elastica*** Roxb.ex Hornem

習性：喬木。花果期：9-11月。

產地：引種栽培。

分佈：中國西南部至南部栽培。原產錫金、印度東北部、緬甸、馬來西亞北部、印度尼西亞（蘇門答臘、爪哇）；現熱帶、亞熱帶地區廣泛栽培。

用途：汁液可製橡膠、觀賞。

天仙果 *Fairy Fig*

Ficus erecta var. ***beeheyana*** (Hook. & Arn.)

King

習性：灌木或小喬木。花果期：4-9月。

產地：香港島、塔門、大帽山、大嶼山。生於溝邊、山旁的林中或灌叢。

分佈：中國中部以南，西南部至東南部。日本、越南。

黃毛榕（馬鞍天仙果） *Fulvous Fig*

Ficus esquiroliana Lévl.

習性：灌木或小喬木。花果期：5-11月。

產地：馬鞍山、大帽山、梧桐寨、打鐵崗。生於山谷或溪邊林中。

分佈：海南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、西藏、福建。亞洲南部至東南部。

水同木 *Common Yellow Stem-fig*

Ficus fistulosa Reinw. ex Blume (*Ficus harlandii* Benth.)

習性：喬木。花果期：3-12月。

產地：香港各地。生於山谷溪邊林中。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、福建、臺灣。亞洲南部至東南部。

臺灣榕 *Taiwan Fig*

†**Ficus formosana** Maxim.

習性：灌木。花果期：3-12 月。
產地：大帽山、沙田、大埔、林村、梧桐寨、粉嶺、茅坪、荔枝窩、烏蛟騰、。生於曠野、山地林中。
分佈：海南、廣東、廣西、湖南、江西、福建、臺灣。越南。

窄葉臺灣榕 Narrow-leaf Taiwan Fig

†**Ficus formosana** var. **shimadai** (Hayata) W. C. Chen

習性：灌木。花果期：3-12 月。
產地：大帽山、大埔滘。生於曠野、山地林中。
分佈：海南、廣東、廣西、貴州、江西、福建、臺灣。越南。

藤榕 (爬牆榕) Climbing Fig

Ficus hederacea Roxb. (*Ficus repens* Hort.)
習性：木質攀援藤本。花果期：2-7 月。
產地：香港島、城門、大埔滘。生於林中、岩石上；亦有栽培。
分佈：海南、廣東、廣西、貴州、雲南、西藏。亞洲南部至東南部。

粗葉榕 (牛奶仔) Hairy Fig

Ficus hirta Vahl
習性：灌木或小喬木。花果期：全年。
產地：香港各地。生於林中、灌叢、村邊、水邊。
分佈：中國西南部至東南部。亞洲南部至東南部。
用途：藥用。

對葉榕 (牛乳樹) Opposite-leaf Fig

Ficus hispida L. f.
習性：灌木或小喬木。花果期：5-10 月。
產地：香港各地。生於曠野、水旁、灌叢。
分佈：廣東、廣西、貴州、雲南。亞洲南部、東南部至澳大利亞。
用途：藥用。

青藤公 Langkoken Fig

Ficus langkokensis Drake
習性：喬木。花果期：2-9 月。

產地：馬鞍山、烏蛟騰、荔枝窩。生於山谷、溝邊林中。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、四川、福建。印度、老撾、越南。

榕樹 (細葉榕) Smallfruit Fig

Ficus microcarpus L. f.
習性：喬木。花果期：5-12 月。
產地：香港各地。生於林中、曠地、路邊；野生或栽培。
分佈：中國西南部、南部至東南部。亞洲南部、東南部至大洋洲。
用途：園林和行道樹、藥用。

九丁樹 (凸葉榕) Veined Fig

Ficus nervosa Heyne ex Roth
習性：喬木。花果期：3-12 月。
產地：香港島、馬鞍山、梅子林、鹽灶下、大嶼山。生於林中、路旁。
分佈：中國西南部、南部至東南部。印度、斯里蘭卡、緬甸、越南。
用途：材用。

琴葉榕 Fiddleleaf Fig

Ficus pandurata Hance
習性：灌木。花果期：3-11 月。
產地：鶴咀。生於山野、村邊。
分佈：中國西南部、南部至東南部。越南。

全緣琴葉榕 Entire Fig

Ficus pandurata var. **holophylla** Migo
習性：灌木。花果期：3-11 月。
產地：新界。生於山野、村邊。
分佈：中國西南部、南部至東南部。

薜荔 (文頭郎) Creeping Fig

Ficus pumila L.
習性：攀援木質藤本。花果期：4-12 月。
產地：香港各地。生於曠野、村邊殘垣斷壁或樹上。
分佈：長江以南各省區。日本、印度、越南。
用途：食用、藥用。

舶梨榕 Pearfruit Fig

Ficus pyriformis Hook. & Arn.

習性：灌木。花果期：2-11 月。
產地：香港島、大帽山、大埔、鹿頸、大嶼山。生於溝邊、灌叢。
分佈：海南、廣東、廣西、雲南、四川、福建。越南。

菩提樹 Peepul Tree

***Ficus religiosa** L.

習性：喬木。花果期：2-6 月。
產地：公園及行道種植。
分佈：海南、廣東、廣西、雲南栽培。原產印度。
用途：園林觀賞、藥用、材用、汁液可製改性膠。

心葉榕 (假菩提樹) Mock Bodh Tree

***Ficus rumphii** Blume

習性：喬木。花果期：5-9 月。
產地：公園及街道種植。
分佈：雲南、印度、緬甸、越南、馬來西亞、印度尼西亞。
用途：觀賞。

羊乳榕 (箭葉榕) Arrowleaf Fig

Ficus sagittata Vahl

習性：喬木。花果期：3-12 月。
產地：香港有記錄。生於林中。
分佈：海南、廣東、廣西、貴州。亞洲南部至大洋洲。

爬藤榕 (凹葉榕) Impressed Sarmentosa Fig

Ficus sarmentosa var. **impressa** (Champ. ex Benth.) Corner (*Ficus impressa* Champ. ex Benth.)

習性：攀援灌木。花果期：5-12 月。
產地：香港島、大嶼山、大蚊山、大帽山。生於林中、灌叢。
分佈：河北以南各省區。印度、越南。

裂掌榕 Hispid Fig

†**Ficus simplicissima** Lour.

習性：灌木。花果期：4-12 月。
產地：羅湖。生於林中。
分佈：海南。越南、柬埔寨。

假斜葉榕 Sea Fig

Ficus subulata Blume

習性：灌木或攀援灌木。花果期：2-11 月。
產地：香港島、大帽山、林村谷、梧桐寨、馬鞍山、茅坪、烏蛟騰、沙頭角。生於林中。
分佈：西藏、雲南、貴州、廣西、海南、廣東、臺灣。不丹、錫金、馬來西亞、印度尼西亞。

筆管榕 Japan superb Fig

Ficus superba var. **japonica** Miq.

習性：喬木。花果期：2-9 月。
產地：香港各地。生於曠野或林中。
分佈：中國南部、西南部至東南部。亞洲東部、南部至東南部。

斜葉榕 (水榕) Humped Fig Tree

Ficus tinctoria subsp. **gibbosa** (Blume) Corner (*Ficus gibbosa* Blume)

習性：喬木。花果期：4-10 月。
產地：馬鞍山、大埔、元朗、逢吉鄉、屯門、上水、沙頭角。生於林中、村邊；野生或栽培。
分佈：海南、廣東、廣西、雲南、貴州、福建、臺灣。亞洲南部至大洋洲。
用途：材用、紫膠蟲寄主樹、觀賞。

三角榕 Triangular Fig

†***Ficus triangularis** Warb.

習性：喬木。花果期：2 月。
產地：公園栽培。
分佈：原產熱帶非洲。
用途：觀賞。

青果榕 Red-stem Fig

Ficus variegata var. **chlorocarpa** (Benth.) King (*Ficus chlorocarpa* Benth.)

習性：灌木或喬木。花果期：5-12 月。
產地：香港各地。生於林中。
分佈：海南、廣東、廣西、雲南、福建。泰國、越南。
用途：觀賞、食用、紫膠蟲寄主樹。

變葉榕 Variedleaf Fig

Ficus variolosa Lindl. ex Benth.

習性：灌木或喬木。花果期：2-12月。

產地：香港各地。生於灌叢或林中。

分佈：中國南部、西南部至東南部。老撾、越南。

白肉榕 White Fig

Ficus vasculosa Wall. ex Miq.

習性：灌木或喬木。花果期：2-12月。

產地：香港島、大埔滘、沙田、深涌、沙頭角。生於林中。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、貴州。泰國、老撾、越南、馬來西亞。

用途：材用。

黃葛樹 (大葉榕) Bigleaf Fig

Ficus virens var. **sublanceolata** (Miq.) Corner.

習性：喬木。花果期：4-10月。

產地：多見於公園或行道種植。

分佈：中國西南部、南部至東南部。亞洲南部至大洋洲。

用途：行道樹、材用、藥用、紫膠蟲寄主樹。

牛筋藤屬 *Malaisia* Blanco

牛筋藤 Strength-vine

†**Malaisia scandens** (Lour.) Planch.

習性：攀援藤狀灌木。花期：3-5月；果期：5-11月。

產地：文錦渡、大澳、二澳、分流、水口、塘福、大鴉洲。生於灌叢或林中，常攀附在樹上或岩石上。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、臺灣。亞洲東南部至澳大利亞。

用途：纖維。

桑屬 *Morus* L.

桑 White Mulberry

Morus alba L.

習性：灌木或喬木。花果期：2-8月。

產地：香港島、新界、大嶼山。多見於林邊或庭園栽培。

分佈：中國各地。朝鮮、日本、中亞、歐洲等地栽培。

用途：養蠶、食用、纖維、藥用。

55. 蕁麻科 *Urticaceae*

苧麻屬 *Boehmeria* Jacq.

水苧麻 Bigleaf Falsenettle

Boehmeria macrophylla Hornem.
(*Boehmeria platyphylla* D. Don)

習性：草本或亞灌木。

產地：歌賦山、扯旗山。生於山谷林下或溝邊。

分佈：廣東、海南、廣西、雲南、西藏。印度、尼泊爾、緬甸、越南。

用途：纖維。

糙葉水苧麻

†**Boehmeria macrophylla** var. **scabrella** (Roxb.) Long [*Boehmeria platyphylla* D. Don & var. *scabrella* (Roxb.) Wedd.]

習性：亞灌木。花期：7-9月。

產地：芬梨道。

分佈：廣東、廣西、雲南、西藏。越南、緬甸、尼泊爾、印度。

用途：獸藥、纖維。

苧麻 Ramie

***Boehmeria nivea** (L.) Gaudich.

習性：亞灌木或灌木。

產地：栽培或逸為野生。

分佈：長江以南各地常有。越南、老撾。

用途：纖維、藥用。

貼毛苧麻 Japanese Boehmeria

†**Boehmeria nivea** var. **nipponivea** (Koidz.) W. T. Wang

習性：亞灌木。

產地：井欄樹村。

分佈：廣東、福建、安徽可能有野生，廣東、海南、江西、臺灣、浙江等地有栽培。日本。

用途：纖維。

青葉苧麻 Virid-leaf Boehmeria

†***Boehmeria nivea** var. **tenacissima** (Gaudich) Miq.

習性：亞灌木。

產地：香港動植物公園栽培。

分佈：廣東、廣西、浙江、臺灣、安徽。野生或栽培。

用途：纖維。

密花苧麻 Denseflower Falsenettle

Boehmeria penduliflora var. **loochooensis**
(Wedd.) W.T. Wang (*Boehmeria densiflora* Hook. & Arn.)

習性：灌木。

產地：司徒拔道、盧吉道、薄扶林。

分佈：廣東、臺灣。日本、菲律賓。

糯米團屬 *Gonostegia* Turcz.

糯米團 Hairy *Gonostegia*

Gonostegia hirta (Blume) Miq. [*Memoralis hirta* (Blume) Wedd.]

習性：多年生草本。花期：5-9月。

產地：香港各地。生於灌叢中或溝邊草叢中。

分佈：華南、西南、河南、陝西。亞洲熱帶至澳大利亞。

艾麻屬 *Laportea* Gaudich.

紅小麻 Wood Nettle

***Laportea bulbifera** Wedd. [*Laportea interrupta* (L.) Chew]

習性：一年生草本。花期：7-8月；果期：8-9月。

產地：香港動植物公園。

分佈：臺灣、雲南。非洲及亞洲西南部至東南部、太平洋島嶼。

紫麻屬 *Oreocnide* Miq.

紫麻 Shrubby Woodnettle

Oreocnide frutescens (Thunb.) Miq.

習性：灌木。花期：3-5月；果期：6-10月。

產地：柏架山。生於溝谷疏林或林緣濕潤處。

分佈：廣東、海南、廣西、湖南、湖北、江西、福建、雲南、四川、陝西、甘肅。中南半島、日本。

細梗紫麻 Thin Pedicel *Oreocnide*

†**Oreocnide frutescens** subsp. **insignis** C. J.

Chen

習性：灌木。

產地：大帽山、城門林道。生於疏林中。

分佈：廣東、廣西。

赤車屬 *Pellionia* Gaudich.

短葉赤車 Shortleaf *Pellionia*

Pellionia brevifolia Benth.

習性：多年生草本。花期：5-7月。

產地：歌賦山、大埔滘、大東山。生於林下或溝邊陰濕處。

分佈：廣東、海南、廣西、湖南、湖北、福建、江西。

華南赤車

†**Pellionia grijsii** Hance

習性：多年生草本。花期：冬季。

產地：香港有記錄。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、福建、江西。

花葉噴煙花 Satin *Pellionia*

***Pellionia pulchra** N. E. Brown

習性：草本。

產地：栽培。

分佈：原產越南。

用途：觀賞。

赤車 Rooted *Pellionia*

Pellionia radicans (Sieb. et. Zucc.) Wedd.

習性：多年生草本。

產地：香港。

分佈：海南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、湖南、湖北、江西、福建、臺灣。越南、朝鮮及日本。

吐煙花 Creeping *Pellionia*

***Pellionia repens** (Lour.) Merr. (*Pellionia daveauanana* N. E. Brown)

習性：多年生草本。花期：5-10月。

產地：香港動植物公園栽培。

分佈：海南、廣東、雲南。越南、老撾、柬埔寨。歐美亦有栽培。

蔓赤車 *Rough Pellionia*

Pellionia scabra Benth. [*Pellionia pellucida* auct. non (Raf.) Morr.: Check List HK Pl. 1993.]

習性：亞灌木至草本。花期：春、夏季。
產地：大帽山。生於林下溪邊或濕潤處。
分佈：海南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、湖南、江西、安徽、浙江、福建、臺灣。越南、日本。

冷水花屬 *Pilea* Lindl.

銳齒濕生冷水花

Pilea aquarum subsp. ***acutidentata*** C. J. Chen (*Pilea wightii* auct. non Wedd.: Check List HK Pl. 1993, p. p.)

習性：多年生草本。花期：3-5 月；果期：4-6 月。
產地：大帽山、大嶼山、紅花嶺。
分佈：廣東、廣西。

花葉冷水花 *Alluminum Plant*

****Pilea cadierei*** Gagnep. & Guill.

習性：多年生草本。
產地：公園及庭園栽培。
分佈：越南中部山區。
用途：觀賞。

紙質冷水花 *Wight's Clearweed*

Pilea chartacea C. B. Chen (*Pilea wightii* auct. non Wedd.: Check List HK Pl. 1993, p. p.)

習性：多年生草本。花期：3 月。
產地：大帽山。
分佈：廣東。

點乳冷水花 *Small Tooth Clearweed*

Pilea glaberrima (Blume) Blume (*Pilea scripta* auct. non Wedd.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：草本或亞灌木。花期：7-9 月；果期：10-11 月。
產地：大帽山。生於溝谷林下。
分佈：廣東、廣西、貴州、雲南。

小葉冷水花 *Artillery Clearweed*

****Pilea microphylla*** (L.) Liebm.

習性：一年生草本。花期：夏、秋季。

產地：歸化植物，現見於香港各地。

分佈：廣東、廣西、福建、浙江、臺灣歸化種。原產熱帶美洲。

用途：藥用，觀賞。

古錢冷水花 *Creeping Charlie*

****Pilea nummularifolia*** Wedd.

習性：多年生草本。
產地：嘉道理農場有栽培。
分佈：西印度群島、秘魯、巴拿馬。
用途：觀賞。

齒葉冷水花 *Serrateleaf Clearweed*

Pilea peploides var. ***major*** Wedd.

習性：一年生草本。花期：4-5 月；果期：5-7 月。
產地：香港動植物公園。生於蔭濕的石頭上。
分佈：廣東、廣西、貴州、湖北、湖南、江西、浙江、福建、安徽、臺灣。印度、錫金、緬甸、越南、印度尼西亞、日本、夏威夷群島。

用途：藥用。

三角冷水花 *Swingle's Clearweed*

Pilea swinglei Merr.

習性：一年生草本。
產地：大東山。生於溪邊及村旁蔭濕地。
分佈：廣東、廣西、貴州、湖南、湖北、江西、安徽、浙江、福建。

粗齒冷水花 *Roughtooth Clearweed*

Pilea sinofasciata C. J. Chen (*Pilea wrightii* auct. non Wedd.: Check List HK Pl. 1993, p. p.)

習性：一年生草本。花期：6-7 月；果期：8-10 月。
產地：大嶼山。生於溪邊。
分佈：廣東、廣西、貴州、湖南、湖北、江西、安徽、雲南、四川、陝西、甘肅。

霧水葛屬 *Pouzolzia* Gaudich.

霧水葛 *Ceylan Pouzolzia*

Pouzolzia zeylanica (L.) Benn.

習性：多年生草本。花期：秋季。
產地：香港各地。平地或丘陵地灌叢或草叢中。
分佈：廣東、海南、廣西、湖南、湖北、江西、福建、浙江、安徽、雲南、四川。熱帶亞洲。

藤麻屬 *Procris* Comm. ex Juss.

藤麻 *Crenate Procris*

†*Procris wightiana* Wall. ex Wedd. (*Procris laevigata* auct. non Blume: Check List HK Pl. 1993.)

習性：多年生肉質草本。
產地：大帽山、梧桐寨。生於疏林中石上或附於樹幹上。
分佈：廣東、海南、廣西、福建、臺灣、貴州、雲南、四川、西藏。非洲、亞洲西南經南部至東部。

59. 胡桃科 *Juglandaceae*

黃杞屬 *Engelhardtia* Leschen. ex Blume

黃杞 *Roxburgh Engelhardtia*
Engelhardtia roxburgiana Lindl.
(*Engelhardtia chrysolepis* Hance)

習性：常綠喬木。花期：5-7月；果期：9-10月。
產地：香港島、馬鞍山、大帽山、梧桐寨、大埔滘、井欄樹等地。
分佈：我國南部和西南各省區。中南半島。

白皮黃杞 *Fenzel Engelhardtia*

†*Engelhardtia fenzelii* Merr.
習性：常綠喬木。花期：5-7月；果期：9-10月。
產地：香港島、馬鞍山。
分佈：廣東、廣西、湖南、江西、福建、浙江。

楓楊屬 *Pterocarya* Kunth.

楓楊 *Chinese Wingnut*

**Pterocarya stenoptera* C. DC.
習性：落葉喬木。花期：4-5月；果期：9-10月。
產地：栽培。
分佈：長江流域以南各省區。

60. 楊梅科 *Myricaceae*

楊梅屬 *Myrica* L.

楊梅 *Strawberry Tree*

Myrica rubra (Lour.) Sieb. & Zucc.
習性：喬木。花期：3-4月；果期：5-6月。
產地：香港各地。生於林中。
分佈：長江流域以南各省區。越南、菲律賓、朝鮮、日本。
用途：食用、藥用。

63. 殼斗科 *Fagaceae*

栗屬 *Castanea* Mill.

栗 *Chinese chestnut*

†**Castanea mollissima* Blume
習性：落葉喬木。花期：5-6月；果期：9-11月。
產地：大龍農場、東涌地塘仔有栽培。
分佈：華北、華中、華南各省區。
用途：種子食用。

錐屬 *Castanopsis* (D. Don) Spach

米櫨 (小紅栲) *Carles Chinkapin*
Castanopsis carlesii (Hemsl.) Hayata
習性：常綠喬木。花期：3-6月；果期：翌年9-11月。
產地：大潭、扯旗山、烏蛟騰、大帽山、大嶼山。
分佈：長江以南各省區。

華南錐 (毛葉栲栗) *Hairy Chestnut*

Castanopsis concinna (Champ. ex Benth.) A. DC.
習性：常綠喬木。花期：4-5月；果期：翌年9-10月。
產地：深水灣、黃泥涌、跑馬地、西貢、大圍、大帽山。
分佈：廣東、廣西。
用途：材用。

甜櫨 (埃氏栲) *Eyer's Chinkapin*

Castanopsis eyrei (Champ.) Tutcher
習性：常綠喬木。花期：4-6月；果期：翌年9-10月。
產地：香港仔、中峽、黃泥涌。

分佈：除雲南、海南外，長江以南各省區。

羅浮錐（白椴）Faber's Chestnut

Castanopsis fabri Hance

習性：常綠喬木。花期：4-5 月；果期：翌年 9-11 月。

產地：薄扶林、大潭篤、扯旗山、灣仔峽、柏架山、大帽山、大嶼山。

分佈：長江以南大部份省區。越南。

用途：材用。

栲 Farge's Chinkapin

†**Castanopsis fargesii** Franch.

習性：常綠喬木。花期：4-6 月；果期：翌年 4-6 月。

產地：大帽山、（梧桐寨）。

分佈：長江以南各省區。

用途：材用。

鰲蒴錐（裂斗錐栗）

Castanopsis fissa (Champ. ex Benth.) Rehd. & Wils.

習性：常綠喬木。花期：4-5 月；果期：10-12 月。

產地：香港各地。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、貴州、湖南、江西、福建。

用途：速生植林樹種。

毛錐

†**Castanopsis fordii** Hance

習性：常綠喬木。花期：3-4 月；果期：翌年 9-10 月。

產地：馬鞍山、八仙嶺。

分佈：廣東、廣西、福建、湖南、江西、浙江。

吊皮錐 Greene's Chestnut

Castanopsis kawakamii Hayata
(*Castanopsis greenii* Chun)

習性：常綠喬木。花期：3-4 月；果期：翌年 8-10 月。

產地：沙田（烏蛟騰）。

分佈：廣東、廣西、江西、福建、臺灣。

鹿角錐（鐵錐樹）

Castanopsis lamontii Hance

習性：常綠喬木。花期：3-5 月；果期：翌年 9-11 月。

產地：扯旗山、薄扶林道、奇力山、柏架山、歌賦山、黃泥涌、大埔滘、打鐵崗、大嶼山。

分佈：廣東、廣西、雲南、貴州、湖南、江西、福建。

用途：材用。

苦櫛

Castanopsis sclerophylla (Lindl.) Schott.

習性：常綠喬木。花期：5-6 月；果期：10-12 月。

產地：花園道曾有記錄（標本採於 1949）。

分佈：長江以南、五嶺以北各地。

用途：種子食用。

青剛屬 *Cyclobalanopsis* Oerst.

檳榔青剛

†**Cyclobalanopsis bella** (Chun & Tsiang)
Chun ex Y. C. Hsu & H. W. Jen

習性：常綠喬木。花期：3 月；果期：10-12 月。

產地：大埔燕岩。

分佈：海南、廣東、廣西。

櫟子青剛（櫟子樹） Blake's Oak

Cyclobalanopsis blakei (Skan) Schott.
(*Quercus blakei* Skan)

習性：常綠喬木。花期：3 月；果期：10-12 月。

產地：新界、打鐵崗。

分佈：海南、廣東、廣西、貴州。

嶺南青剛 Champion's Oak

Cyclobalanopsis championii (Benth.) Oerst.
(*Quercus championii* Benth.)

習性：常綠喬木。花期：12 月至翌年 3 月；果期：11-12 月。

產地：扯旗山、聶高信山、馬鞍山、大帽山、大嶼山。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、福建、臺

灣。

福建青剛 Chung's Oak

†**Cyclobalanopsis chungii** (Metc.) Y. C. Hsu
& H. W. Jen ex Q. F. Zhang (*Quercus chungii* Metc.)

習性：常綠喬木。花期：5-6 月。

產地：青山、掃管笏。

分佈：廣東、廣西、湖南、江西、福建。

華南青剛 Thick-leaved Oak

Cyclobalanopsis edithiae (Skan) Schott.
(*Quercus edithae* Skan)

習性：常綠喬木。花期：4-6 月；果期：10-12 月。

產地：奇力山、西貢、大圍、打鐵崗（飛鵝山）。

分佈：海南、廣東、廣西、越南。

青剛 Blue Japanese Oak

†**Cyclobalanopsis glauca** (Thunb.) Oerst.
(*Quercus glauca* Thunb.)

習性：常綠喬木。花期：4-5 月；果期：10 月。

產地：石澳；鶴咀、薄扶林、馬鞍山。

分佈：陝西、甘肅和長江以南各省區。

用途：材用。

雷公青剛 Hu's Oak

†**Cyclobalanopsis hui** (Chun) Y. C. Hsu & H.
W. Jen

習性：常綠喬木。花期：4—5 月；果期：10—12 月。

產地：屏風山。

分佈：海南、廣東、廣西、湖南。

木薑葉青剛 Litsea Oak

Cyclobalanopsis litseoides (Dunn) Schott.
(*Quercus litseoides* Dunn)

習性：常綠喬木。花期：1 月；果期：12 月。

產地：大嶼山。

分佈：廣東、廣西南部。

小葉青剛 Small-leaved Oak

Cyclobalanopsis myrsinifolia (Blume) Oerst.
(*Quercus myrsinifolia* Blume)

習性：常綠喬木。花期：6 月；果期：翌年 10 月。

產地：香港各地。

分佈：陝西、河南和長江以南各省區。

用途：材用。

竹葉青剛 Bamboo-leaved Oak

Cyclobalanopsis neglecta Schott.
(*Cyclobalanopsis bambusifolia* Hance
ex Seem.)

習性：常綠喬木。花期：6 月；果期：10 月。

產地：歌賦山、聶高信山、大潭、灣仔峽。

分佈：海南、廣東、廣西。

用途：材用。

柯屬 *Lithocarpus* Blume

尖葉柯（尖尾石柯）

Lithocarpus attenuatus (Skan) Rehd.

習性：常綠喬木。花期：6-10 月；果期：翌年 6-10 月。

產地：跑馬地、大潭。

分佈：廣東、廣西南部。

用途：材用。

煙斗柯（石柯）

Lithocarpus corneus (Lour.) Rehd.

習性：常綠喬木。花期：5-7 月；果期：翌年 5-7 月。

產地：香港各地。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、貴州、湖南、福建、臺灣。

用途：材用。

厚斗柯 Elizabeth's Tanbark

Lithocarpus elizabethae (Tutch.) Rehd.

習性：常綠喬木。花期：7-9 月；果期：翌年 8-11 月。

產地：大埔滘、打鐵崗。

分佈：廣東、廣西、雲南、貴州、福建。

用途：材用。

泥柯

†**Lithocarpus fenestratus** var. **brachycarpus**
A. Camus [*Lithocarpus fenestratus*
auct. non (Roxb.) Rehd.: Check List
HK Pl. 1993.]

習性：常綠喬木。花期：8-10 月；果期：翌
年 10-12 月。

產地：薄扶林、大埔滘、鳳凰山。

分佈：海南、廣東、廣西、福建。越南。

用途：材用。

柯

Lithocarpus glaber (Thunb.) Nakai

習性：常綠喬木。花期：7-11 月；果期：
翌年 7-11 月。

產地：香港各地。

分佈：秦嶺南坡以南各省區（海南不產）；
日本。

用途：材用。

耳柯（卷葉石櫟）

Lithocarpus haipinii Chun

習性：常綠喬木。花期：7-8 月；果期：翌
年 7-8 月。

產地：扯旗山、大埔滘、馬鞍山。

分佈：廣東、廣西、貴州、湖南。

用途：材用。

硬殼柯（漢斯石柯） Hance's Tanbark

Lithocarpus hancei (Benth.) Rehd.

習性：常綠喬木。花期：4-6 月；果期：翌
年 9-12 月。

產地：香港各地。

分佈：秦嶺以南各省區。

用途：材用。

港柯（夏蘭桐） Harland's Tanbark

Lithocarpus harlandii (Hance) Rehd.

習性：常綠喬木。花期：5-6 月；果期：翌
年 9-10 月。

產地：香港仔、黃泥涌、淺水灣、寶雲道、
大嶼山。

分佈：廣東、廣西、江西、福建、臺灣。

用途：材用。

廣南柯 Irwin's Tanbark

Lithocarpus irwini (Hance) Rehd.
(*Lithocarpus amygdalifolius* auct. non
Hayata: Check List HK Pl. 1993.)

習性：常綠喬木。花期：3-9 月；果期：翌
年 8-12 月。

產地：金馬倫山、大潭、大嶼山。生於常綠
闊葉林中。

分佈：廣東、廣西、福建。

用途：材用。

鼠刺葉柯

Lithocarpus iteaphyllus (Hance) Rehd.

習性：常綠喬木。花期：4-5 月；果期：翌
年 7-10 月。

產地：跑馬地；銅鑼灣曾有記錄(採於 1881
年及 1909 年)。

分佈：廣東、廣西、湖南、江西、福建。

油葉柯

Lithocarpus konishii (Hayata) Hayata

習性：常綠喬木。花期：4-8 月；果期：7-10
月。

產地：爛泥灣、浪茄、西灣山、狗嶺涌。

分佈：海南、臺灣。

用途：材用。

木姜葉柯（多穗柯）

Lithocarpus litseifolius (Hance) Chun
[*Lithocarpus symbalanos* (Hance)
Chun]

習性：常綠喬木。花期：5-9 月；果期：翌
年 6-10 月。

產地：香港島、大帽山、大嶼山、打鐵崙。
生於常綠闊葉林中。

分佈：秦嶺南坡以南各省區。

用途：材用、葉作甜茶。

粉葉柯

Lithocarpus macilentus Chun & Huang
[*Lithocarpus irwini* auct. non (Hance)
Rehd.: Check List HK Pl. 1993.]

習性：常綠喬木。花期：7-8 月；果期：翌
年 10-11 月。

產地：大潭、香港仔、金馬倫道、馬鞍山。

生於常綠闊葉林中。
分佈：廣東、廣西。

櫟葉柯

†*Lithocarpus quercifolius* Huang & Y. T. Chang

習性：常綠喬木。花期：4-6月；果期：9-10月。

產地：石澳、柏架山。生於常綠闊葉林中。
分佈：廣東、江西。

櫟屬 *Quercus* L.

麻櫟 Southern Oak

Quercus acutissima Carruth.

習性：落葉喬木。花期：3-4月；果期：翌年9-10月。

產地：香港曾有記錄(標本採於1904年)。
分佈：遼寧、河北、山西、山東和長江以南各省區。
用途：材用。

白櫟 White Oak

Quercus fabri Hance

習性：落葉喬木。花期：4月；果期：10月。
產地：粉嶺。生於灌叢和次生林中。
分佈：陝西和長江以南各省區。

65. 樺木科 *Betulaceae*

赤楊屬 *Alnus* Mill.

赤楊 Formosan Alder

**Alnus japonica* (Thunb.) Steud. [*Alnus formosana* (Burk.) Makino]

習性：落葉喬木。花期：2-3月；果期：9-11月。

產地：青山、沙田、大埔滘(栽培)。
分佈：東北、華東、臺灣。朝鮮、日本。
用途：速生樹種。

66. 木麻黃科 *Casuarinaceae*

異木麻黃屬 *Allocasuarina* L. Johnson

海濱異木麻黃(海濱木麻黃) Black Sheoak
**Allocasuarina littoralis* (Salisb.) L. Johnson
(*Casuarina littoralis* Salisb.)

習性：喬木。
產地：栽培。
分佈：原產澳大利亞。

木麻黃屬 *Casuarina* L.

細枝木麻黃(肯氏木麻黃) River Oak

**Casuarina cunninghamia* Miq.

習性：喬木。花期：4月；果期：6-9月。
產地：栽培。

分佈：海南、廣東、福建有栽培。原產澳大利亞。

用途：行道樹。

木麻黃 Horsetail Tree

**Casuarina equisetifolia* L.

習性：喬木。花期：4-5月；果期：7-10月。
產地：栽培。

分佈：海南、廣東、福建有栽培。原產澳大利亞和太平洋島嶼。

用途：熱帶海岸防風固沙樹種。

67. 商陸科 *Phytolaccaceae*

商陸屬 *Phytolacca* L.

商陸 Indian Poberry

**Phytolacca acinosa* Roxb.

習性：草本。花期：5-8月；果期：6-10月。
產地：長洲、川龍、屯門、栽培。

分佈：我國除東北、內蒙古、青海、新疆外各地均分佈。朝鮮、日本、印度。

用途：藥用。

垂子商陸 America Pokeweed

†**Phytolacca americana* L.

習性：草本。花期：6-8月；果期：8-10月。
產地：南生圍。栽培。

分佈：長江流域以南各省區。原產北美。

69. 紫茉莉科 *Nyctaginaceae*

黃細心屬 *Boerhavia* L.

黃細心 Diffuse Boerhavia

Boerhavia diffusa L.

習性：蔓生草本。花期：5-6月；果期：秋季。

產地：紅磡、大嶼山、大鵬灣平洲。生於曠

地。

分佈：海南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、福建、臺灣。日本、印度、越南、柬埔寨、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓、澳大利亞、太平洋島嶼及美洲、非洲。

用途：藥用、食用。

直立黃細心 Erect Boerhavia

†**Boerhavia erecta** L.

習性：草本。花果期：夏秋季。

產地：大埔。生於曠地。

分佈：西沙群島、廣東。新加坡、馬來西亞、印度尼西亞、太平洋島嶼。

葉子花屬 *Bougainvillea* Comm. & Juss.

葉子花 (毛寶巾、賀春紅) Beautiful
Bougainvillea

***Bougainvillea spectabilis** Willd.
(*Bougainvillea glabra* auct. non
Choisy: Check List HK Pl. 1993.)

習性：藤狀灌木。花期：冬、春季。

產地：庭園及公園栽培。

分佈：中國南方栽培。原產熱帶美洲。

用途：觀賞、藥用。

紫茉莉屬 *Mirabilis* L.

紫茉莉 Marvel of Peru

***Mirabilis jalapa** L.

習性：草本。花期：4-10月；果期：8-11月。

產地：庭園及公園栽培。

分佈：中國南方栽培，有時逸為野生。原產熱帶美洲。

用途：觀賞、藥用。

70. 番杏科 Aizoaceae

海馬齒屬 *Sesuvium* L.

海馬齒 (濱莧) Sea-purslane

Sesuvium portulacastrum (L.) L.

習性：草本。花期：4-7月。

產地：大潭、青山、龍鼓灘、西貢、貝澳灣、東涌。生於近海岸的沙地上。

分佈：海南、廣東、福建、臺灣。廣佈於全

球熱帶和亞熱帶海岸。

番杏屬 *Tetragonia* L.

番杏 New Zealand Spinach

Tetragonia tetragonioides (Pall.) Kuntze

習性：草本。花果期：8-10月。

產地：赤柱、爛泥灣、龍鼓灘、大澳。生於海邊沙灘上。

分佈：雲南、廣東、福建、臺灣、浙江、江蘇。日本、亞洲南部、大洋洲、南美洲。

用途：藥用、蔬菜。

72. 仙人掌科 Cactaceae

金虎屬 *Echinocactus* Link & Otto.

象牙球 Golden Ball Cactus

****Echinocactus grusonii*** Hildm.

習性：多年生草本。花期：夏季。

產地：公園栽培。

分佈：墨西哥。

用途：觀賞。

曇花屬 *Epiphyllum* Haw.

曇花 Night blooming Cactus;
Dutchman's-pipe Cactus

****Epiphyllum oxypetalum*** (DC.) Haw.

習性：多年生草本。花期：夏季。

產地：公園栽培。

分佈：墨西哥至巴西。

用途：觀賞。

裸萼屬 *Gymnocalycium* Pfeiffer

牡丹玉

****Gymnocalycium mihanovichii*** var.
friedrichii Werb.

習性：多年生草本。花期：夏季。

產地：公園栽培。

分佈：巴拉圭。

用途：觀賞。

量天尺屬 *Hylocereus* (A. Berger)
Britton & Rose

量天尺 Night blooming Cereus

****Hylocereus undatus*** (Haw.) Britt. & Rose

習性：多年生草本。花期：夏季。

產地：栽培。
分佈：美洲熱帶。
用途：花供食用。

仙人掌屬 *Opuntia* Mill.

仙人掌 Prickly-pear

**Opuntia stricta* var. *dillenii* (Ker-Gaw.) L.
D. Benson [*Opuntia dillenii* (Ker-Gaw.)
Haw.]

習性：多年生草本。花期：夏季。
產地：栽培或逸為野生，偶見於海邊沙灘或
岩石上。
分佈：中美洲。
用途：觀賞。

木麒麟屬 *Pereskia* Mill.

木麒麟 Barbados-Gooseberry; Lemon-Vine

**Pereskia aculeata* Mill.

習性：半落葉藤本。
產地：栽培。
分佈：美洲熱帶。
用途：觀賞。

大葉木麒麟 Rose Cactus

**Pereskia grandifolia* Haw.

習性：半常綠喬木或灌木。花期：夏季。
產地：栽培。
分佈：巴西。
用途：觀賞。

蟹爪屬 *Schlumbergera* Lemaire

蟹爪 Crab Cactus

**Schlumbergera truncata* (Haw.) Moran.
[*Zygocactus truncatus* (Haw.) K.
Schum.]

習性：多年生草本。花期：12-2月。
產地：栽培。
分佈：巴西。
用途：觀賞。

73. 藜科 *Chenopodiaceae*

濱藜屬 *Atriplex* L.

海濱藜 Maximowicz Sallbush

Atriplex maximowicziana Makino (*Atriplex*
numularia auct. non Lindl.: Check List

HK Pl. 1993.)

習性：草本。花果期：6-12月。
產地：沙洲、大澳。生於海灘沙地上。
分佈：福建、廣東。日本(琉球群島)。

地膚屬 *Bassia* All.

地膚 summercypres

†*Bassia scoparia* (L.) A. J. Scott [*Kochia*
scoparia (L.) Schrad.]

習性：草本。花果期：6-10月。
產地：香港。生於田邊、路邊、荒地上。
分佈：全國各地。歐洲及亞洲。
用途：藥用。

甜菜屬 *Beta* L.

莙薹菜 Swiss Chard

Beta vulgaris var. *cicla* L.

習性：草本。花果期：5-7月。
產地：香港。
分佈：全國廣泛栽培。歐洲、亞洲及非洲北
部。
用途：蔬菜。

藜屬 *Chenopodium* L.

狹葉尖頭葉藜 *Acuminata* Virgate, Pigweed

Chenopodium acuminatum subsp. *virgatum*
(Thunb.) Kitam. (*Chenopodium*
acuminatum auct. non Willd.: Check
List HK Pl. 1993.)

習性：草本。花果期：6-9月。
產地：石澳、西貢、上白泥、下白泥、貝澳、
東涌、青龍頭。生於海邊、湖邊荒山
地上。
分佈：廣西、廣東、福建、臺灣、浙江、江
蘇、河北、遼寧。日本。

藜 Lambs-quarters

Chenopodium album L.

習性：半灌木。花期：7-8月；果期：8-9
月。
產地：沙田、大龍。生於田間、路旁、荒地
上。為很難除掉的雜草。
分佈：全國各地。全球溫帶和熱帶地區。
用途：藥用。

土荊芥 (小荊芥) American Wormseed

***Chenopodium ambrosioides** L.

習性：草本。花果期：5-11 月。
產地：香港各地。生於村邊、路邊、河岸。
分佈：廣西、廣東、福建、臺灣、浙江、江蘇、江西、湖南、四川。原產熱帶美洲，現廣佈於全球熱帶和溫帶地區。
用途：藥用。

小藜 Small Goosefoot

Chenopodium ficifolium Smith
(*Chenopodium serotinum* L.)

習性：草本。花期：4-5 月；果期：6-8 月。
產地：下坑。生於田間、路旁、荒地。
分佈：幾遍全國均有。廣佈於全球溫帶和熱帶地區。

菠菜屬 *Spinacia* L.

菠菜 Spinach

Spinacia oleracea L.

習性：草本。花果期：5-8 月。
產地：香港栽培。
分佈：全國各地栽培。原產伊朗。
用途：蔬菜。

鹼蓬屬 *Suaeda* Forst.

南方鹼蓬 Southern Seepweed.

Suaeda australis (R. Br.) Miq. (*Suaeda monoica* auct. non Forsk.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：小灌木。花果期：7-11 月。
產地：沙田、流浮山、船灣、榕樹澳、大嶼山。生於海灘沙地、紅樹林邊緣。
分佈：廣西、廣東、福建、臺灣、江蘇。日本南部及大洋洲。

74. 莧科 **Amaranthaceae**

牛膝屬 *Achyranthes* L.

土牛膝 Common Achyranthes

Achyranthes aspera L.

習性：多年生草本。花期：6-9 月。
產地：香港各地。生於村邊或低地灌叢中。
分佈：廣東、海南、廣西、貴州、湖南、江西、福建、臺灣、雲南、四川。亞洲西南部至東南部。
用途：藥用。

牛膝 Twohooth Achyranthes

Achyranthes bidentata Blume

習性：多年生草本。花期：6-12 月。
產地：扯旗山、大帽山、梧桐寨。生於村旁或疏林下。
分佈：除東北外，廣佈我國各地。亞洲東南部和非洲。
用途：藥用。

蓮子草屬 *Alternanthera* Forsk.

錦繡莧 (紅草) Calico-plant

***Alternanthera bettzickiana** (Regel) Yoss
[*Alternanthera versicolor* (Lem.) Hort. ex Regel]

習性：多年生草本。花期：8-9 月。
產地：香港零星栽培。
分佈：我國各大城市有栽培，原產巴西。
用途：觀賞、藥用。

星星蝦鉗菜

†***Alternanthera paronychioides** St. Hil.

習性：多年生草本。花期：3-9 月。
產地：米埔、南生園。
分佈：廣東、海南。原產熱帶美洲，現東半球熱帶地區廣佈。

空心莧 (空心蓮子草) Alligator-weed

***Alternanthera philoxeroides** (Mart.) Griseb.

習性：多年生草本。花期：5-10 月。
產地：沙田。生於潮濕地上。
分佈：廣東、廣西、湖南、湖北、江西、浙江、福建、江蘇、北京等地逸為野生。原產巴拿馬。

刺花蓮子草 Spinyflower *Alternanthera*

†***Alternanthera pungens** Kunth

習性：一年生草本。花期：5 月；果期：7 月。
產地：香港有記錄。
分佈：廣東、福建。原產南美洲。

蝦鉗菜 (蓮子草) Sessile *Alternanthera*

Alternanthera sessilis (L.) DC.
(*Alternanthera nodiflora* R. Br.)

習性：多年生草本。花期：5—7月；果期：7—9月。

產地：香港各地。

分佈：華南至華東各地。亞洲西南至東南部。

用途：藥用。

莧屬 *Amaranthus* L.

凹頭莧 *Livid amaranth*

†*Amaranthus blitum* L. (*Amaranthus lividus* L.)

習性：一年生草本。花果期：2-9月。

產地：坪山。生於濕潤荒地上。

分佈：除西北乾旱地區外，全國廣佈。東亞、歐洲、非洲、南美洲。

用途：藥用。

刺莧 *Spiny Amaranth*

Amaranthus spinosus L.

習性：一年生草本。花期：7—11月；果期：8—12月。

產地：香港島、沙田、屯門、元朗。生於村邊或曠野。

分佈：廣東、海南、廣西、湖南、江西、浙江、江蘇、安徽、貴州、雲南、四川、河南、陝西。美洲、亞洲。

用途：食用、藥用。

莧菜 *Chinese Spinach*

**Amaranthus tricolor* L.

習性：一年生草本。

產地：田園栽種。

分佈：原產印度。世界各地常見栽培。

用途：食用、藥用。

綠莧（野莧） *Green Amaranth*

Amaranthus viridis L.

習性：一年生草本。花期：6—8月；果期：8—10月。

產地：香港各地。生於曠野或村旁。

分佈：我國東部及南部各省區。世界溫帶至熱帶地區。

用途：食用、藥用。

青箱屬 *Celosia* L.

青箱（野雞冠） *Red-fox*

Celosia argentea L.

習性：一年生草本。花期：5—8月；果期：6—10月。

產地：沙田、九龍、粉嶺、上水、大嶼山。生於曠野或村邊。

分佈：全國廣佈，栽培或野生。俄羅斯、非洲及亞洲。

用途：藥用、食用。

雞冠花 *Coxcomb*.

**Celosia argentea* var. *cristata* (L.) Kuntze

習性：一年生草本。花果期：7—9月。

產地：香港各地栽種。

分佈：全國各地栽培。廣佈於世界溫暖地區。

用途：觀賞、藥用。

鳳尾球 *Feather Celosia*

**Celosia argentea* var. *plumosa* Hort.

習性：一年生草本。花果期：7—9月。

產地：香港各地栽培。

分佈：全國各地栽培。廣佈於世界溫暖地區。

用途：觀賞、藥用。

杯莧屬 *Cyathula* Blume

杯莧（金鈎草） *Prostrate Cyathula*

Cyathula prostrata (L.) Blume

習性：多年生草本。花果期：6—11月。

產地：香港仔、西貢、大埔、林村。生於溪邊或山坡灌叢中。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、臺灣。非洲、亞洲、大洋洲。

用途：藥用。

千日紅屬 *Gomphrena* L.

銀花莧（野千日紅） *Wild Globe Amaranth*

Gomphrena celosioides Mart.

習性：一年生草本。花果期：2—6月。

產地：夏力道、牛池灣、沙田、西貢、深井、大嶼山。生於低地草叢中。

分佈：海南、廣東、臺灣等。世界熱帶地區

廣佈；原產熱帶美洲。
用途：觀賞。

千日紅（百日紅） *Globe Amaranth*

**Gomphrena globosa* L.

習性：一年生草本。花果期：2—6月。
產地：公園及庭園常見栽培。
分佈：全國各地栽培。原產熱帶美洲。
用途：觀賞、藥用。

血莧屬 *Iresine* P. Br.

血莧（血葉） *Beef Steak Plant*

**Iresine herbstii* Hook. f. ex Lindl.

習性：多年生草本。
產地：公園及庭園栽培。
分佈：華南、華東等地栽培。原產巴西，現
世界各熱帶地區常見栽培。
用途：觀賞。

75. 馬齒莧科 *Portulacaceae*

馬齒莧屬 *Portulaca* L.

松葉牡丹（大花馬齒莧） *Moss-rose*

**Portulaca grandiflora* Hook.

習性：草本。花期：6-9月；果期：8-11月。
產地：香港栽培。
分佈：原產巴西。我國公園、花圃常栽培。
用途：觀賞、藥用。

馬齒莧（瓜子菜） *Purslane*

Portulaca oleracea L.

習性：草本。花期：5-8月；果期：6-9月。
產地：香港各地。生於菜園、農田、路旁等。
分佈：全國各省區。廣佈於全球溫帶和熱帶
地區。
用途：藥用、蔬菜。

毛馬齒莧 *Shaggy Purslane*

Portulaca pilosa L.

習性：草本。花果期：5-8月。
產地：石澳、爛泥灣、井頭、長洲、橫瀾島、
貝澳。生於海邊沙地上。
分佈：廣東、福建、臺灣、海南、西沙群島、
廣西、雲南。菲律賓、馬來西亞、印
度尼西亞和熱帶美洲。

用途：藥用。

土人參屬 *Talinum* Adans.

土人參 *Fameflower; Jewel-of-opar*

**Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.

習性：草本。花期：6-8月；果期：9-11月。
產地：大坑、林村、粉嶺、大生園、鹿頸、
梅窩。生於陰濕草地或灌叢，栽培或
逸為野生。

分佈：原產熱帶美洲，我國中部和南部有栽
培。

用途：藥用。

76. 落葵科 *Basellaceae*

落葵薯屬 *Anredera* Juss.

落葵薯 *Cordateleaf Anredera*

†**Anredera cordifolia* (Tenoer) Steenis

習性：藤本。花果期：6-10月。
產地：青山香泥、大浪、白石窩。庭園栽培。
栽培用葉腋中塊莖繁殖。

分佈：江蘇、浙江、福建、廣東、四川、有
栽培。原產南美洲熱帶地區。

用途：藥用、珠芽、根、葉食用。

落葵屬 *Basella* L.

落葵（潺菜） *Malabar-Nightshade*

**Basella alba* L.

習性：纏繞藤本。花期：5-9月；果期：7-10
月。

產地：田園及庭園栽培。

分佈：我國南北各地均有栽培。原產亞洲熱
帶地區。

用途：蔬菜。

77. 粟米草科 *Molluginaceae*

粟米草屬 *Mollugo* L.

粟米草 *Indian Chickweed*

Mollugo stricta L. (*Mollugo pentaphylla* auct.
non L.: Chicklist HK Pl. 1993.)

習性：草本。花期：5-8月；果期：8-10月。
產地：金馬倫山、掃桿埔、沙田。生於海岸
沙地、農田、空曠荒地。

分佈：黃河流域以南各省區。全球熱帶和亞
熱帶地區。

用途：藥用。

種稜粟米草 *Verticilata carpetweed*

***Mollugo verticilata* L.**

習性：草本。花果期：8-12 月。

產地：白泥、青山。生於草地或田間。

分佈：海南、廣東、廣西、福建、臺灣、山東。日本、歐洲南部和熱帶美洲。

78. 石竹科 **Caryophyllaceae**

卷耳屬 **Cerastium** L.

簇生卷耳 *Mouse-ear Chickweed*

***Cerastium fontanum* subsp. *triviale* (Link)**

Jalas

習性：草本。花期：5-6 月；果期：6-7 月。

產地：大東山、上水。生於山坡草叢中或沙質土中。

分佈：我國除東北地區外幾均分佈。蒙古、日本、朝鮮、越南、印度、伊朗。

石竹屬 **Dianthus** L.

十樣錦 (鬚苞石竹) *Sweet William*

****Dianthus barbatus* L.**

習性：草本。花果期：5-10 月。

產地：香港栽培。

分佈：我國各地有栽培。原產歐洲。

用途：觀賞。

麝香石竹 (康乃馨、大花石竹) *Carnation*

****Dianthus caryophyllus* L.**

習性：草本。花期：5-8 月，在溫室四季開花；果期：8-10 月。

產地：香港栽培。

分佈：原產歐洲、亞洲溫帶地區。我國各地栽培。

用途：觀賞。

石竹 *Rainbow Pink*

****Dianthus chinensis* L.**

習性：草本。花期：5-6 月；果期：7-9 月。

產地：香港栽培。

分佈：原產我國北方，現南北各地都有。

用途：觀賞、藥用。

荷蓮豆屬 **Drymaria** Willd. ex Schult.

荷蓮豆草 *West-India Chickweed*

***Drymaria diandra* Blume.** [*Drymaria cordata* auct. non (L.) Willd.ex Rocrm. & Schult.: Check List HK Pl. 1993.]

習性：草本。花期：4-10 月；果期：6-12 月。

產地：蕉坑、梅子林、茅坪、涌尾、大埔滘、梧桐寨、大帽山、蓮花山。生於山谷雜林緣。

分佈：臺灣、浙江、福建、廣東、廣西、江西、貴州、四川、湖南、雲南、西藏。日本、印度、斯里蘭卡、阿富汗、非洲南部。

用途：藥用。

石頭花屬 **Gypsophila** L.

線形瞿麥 (圓錐石頭花) *Babys-breath*

****Gypsophila paniculata* L.**

習性：草本。花期：6-8 月；果期：8-10 月。

產地：香港栽培。

分佈：新疆阿爾泰山區和塔什庫爾幹。俄羅斯、哈薩克斯坦、蒙古、歐洲、北美。

用途：藥用、觀賞。

剪秋羅屬 **Lychnis** L.

剪秋羅 *Brilliant Campion*

****Lychnis fulgens* Fisch.**

習性：草本。花期：6-7 月；果期：8-9 月。

產地：香港動植物公園。栽培。

分佈：雲南、四川、河北、山西、吉林、遼寧、黑龍江、內蒙古。日本、朝鮮、俄羅斯 (西伯利亞地區)。

鵝腸菜屬 **Myosoton** Moench

鵝腸菜 (牛繁縷) *Water Chickweed*

***Myosoton aquaticum* (L.) Moench** [*Stellaria aquatica* (L.) Scop.]

習性：草本。花期：5-8 月；果期：6-9 月。

產地：扯旗山、薄扶林、掃桿埔、大浪灣、城門、梅子林。生於灌叢中、水溝邊、河邊低濕處。

分佈：幾乎全國都有。亞熱帶和溫帶地區。

白鼓釘屬 *Polycarpaea* Lam.

白鼓釘 *Corymb Polycarpaea*

Polycarpaea corymbosa (L.) Lam.

習性：草本。花期：7-8月；果期：9-10月。
產地：銀線灣、深水灣。生於山坡、沙質草叢中或潮濕沙灘上。

分佈：廣西、廣東、海南、福建、臺灣、江西、安徽、雲南。熱帶和亞熱帶地區。

漆姑草屬 *Sagina* L.

漆姑草 *Japanese Pearlwort*

Sagina japonica (Sw.) Ohwi

習性：草本。花果期：5-6月。
產地：黃竹坑、大東山。生於河岸沙質地、田野草地上。

分佈：幾遍全國。俄羅斯（遠東地區）、日本、朝鮮、印度、尼泊爾。

繁縷屬 *Stellaria* L.

雀舌草 *Chickweed*

Stellaria alsine Grinum (*Stellaria uliginosa* Murr.)

習性：草本。花期：5-6月；果期：7-8月。
產地：沙田、大帽山、城門。生於田間、溪邊和潮濕草地。

分佈：幾遍全國。北溫帶廣佈。

繁縷(魚腸草) *Common Chickweed*

Stellaria media (L.) Vill

習性：草本。花期：6-7月；果期：7-8月。
產地：大帽山。生於田間。
分佈：全國廣佈。廣佈全球。

79. 蓼科 *Polygonaceae*

珊瑚藤屬 *Antigonon* Endl.

珊瑚藤 *Honolulu Vine; Coralvine*

**Antigonon leptopus* Hook. & Arn.

習性：藤本。花果期：5-8月。
產地：公園及庭園栽培。
分佈：原產熱帶美洲，現我國臺灣、福建、廣東、廣西、雲南常栽培。
用途：觀賞。

竹節蓼屬 *Homalocladium* (F. Muell.) Bailey

竹節蓼 *Centipede plant*

**Homalocladium platycladum* (F. Muell. ex Hook.) Bailey [*Muehlenbeckia platyclada* (F. Muell. ex Hook.) Meissn.]

習性：草本。花期：8-9月。
產地：公園及庭園栽培。
分佈：原產所羅門群島。
用途：觀賞。

蓼屬 *Polygonum* L.

毛蓼 *Hairy Knotweed*

Polygonum barbatum L.

習性：草本。花期：8-9月；果期：9-10月。
產地：香港各地。生於溝邊潮濕地。
分佈：海南、臺灣、福建、湖南、湖北、江西、廣東、廣西、四川、貴州、雲南。印度、緬甸、菲律賓。

頭花蓼 *Capitate Knotweed*

†**Polygonum capitatum* Buch.-Ham. ex D. Don

習性：草本。花期：6-9月；果期：8-10月。
產地：庭園栽培。
分佈：江西、湖南、湖北、四川、貴州、廣東、廣西、雲南、西藏。印度、尼泊爾、錫金、不丹、緬甸、越南。
用途：藥用。

火炭母 *Chinese Knotweed*

Polygonum chinense L.

習性：草本。花期：7-9月；果期：8-10月。
產地：香港各地。生於山谷潮濕地、山坡草地上。
分佈：長江流域以南各省區。日本、菲律賓、印度、喜馬拉雅山區及馬來西亞。
用途：藥用。

虎杖 *Japanese Fleece-flower*

**Polygonum cuspidatum* Sieb. et Zucc. (*Reynoutria japonica* Houtt.)

習性：草本。花期：8-9月；果期：9-10月。
產地：屯門。栽培。
分佈：華南、華中、華東、西南及陝西南部、

甘肅南部。日本、朝鮮。
用途：藥用。

二歧蓼 *Dichotomus Knotweed*

†**Polygonum dichotomum** Blume
(*Polygonum pedunculare* Wall. ex
Meissn.)

習性：草本。花期：6-7月；果期：8-10月。
產地：和合石、蠔涌、新圍、粉嶺。生於山
溝潮濕地上。
分佈：海南、廣東、福建、臺灣。日本(琉
球群島)、菲律賓、印度尼西亞、越
南、印度(阿薩姆)。

光蓼 *Glabrous Knotweed*

Polygonum glabrum Willd.

習性：草本。花期：6-8月；果期：7-9月。
產地：打鼓嶺、上水。生於溝邊、池塘邊潮
濕地上。
分佈：海南、廣東、福建、廣西、湖南、湖
北。印度、越南、緬甸、泰國、菲律
賓、非洲及美洲。

長葉箭蓼 *Longhastate-leaf Smartweed*

†**Polygonum hastatosagittatum** Makino

習性：草本。花期：8-9月；果期：9-10月。
產地：蠔涌、粉嶺、和合石、西灣。生於水
邊、溝邊濕地上。
分佈：東北、河北、華東、華南、西南。俄
羅斯(西伯利亞)、朝鮮、日本。

水蓼 *Water Smartweed*

Polygonum hydropiper L. (*Polygonum*
serrulatum auct. non Lab.: Check List
HK Pl. 1993.)

習性：草本。花期：5-9月；果期：6-10月。
產地：沙田、荔枝角。生於河邊、溝邊、山
谷濕地上。
分佈：我國南北各省區。日本、朝鮮、印度、
印度尼西亞、歐洲及北美洲。

日本蓼 (蠶繭蓼) *Japanese Smartweed*

Polygonum japonicum Meissn.

習性：草本。花期：8-10月；果期：9-11月。

產地：葵涌、山寮、廈村、東涌。生於路邊
潮濕地、山谷草地上。
分佈：黃河流域以南各省區。日本、朝鮮。

愉悅蓼 *Jucund's Knotweed*

Polygonum jucundum Meissn. (*Polygonum*
serrulatum auct. non Lab.: Check List
HK Pl. 1993.)

習性：草本。花期：8-9月；果期：9-11月。
產地：梧桐寨、大菴、蓮澳、河背。生於山
坡地、溝邊、路邊潮濕地上。
分佈：長江流域以南各省區。

大馬蓼 *White Smartweed*

Polygonum lapathifolium L. (*Polygonum*
lanigesum auct. non R. Br.: Check List
HK Pl. 1993.)

習性：草本。花期：6-8月；果期：7-9月。
產地：沙田、荃灣、廈村、打鼓嶺、上水。
生於稻田邊、路邊和溝邊濕地上。
分佈：我國南北各省區。日本、朝鮮、蒙古、
菲律賓、印度、巴基斯坦及歐洲。

綿毛酸模葉蓼 *White-hair Smartweed*

†**Polygonum lapathifolium** var. **salicifolium**
Sibth. (*Polygonum langloun* auct. non
R. Br.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：草本。花期：6-8月；果期：7-9月。
產地：沙田、荔枝角、生於路邊、水溝邊、
田邊。
分佈：我國南北各省區。日本、朝鮮、蒙古、
菲律賓、印度、巴基斯坦及歐洲。

長鬚蓼 *Longiseta Knotweed*

†**Polygonum longisetrum** De Bruyns

習性：草本。花期：6-8月；果期：7-9月。
產地：大潭水塘。生於山谷、水旁、路邊草
地上。
分佈：幾遍全國。日本、朝鮮、緬甸、印度、
印度尼西亞、馬來西亞。

圓基長鬚蓼 *Rotundate Knotweed*

†**Polygonum longisetrum** var. **rotundatum** A.
J. Li.

習性：草本。花期：6-8月；果期：9-10月。

產地：簡頭圍、歌賦山。生於山谷、溪邊、田邊潮濕草地上。
分佈：幾遍全國。

何首烏 Tuber Fleece Flower

Polygonum multiflorum Thunb. [*Fallopia multiflora* (Thunb.) Harald.]

習性：草本。花期：8-9月；果期：9-10月。
產地：施勳道、司徒拔道。生於山坡林下、山谷灌叢中。
分佈：華南、華中、華東、西南及陝西南部、甘肅南部。日本。
用途：藥用。

小花蓼 Muricate Knotweed

†**Polygonum muricatum** Meissn.

習性：草本。花期：7-8月；果期：9-10月。
產地：沙田、大菴、河背、谷埔。生於山谷、水邊、田邊潮濕地上。
分佈：廣東、廣西、四川、貴州、雲南、陝西、湖北、安徽、浙江、江西、吉林、黑龍江。日本、朝鮮、印度、尼泊爾、泰國。

紅蓼 (紅草) Prince's feather

Polygonum orientale L.

習性：草本。花期：6-9月；果期：8-10月。
產地：沙埔、元朗。生於溝邊、村旁、路邊潮濕草地上。
分佈：廣佈於全國。日本、朝鮮、菲律賓、俄羅斯、印度、歐洲及大洋洲。

杠板歸 (貫葉蓼) Perfoliate Knotweed

Polygonum perfoliatum L.

習性：攀援草本。花期：6-8月；果期：7-10月。
產地：香港各地。生於山谷、田邊、路旁潮濕草地上。
分佈：幾遍全國。日本、朝鮮、菲律賓、印度、印度尼西亞、菲律賓及俄羅斯(西伯利亞)。

腋花蓼 (習見蓼) Axilflower Knotweed

Polygonum plebeium R. Br.

習性：草本。花期：5-8月；果期：6-9月。
產地：粉嶺、大埔、烏蛟騰、梅窩。生於山田邊、路旁、水旁潮濕地上。
分佈：除西藏外，幾遍全國。日本、印度、歐洲、非洲。

叢枝蓼 Clustered-branch Knotweed

Polygonum posumbu Buch.-Ham.

習性：草本。花期：5-9月；果期：6-10月。
產地：沙頭角。生於山坡林下、山谷水旁。
分佈：我國南北各省區。日本、朝鮮、印度尼西亞、歐洲及美洲北部。

疏蓼 Oversight Knotweed

†**Polygonum praetermissum** Hook. f.

習性：草本。花期：6-8月；果期：7-9月。
產地：坪洲、大澳。生於溝邊、河邊濕地。
分佈：長江流域以南各省區。日本、朝鮮和印度。

伏毛蓼 (短毛蓼) Pubescent Knotweed

Polygonum pubescens Blume (*Polygonum flaccidum* Meissn.; *Polygonum senrulatatum* auct. non Lab.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：草本。花期：5-6月；果期：7-9月。
產地：西貢、上水、打鼓嶺。生於溝邊、水旁、田邊潮濕草地上。
分佈：除西北地區外，幾乎全國均有。日本、朝鮮、印度、印度尼西亞。

刺蓼 (廊茵) Manyspiny Knotweed

Polygonum senticosum (Meissn.) Franch. & Savat.

習性：草本。花期：6-7月；果期：7-9月。
產地：香港。生於山谷林下。
分佈：長江流域以南各省區。日本、朝鮮。

糙毛蓼 Strigose Knotweed

Polygonum strigosum R. Br. (*Polygonum bodinieri* Lévl. & Vant.)

習性：草本。花期：8-9月；果期：9-10月。
產地：筲箕灣、米埔、模範鄉、打鼓嶺、南丫島。生於山谷水邊、林下潮濕草地。

上。
分佈：福建、廣東、廣西、貴州及雲南。印度、尼泊爾、中南半島各國、菲律賓、印度尼西亞及澳大利亞。

柔莖蓼

†**Polygonum tenellum** var. **micranthum** (Meissn.) C. Y. Wu

習性：一年生草本。花期：5—9月；果期：6—10月。

產地：打鼓嶺。生於田邊濕地或山谷溪邊。
分佈：海南、廣東、廣西、雲南、福建、臺灣、江西、浙江、安徽、江蘇。日本、印度、馬來西亞、印度尼西亞。

蓼藍 Indigo plant

†**Polygonum tinctorium** Ait.

習性：草本。花期：8-9月；果期：8-10月。
產地：西灣。生於田中潮濕地上。
分佈：我國南北各省區有栽培或半野生狀態。
用途：藥用及作染料。

黏毛蓼 (香蓼) Viscid hairy Knotweed

Polygonum viscosum Buch.-Ham. ex D. Don.

習性：草本。花期：7-9月；果期：8-10月。
產地：大埔滘、粉嶺、西貢。生於路邊、溝邊潮濕草地上。
分佈：東北、華東、華南、西南諸省區。日本、朝鮮、印度、俄羅斯(遠東地區)。

酸模屬 *Rumex* L.

齒果酸模 Toothed-fruit Dock

Rumex dentatus L.

習性：草本。花期：5-6月；果期：9-10月。
產地：沙田。生於山坡、山谷、路邊潮濕地上。
分佈：幾遍全國。印度、阿富汗、尼泊爾、哈薩克斯坦及歐洲東南部。
用途：觀賞。

羊蹄 Goat-hoof

Rumex japonicus Houtt. (*Rumex crispus* auct. non L.: Check List HK Pl.1993.)

習性：草本。花期：5-6月；果期：6-7月。

產地：屯門。生於河灘、田邊、溝邊潮濕草地上。

分佈：幾遍全國。日本、朝鮮、俄羅斯(遠東地區)。

小果酸模 Littlefruit Dock

†**Rumex microcarpus** Campd. (*Rumex wallichii* Meissn.; *R. crispus* auct. non L.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：草本。花期：4-6月；果期：5-7月。
產地：荔枝角。生於河邊、山谷、田邊潮濕草地上。

分佈：海南、臺灣、廣西、貴州、雲南、江蘇、河北、遼寧。越南、孟加拉、印度。

長刺酸模 (假菠菜) Trisetiferous Dock

Rumex trisetifer Stokes (*Rumex maritimus* auct. non L.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：草本。花期：5-6月；果期：6-7月。
產地：香港島。生於田邊、山坡潮濕草地上。
分佈：長江流域以南各省區。越南、老撾、泰國、孟加拉、印度。

80. 白花丹科

Plumbaginaceae

補血草屬 *Limonium* Mill.

補血草 Sea-Lavender

Limonium sinense (Girard) Kuntze

習性：多年生草本。花期：幾全年。
產地：香港島、沙田、西貢、赤徑、大埔、大嶼山。生於海邊草地。
分佈：東北、華北、華東、華南。越南、朝鮮。
用途：藥用。

白花丹屬 *Plumbago* L.

紫花丹 Purple Leadwort

***Plumbago indica** L.

習性：多年生草本。花期：11至翌年4月。
產地：栽培。
分佈：熱帶亞洲。
用途：藥用。

白花丹 White Leadwort

Plumbago zeylanica L.

習性：亞灌木。

產地：西貢、沙角尾、新田、青山、長洲。
生於草地和灌叢中。

分佈：南亞至中國東南部和西南部。

81. 五椏果科 Dilleniaceae

五椏果屬 *Dillenia* L.

厚葉黃花樹 Alate-Petiole *Dillenia*

****Dillenia alata*** (R. Br. ex DC.) Mart.
(*Wormia alata* R. Br. ex DC.)

習性：喬木。

產地：公園栽培。

分佈：馬來西亞。

五椏果（第倫桃） Elephant Apple

****Dillenia indica*** L.

習性：喬木。

產地：公園栽培。

分佈：印度、斯里蘭卡、中南半島、馬來西亞、印度尼西亞。

錫葉藤屬 *Tetracera* L.

錫葉藤 Sandpaper Vine

Tetracera asiatica (Lour.) Hoogland

習性：木質藤木。

產地：香港各地。生於山坡或溝谷疏林中；
極常見。

分佈：廣東、廣西。亞洲西南部經南部至東南部。

86. 龍腦香科

Dipterocarpaceae

望天樹屬 *Shorea* Roxb. ex Gaertn.
f.

婆羅雙樹 Sal *Shorea*

****Shorea robusta*** Gaertn. f.

習性：高大喬木。

產地：栽培。

分佈：印度。

88. 山茶科 Theaceae

黃瑞木屬 *Adinandra* Jack.

隳毛楊桐 Maned *Adinandra*

†***Adinandra glischroloma*** var. ***jubata*** (Li)
Kobuski (*Adinandra jubata* Li)

習性：常綠小喬木。花期：5-6 月；果期：
7-9 月。

產地：八仙嶺、南涌。

分佈：四川、廣西和廣東。

黃瑞木 Millet *Adinandra*

Adinandra millettii (Hook. & Arn.) Benth. &
Hook. f. ex Hance (*Cleyera millettii*
Hook. & Arn.)

習性：小喬木或灌木。花期：5-7 月；果期：
8-10 月。

產地：香港島、西貢、大綱仔、馬鞍山、粉
嶺、大欖涌、大嶼山。較常見；生於
次生林和灌叢，尤其是花崗岩地區。

分佈：廣東、廣西、湖南、江西、福建、浙
江、安徽和江蘇。

用途：材用。

茶梨屬 *Anneslea* Wall.

海南茶梨（海南紅柑） Hainan *Anneslea*

†***Anneslea fragrans*** var. ***hainanensis***
Kobuski (*Anneslea hainanensis*
(Kobuski) Hu)

習性：小喬木。花期：11-12 月；果期：翌
年 7-8 月。

產地：馬鞍山。

分佈：海南和廣西。

用途：材用。

茶屬 *Camellia* L.

香港毛蕊茶（尖葉茶） Pointed-leaf
Camellia

Camellia assimilis Champ. ex Benth. [*Thea*
assimilis (Champ. ex Benth.) Seem.]

習性：小喬木。花期：1 月。

產地：扯旗山、馬鞍山、大帽山。生於林中。

分佈：廣東和廣西。

長尾毛蕊茶（尾葉茶） Tail-leaved

Camellia

Camellia caudata Wall. [*Thea caudata* (Wall.) Seem.]

習性：小喬木。花期：10月至翌年3月。
產地：香港島、青山。生於林中。
分佈：廣東、廣西、雲南、臺灣和浙江。中南半島、緬甸、印度和喜馬拉雅山區。
用途：種子可榨油。

紅皮糙果茶(克氏茶) Crapnell's *Camellia*
Camellia crapnelliana Tutch. (*Camellia gigantocarpa* Hu & T. C. Huang)

習性：小喬木。
產地：柏架山、茅坪。
分佈：廣西、福建和浙江。

柃葉茶 Eurya-leaved *Camellia*

†**Camellia euryoides** Lindl.
習性：灌木或小喬木。花期：1-3月。
產地：柏架山、八仙嶺、南涌、大嶼山。
分佈：廣東、福建、江西和湖南。

大苞山茶 (葛亮洪茶) Grantham's
Camellia

Camellia granthamiana Sealy
習性：小喬木。花期：3-4月。
產地：大帽山和馬鞍山。
分佈：廣東。
用途：觀賞、油料。

香港茶 Hong Kong *Camellia*

Camellia hongkongensis Seem. [*Thea hongkongensis* (Seem.) Pierre]
習性：小喬木。花期：12月至翌年2月。
產地：扯旗山、薄扶林、聶高信山、柏架山。生於山地疏林或栽培於城門樹木園。
分佈：廣東。
用途：種子油可供製肥皂、潤滑油及潤髮油等用。

山茶 Japanese *Camellia*

***Camellia japonica** L.
習性：灌木或小喬木。花期：1-4月。
產地：庭園及公園栽培。

分佈：四川、臺灣、山東、江西。
用途：觀賞；種子可榨油，供食用及工業用；花藥用。

落瓣油茶 Caduouspetal *Camellia*

Camellia kissii Wall. [*Thea sasangua* var. *kissii* (Wall.) Pierre]

習性：小喬木。花期：11-12月。
產地：大帽山、觀音山、八仙嶺和新娘潭。生於常綠林或灌叢中。
分佈：海南、廣東、廣西和雲南。尼泊爾、錫金、印度、緬甸、喜馬拉雅地區和中南半島。

油茶 Oiltea *Camellia*

Camellia oleifera Abel (*Camellia drupifera* Lour.)

習性：小喬木。花期：冬月。
產地：鶴咀山、大帽山、大東山、鳳凰山。生於林中。
分佈：長江以南各省區。
用途：種子油可食用、潤髮及工業用；茶麩可作肥料和農藥；果殼可作栲膠、製革等原料；材用；根皮藥用。

滇山茶 Kunming *Camellia*

***Camellia reticulata** Lindl.
習性：小喬木。花期：12月；果期：次年4月。
產地：庭園及公園栽植。
分佈：雲南。
用途：觀賞。

柳葉茶 Willowleaf *Camellia*

Camellia salicifolia Champ. ex Benth. [*Thea salicifolia* (Champ. ex Benth.) Seem.]

習性：小喬木。花期：8-11月。
產地：扯旗山、柏架山、大帽山等。生於林中。
分佈：廣東、廣西、福建、江西、湖南和臺灣。

茶梅 Sasangua *Camellia*

***Camellia sasanqua** Thunb.

習性：小喬木。
產地：庭園及公園栽培。
分佈：原產日本。
用途：觀賞。

茶 Tea

Camellia sinensis (L.) Kuntze (*Thea sinensis* L.)

習性：灌木或小喬木。花期：10月至翌年2月。
產地：柏架山、大帽山。生於林中逸生或栽培。
分佈：長江以南各省區。日本和緬甸。
用途：葉可製茶葉；根、葉藥用；種子油可作工業油，經提煉可食用。

香花茶 Walden Tea

Camellia sinensis var. **waldenae** (S. Y. Hu) H. T. Chang (*Camellia waldenae* S. Y. Hu)

習性：小喬木。
產地：大帽山、火炭、馬鞍山、烏蛟騰。
分佈：廣東、廣西。

紅淡比屬 *Cleyera* Thunb.

紅淡比 Japanese *Cleyera*

†**Cleyera japonica** Thunb.
習性：小喬木。花期：5-6月；果期：10-11月。
產地：赤徑。
分佈：廣東、廣西、湖南、江西、福建、臺灣、浙江、江蘇、安徽和雲南。

柃屬 *Eurya* Thunb.

尖萼毛柃 Acute-sepal *Eurya*

†**Eurya acuminatissima** Merr. & Chun
習性：灌木。花期：1-2月。
產地：大嶼山、大東山。
分佈：貴州、廣西、廣東、湖南、江西、福建。

米碎花 Chinese *Eurya*

Eurya chinensis R. Br. (*Eurya acumenata* DC.; *Eurya japonica* L.)
習性：灌木。花期：11-12月；果期：翌年

6-7月。

產地：香港各地。生於灌叢中。
分佈：江西、福建、臺灣、湖南、廣東、廣西。
用途：枝、葉藥用。

光枝米碎花 Chinese *Eurya*

†**Eurya chinensis** var. **glabra** Hu & L. K. Ling
習性：灌木。花期：11-12月；果期：翌年6-7月。

產地：赤柱、河背、果洲群島。生於灌叢中。
分佈：江西、福建、臺灣、湖南、廣東、廣西。

二列葉柃 Distichousleaf *Eurya*

Eurya distichophylla Hemsl.
習性：灌木。花期：10-12月；果期：翌年6-7月。
產地：大帽山、柏架山、大嶼山。生於山谷水邊。
分佈：廣西、廣東、湖南、江西和福建；越南。

崗柃 Groff *Eurya*

Eurya groffii Merr.
習性：灌木。花期：9-11月；果期：翌年4-6月。
產地：大埔滘、八仙嶺、烏蛟騰。生於灌叢和疏林中。
分佈：四川、雲南、貴州、廣西、廣東、福建。越南、新幾內亞。

細枝柃

†**Eurya loquiana** Dunn
習性：灌木。花期：10-12月；果期：翌年7-9月。
產地：黃龍坑。
分佈：四川、雲南、貴州、廣西、廣東、湖南、湖北、浙江、安徽。

黑柃 Black *Eurya*

Eurya macartneyi Champ.
習性：灌木或小喬木。花期：11月至翌年1

月；果期：6-8月。
產地：香港島、獅子山、城門、大帽山、馬鞍山、大嶼山。生於灌叢和疏林中。
分佈：廣東、福建、廣西、湖南和江西。

細齒葉柃 *Shining Eurya*

Eurya nitida Korth. [*Eurya japonica* var. *nitida* (Korth.) Th.-Dyer]

習性：灌木或小喬木。花期：11月至翌年1月；果期：翌年7-9月。

產地：香港各地。生於灌叢或疏林下。

分佈：四川、廣西、海南、廣東、湖南、湖北、福建、江西、浙江。越南、緬甸、斯里蘭卡、印度、菲律賓及印度尼西亞。

用途：枝、葉、果可提取染料；種子榨油；材用。

大頭茶屬 *Gordonia* Ellis

大頭茶 *Hong Kong Gordonia*

Gordonia axillaris (Roxb.) Diétr. [*Polyspora axillaris* (Roxb.) Sweet; *Polyspora axillaris* Don, *Gordonia anomala* Spreng]

習性：灌木或小喬木。花期：10月至翌年1月。

產地：香港各地。生於灌叢和早期次生林中。

分佈：華南和臺灣。中南半島。

折柄茶屬 *Hartia* Dunn

毛折柄茶 *Hairy Hartia*

Hartia villosa (Merr.) Merr. (*Stewartia villosa* Merr.; *Stewartia villosa* Cheng; *Stewartia pleropetiolata* auct. non Cheng: Check List HK Pl. 1993.)

習性：喬木。花期：6-7月。

產地：大帽山、昂坪。

分佈：廣東、廣西。

用途：材用。

木荷屬 *Schima* Reinw.

木荷（荷樹） *Gugertree*

Schima superba Gardn. & Champ.

習性：喬木。花期：6-8月。

產地：香港各地。

分佈：貴州、廣西、廣東、湖南、江西、福建、浙江、臺灣。

用途：材用；樹皮可製農藥；葉可藥用；優良薪炭材。

厚皮香屬 *Ternstroemia* L. f.

厚皮香 *Nakedanther Ternstroemia*

Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Beddome [*Ternstroemia gymnanthera* (Wight & Arn.) Sprague]

習性：喬木。花期：5-7月；果期：8-10月。

產地：香港島、大帽山、馬鞍山、大嶼山等地。生於次生林。

分佈：四川、雲南、貴州、廣西、廣東、湖南、湖北、江西、福建、浙江、安徽。印度、馬來西亞、菲律賓和日本。

用途：材用；種子油供工業用；樹皮可提栲膠。

廣東厚皮香 *Kwangtung Ternstroemia*

†**Ternstroemia kwantungensis** Merr.

習性：灌木或小喬木。花期：5-6月；果期：10-11月。

產地：屏風山。

分佈：廣西、廣東、江西。越南。

尖萼厚皮香 *Sharpsepal Ternstroemia*

†**Ternstroemia luteoflora** Hu ex L. K. Ling

習性：小喬木。花期：5-6月；果期：8-10月。

產地：香港島、大帽山、大埔、屏風山、烏蛟騰、大浪西灣。生於次生林。

分佈：雲南、貴州、廣西、廣東、湖南、江西、福建。

小葉厚皮香 *Littleleaf Ternstroemia*

Ternstroemia microphylla Merr. (*Ternstroemia pseudoverticillata* Merr. & Chun)

習性：灌木或小喬木。花期：5-6月；果期：8-10月。

產地：八仙嶺、橫嶺、南涌、屏風山、大嶼山。

分佈：廣西、廣東、海南、福建。

石筆木屬 *Tutcheria* Dunn

石筆木 *Common Tutcheria*

Tutcheria championii Nakai [*Tutcheria spectabilis* (Champ. ex Benth.) Dunn]

習性：喬木。花期：6月。

產地：香港島、大嶼山、馬鞍山、大埔、龜頭嶺、烏蛟騰。

分佈：廣東和福建。

用途：觀賞；材用；種子可榨油。

小果石筆木 *Littlefruit Tutcheria*

†*Tutcheria microcarpa* Dunn [*Pyrenaria microcarpa* (Dunn) H. Keng]

習性：小喬木。花期：6-7月。

產地：聶高信山、蓮花山、大帽山、梧桐寨。

分佈：雲南、海南、江西、湖南、福建、浙江。

89. 獼猴桃科

Actinidiaceae

獼猴桃屬 *Actinidia* Lindl.

異色獼猴桃

†*Actinidia callosa* var. *discolor* C. F. Liang

習性：落葉藤本。

產地：大帽山。

分佈：廣東、廣西、湖南、江西、福建、臺灣、浙江、四川、安徽。

闊葉獼猴桃 *Broadleaf Actinidia*

Actinidia latifolia (Gardn. et Champ.) Merr.

習性：藤狀灌木。

產地：香港島、大帽山、梧桐寨、馬鞍山、西貢、大嶼山。生於山坡或溝谷疏或密林中。

分佈：西南、華南至華東。越南、老撾、柬埔寨、馬來西亞。

水冬哥屬 *Saurauria* Willd.

水冬哥（米花樹）

Saurauria tristylis DC.

習性：小喬木。花期：3-12月。

產地：香港島。生於雜木林中。

分佈：廣西、海南、廣東、貴州。印度、馬來西亞。

用途：藥用。

91. 五列木科

Pentaphylacaceae

五列木屬 *Pentaphylax* Gardn. & Champ.

五列木 *Common Pentaphylax*

Pentaphylax euryoides Gardn. & Champ.

習性：喬木。花期：2-6月。

產地：香港島、馬鞍山、八仙嶺、烏蛟騰、大嶼山。生於灌叢和林中。

分佈：雲南、貴州、廣西和廣東。越南、馬來西亞、印度尼西亞。

用途：材用。

100. 山竹子科 *Guttiferae* (incl. *Hypericaceae*)

紅厚殼屬 *Calophyllum* L.

胡桐 *Thin-leaved Calophyllum*

Calophyllum membranaceum Gardn. & Champ. (*Calophyllum spectabile* Hook. & Arn.)

習性：灌木或小喬木。花期：3-5月；果期：8-10月。

產地：香港島、大帽山、馬鞍山、烏蛟騰、大嶼山。生於次生林中。

分佈：海南、臺灣、廣東、廣西。印度、斯里蘭卡、中南半島、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓、波利尼西亞、馬達加斯加、澳大利亞。

用途：根、葉藥用。

黃牛木屬 *Cratoxylum* Blume

黃牛木 *Yellow Cow Wood*

Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume

習性：落葉灌木或喬木。花期：4-5月；果期：6月。

產地：香港各地。生於灌叢或次生林中。

分佈：廣東、廣西和雲南南部。中南半島、泰國、緬甸、菲律賓和印度尼西亞。

用途：藥用、飲料、樹脂、香料、材用。

藤黃屬 *Garcinia* L.

多花山竹子 *Many-flowered Garcinia*

Garcinia multiflora Champ. ex Benth.
(*Garcinia hainanensis* Merr.)

習性：喬木。花期：6-8 月；果期：11-12 月。
產地：香港島、大帽山、梧桐寨。生於山地次生林中。
分佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州和雲南。
用途：果可食用；果、樹皮藥用；種子可榨油；木材材用。

嶺南山竹子 (黃牙果) *Lingnan Garcinia*

Garcinia oblongifolia Champ. ex Benth.
習性：喬木。花期：4-5 月；果期：10-12 月。
產地：香港各地。生於風水林和低山次生林。
分佈：廣西、廣東和海南。越南。
用途：木材材用。

菲島福木 *Common Garcinia*

****Garcinia subelleptica*** Merr.
習性：喬木。
產地：公園栽培。
分佈：臺灣南部。日本(琉球群島)、菲律賓、斯里蘭卡、印度尼西亞。
用途：庭園綠化。

金絲桃屬 *Hypericum* L.

趕山鞭

Hypericum attenuatum Choisy
習性：多年生草本。花期：6-9 月。果期：9-12 月。
產地：大嶼山。
分佈：華南、華中、華東、華北、內蒙古、新疆。越南、日本、朝鮮、蒙古、俄羅斯。

金絲桃 *Chinese St. Johnswort*

Hypericum chinense L. (*Hypericum monogynum* L.)
習性：灌木。花期：5-8 月；果期：8-9 月。
產地：香港動植物公園。
分佈：廣東、廣西、貴州、湖南、四川、湖

北、安徽、浙江、江西、福建、臺灣、河南、河北、陝西、山東、江蘇等省區。

用途：觀賞、藥用。

地耳草 (田基黃) *Japanese St. Johnswort*

Hypericum japonicum Thunb. ex Murray
習性：一年生或多年生草本。花期：3-8 月；果期：6-10 月。
產地：九龍山、粉嶺、大嶼山、薄扶林、香港仔、扯旗山、種植道、司徒拔道、芬梨徑、梅道。路邊雜草。
分佈：遼寧、山東至長江以南各省區。日本、朝鮮、尼泊爾、錫金、印度、斯里蘭卡、緬甸至印度尼西亞、澳大利亞、新西蘭及美國夏威夷。
用途：藥用。

金絲梅 *Gold Flower*

****Hypericum patulum*** Thunb. ex Murray
(*Hypericum moserianum* Andre)
習性：灌木。花期：7-9 月。果期：9-11 月
產地：嘉道理農場。栽培。
分佈：西藏、雲南。巴基斯坦、尼泊爾、錫金、印度、緬甸。
用途：觀賞。

元寶草 *Sampson St. Johnswort*

Hypericum sampsonii Hance
習性：多年生草本。花期：3 月。
產地：西貢(昂平)。生於平地田邊、路旁、荒地草叢。
分佈：長江流域各省區和臺灣。印度和日本。
用途：藥用。

101. 杜英科 *Elaeocarpaceae*

杜英屬 *Elaeocarpus* L.

中華杜英 (野杜英) *Chinese Elaeocarpus*
Elaeocarpus chinensis (Gardn. & Champ.)
Hook. f. ex Benth.

習性：常綠小喬木或喬木。花期：5-6 月。
產地：香港各地。生於常綠闊葉林中。
分佈：福建、浙江、江西、廣東、廣西、貴

州、雲南。越南、老撾。

杜英 Common *Elaeocarpus*

Elaeocarpus decipiens Hemsl. (*Elaeocarpus lanceaefolius* auct. non Roxb.: Check List HK. Pl. 1993.)

習性：常綠喬木。花期：6-7 月。

產地：香港島、大浪西灣、浪茄。生於常綠闊葉林中。

分佈：臺灣、福建、浙江、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南。

顯脈杜英 (山模果) Mock *Elaeocarpus*

Elaeocarpus dubius A. DC. (*Elaeocarpus griffithii* Mast.)

習性：常綠喬木。花期：3-4 月。

產地：大埔、烏蛟騰。生於常綠闊葉林中。

分佈：廣東、海南、廣西、雲南。越南。

水石榕 Hainan *Elaeocarpus*

****Elaeocarpus hainanensis*** Oliv.

習性：小喬木。花期：6-7 月。

產地：公園栽培。

分佈：海南、廣西西南部及雲南東南部。越南、泰國。

日本杜英 Japanese *Elaeocarpus*

Elaeocarpus japonicus Sieb. & Zucc. (*Elaeocarpus yunnanensis* Brandis)

習性：喬木。花期：4-5 月。

產地：大帽山、大嶼山。生於常綠闊葉林中。

分佈：長江以南各省區。越南、日本。

絹毛杜英 Shiningleaf *Elaeocarpus*

†***Elaeocarpus nitenifolius*** Merr. & Chun

習性：喬木。花期：4-5 月。

產地：百花林、烏蛟騰、上禾坑。生於常綠闊葉林中。

分佈：廣東、海南、廣西、雲南。

山杜英 (膽八樹) Sylvestral *Elaeocarpus*

Elaeocarpus sylvestris (Lour.) Poir.

習性：小喬木。花期：4-5 月。

產地：香港各地。生於常綠闊葉林中。

分佈：福建、浙江、江西、湖南、廣東、海

南、廣西、貴州、雲南、四川。

猴歡喜屬 *Sloanea* L.

猴歡喜 Chinese *Sloanea*

Sloanea sinensis (Hance) Hemsl. (*Sloanea hongkongensis* Hemsl.)

習性：喬木。花期：9-11 月；果期：翌年 6-7 月。

產地：黃泥涌、香港仔、淺水灣、城門、大帽山、深井、大老山、馬鞍山、八仙嶺等地。生於常綠闊葉林中。

分佈：海南、廣東、廣西、貴州、湖南、江西、福建、浙江、臺灣。

102. 椴樹科 Tiliaceae

黃麻屬 *Corchorus* L.

甜麻 (假黃麻) Mock Jute

Corchorus aestuans L. (*Corchorus acutangulus* Lam.)

習性：一年生草本。花期：夏季。

產地：沙田、西貢、大浪西灣、青衣島、大嶼山等地。生於荒地、曠野、村旁雜草中。

分佈：長江以南各省區。熱帶亞洲、中美洲及非洲。

黃麻 Jute

****Corchorus capsularis*** L.

習性：直立木質草本。花期：夏季；果期秋季。

產地：馬鞍山、大埔、粉嶺、鹿頸、沙埔、貝澳。栽培。

分佈：長江以南各省區普遍栽培。

扁擔桿屬 *Grewia* L.

扁擔桿 Bilobed *Grewia*

Grewia biloba D. Don (*Grewia biloba* var. *parviflora* auct. non Hand.-Mazz.: Check List HK. Pl. 1993.)

習性：灌木或小喬木。花期：5-7 月。

產地：大潭、香港仔、鶴咀、西貢、大灣、螺洲、蒲台島等地。生於山地灌木林中。

分佈：臺灣、浙江、江西、安徽、湖南、湖北、廣東、四川。

粗毛扁擔桿 (剛毛扁擔桿) *Hairy Grewia*
***Grewia hirsuta* Vahl**

習性：灌木或小喬木。花期：6-7月。

產地：川龍。生於灌木林或疏林中。

分佈：廣西南部。中南半島。

椴葉扁擔桿 *Lindenleaf Grewia*

†****Grewia tiliaefolia* Vahl**

習性：小喬木。花期：5-6月。

產地：公園栽培。

分佈：雲南西南部。非洲、印度、中南半島。

破布葉屬 *Microcos* L.

破布葉 (布渣葉) *Microcos*

***Microcos paniculata* L.**

習性：灌木或小喬木。花期：6-7月。

產地：香港各地。

分佈：廣東、海南、廣西、雲南。印度、中南半島、印度尼西亞。

刺蒴麻屬 *Triumfetta* L.

毛刺蒴麻 *Hairy Triumfetta*

†***Triumfetta cana* Blume (*Triumfetta pilosa* auct. non Roth.: Check List HK Pl. 1993.)**

習性：木質草本或亞灌木。花期：夏季。

產地：香港仔、西貢、大帽山、元墩下、石崗、大刀岩、烏蛟騰等地。生於乾旱的灌叢中。

分佈：廣東、廣西、貴州、雲南、四川、福建。

刺蒴麻 *Triumfetta*

***Triumfetta rhomboidea* Jacq. (*Triumfetta bartamia* L.)**

習性：亞灌木。花期：夏秋季。

產地：香港各地。生於荒野灌叢草地。

分佈：廣東、廣西、雲南、福建、臺灣。

103. 梧桐科 *Sterculiaceae*

昂天蓮屬 *Abroma* L. f.

昂天蓮 *Common Abroma*

****Abroma augusta* (L.) L. f.**

習性：灌木。花期：春夏季。

產地：公園栽培。

分佈：廣東、廣西、雲南、貴州。印度、越南、馬來西亞、泰國、印度尼西亞和菲律賓。

瓶子木屬 *Brachychiton* Schott & Endl.

槭葉蘋婆 *Flame-tree*

****Brachychiton acerifolium* (Cunn.) F. Muell.**

習性：喬木。花期：4月。

產地：公園栽培。

分佈：原產澳大利亞新南威爾斯。

用途：觀賞。

澳洲蘋婆 *Lacebark Bottletree*

****Brachychiton discolor* F. Muell.**

習性：喬木。花期：2-5月；果期：9月。

產地：公園栽培。

分佈：原產澳洲昆士蘭至維多利亞。

用途：觀賞。

刺果藤屬 *Byttneria* Loefl.

刺果藤

***Byttneria aspera* Colebr. (*Buettneria aspera* Colebr.)**

習性：木質藤本。花期：春夏。

產地：香港各地。常生於林緣或溝澗旁。

分佈：廣東、廣西和雲南。印度、越南、柬埔寨、老撾和泰國。

用途：纖維、藥用。

吊芙蓉屬 *Dombeya* Cav.

伯吉斯吊芙蓉

****Dombeya brugessiae* Garr. ex Hary & Sond.**

習性：常綠灌木。花期：3月。

產地：公園栽培。

分佈：原產非洲南部。

用途：觀賞。

好望角吊芙蓉 *Cape Wedding-Flower*

****Dombeya natalensis* Sond.**

習性：常綠灌木。花期：11月。

產地：香港動植物公園。栽培。

分佈：原產非洲南部。

吊芙蓉 *Scarlet Dombeya*

****Dombeya wallichii* Benth. & Hook. f.**

習性：常綠灌木。花期：1-2月。
產地：公園栽培。
分佈：原產馬達加斯加。
用途：觀賞。

梧桐屬 *Firmiana* Marsili

梧桐 Phoenix Tree

**Firmiana simplex* (L.) W. F. Wight
(*Firmiana platanifolia* (L. f.) Marsili)

習性：落葉喬木。花期：6月。
產地：深水灣、石澳大浪灣、西貢西灣、蒲
苔島。
分佈：中國南北各省區。日本。
用途：庭園、行道綠化樹種、材用、藥用、
纖維。

山芝麻屬 *Helicteres* L.

山芝麻 Narrowleaf Screwtree

Helicteres angustifolia L.

習性：小灌木。花期：5-8月。
產地：香港各地。常生於草坡或灌叢。
分佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣
西和雲南。印度、緬甸、馬來西亞、
越南、柬埔寨、老撾、泰國、印度尼
西亞和菲律賓。
用途：藥用、纖維可作繩索。

銀葉樹屬 *Heritiera* Dryand.

銀葉樹 Coastal Heritiera

Heritiera littoralis Dryand. ex Ait.

習性：常綠喬木。花期：秋季。
產地：大埔滘、榕樹澳、荔枝窩。常生於海
邊。公園有栽培。
分佈：廣東、廣西、海南和臺灣。日本、菲
律賓和東南亞各地、非洲東部和大洋
洲。

馬鬆子屬 *Melochia* L.

馬鬆子 Juteleaf Melochia

Melochia corchorifolia L.

習性：亞灌木狀草本。花期：夏秋。
產地：香港島、馬料水、粉嶺、河背、沙埔、
屯門。生於荒野地區。
分佈：長江流域以南各省區及臺灣。亞洲熱
帶地區。
用途：纖維可作麻袋、造紙等原料。

午時花屬 *Pentapetes* L.

午時花 Purplered Pentapetes

**Pentapetes phoenicea* L.

習性：一年生草本。花期：夏季。
產地：公園栽培。
分佈：廣西。亞洲熱帶地區及日本。
用途：觀賞。

翅子樹屬 *Pterospermum* Schreber

翻白葉樹 Heterophyllous Wingseedtree

Pterospermum heterophyllum Hance

習性：喬木。花期：秋季。
產地：蠔涌、大帽山、大埔、八仙嶺、蛤塘、
凹下、下禾坑、馬灣、大嶼山。生於
林中。
分佈：廣西、廣東和福建。
用途：藥用、材用，纖維可作麻袋、造紙等
原料。

梭羅樹屬 *Reevesia* Lindl.

梭羅樹 Bunch-like Reevesia

Reevesia thyrsoidea Lindl.

習性：常綠喬木。花期：3-4月。
產地：香港各地。生於次生林、灌叢和草地。
分佈：廣東、廣西和雲南。越南和柬埔寨。
用途：纖維可作麻袋、造紙等原料、材用。

蘋婆屬 *Sterculia* L.

假蘋婆 Lanceleaf Sterculia

Sterculia lanceolata Cav.

習性：半落葉喬木。花期：4-5月。
產地：香港各地。生於低山次生林、山澗附
近。
分佈：廣東、廣西、雲南、貴州和四川。緬
甸、越南、泰國、老撾。
用途：纖維可作麻袋、造紙等原料，澱粉、
藥用、庭園綠化。

蘋婆 Common Sterculia

**Sterculia nobilis* Smith

習性：喬木。花期：4-5月。
產地：荃灣、沙田。多為庭園栽植。
分佈：雲南、廣東、廣西、福建和臺灣。印
度、越南和印度尼西亞。
用途：纖維可作麻袋、造紙等原料，澱粉、

材用、庭園綠化。

蛇婆子屬 *Waltheria* L.

蛇婆子 *Florida Waltheria*

***Waltheria americana* L.**

習性：亞灌木。花期：夏秋。

產地：香港島、大嶼山。常生於山坡陽坡。

分佈：臺灣、福建、廣東、廣西和雲南。廣佈於全世界熱帶地區。

104. 木棉科 *Bombacaceae*

木棉屬 *Bombax* L.

木棉 *Tree Cotton*

****Bombax ceiba* L.** [*Bombax malabaricum* DC.; *Gossampinus malabarica* (DC.) Merr.]

習性：落葉大喬木。花期：3 月；果期：5 月。

產地：公園及行道旁有栽植。

分佈：中國南部及西南部。熱帶亞洲。

用途：庭園綠化、行道樹種、材用、藥用、填充材料、油料。

吉貝屬 *Ceiba* Mill.

吉貝 (美洲木棉) *Kapok Ceiba*

†****Ceiba pentandra* (L.) Gaertn.** (*Bombax pentandrum* L.)

習性：喬木。花期：3-4 月。

產地：公園及行道旁有栽植。

分佈：海南、廣東、廣西、貴州、雲南有栽培。原產熱帶美洲。

用途：庭園綠化、材用、填充材料、油料。

105. 錦葵科 *Malvaceae*

秋葵屬 *Abelmoschus* Medicus

咖啡黃葵 *Okra gumbo*

†****Abelmoschus esculentus* (L.) Moench**

習性：一年生草本。花期：12 月。

產地：公園栽培。

分佈：河北、山東、江蘇、浙江、湖南、湖北、雲南和廣東有栽培。原產印度。

用途：庭園花卉、食用。

黃葵 *Musk Mallow*

***Abelmoschus moschatus* Medicus** [*Hibiscus abelmoschus* L.]

習性：多年生草本。花期：2-7 月。

產地：城門、大坳門、大埔、林村、元墩下、鹿頸、南涌、新娘潭。

分佈：臺灣、廣東、廣西、湖南、雲南。

用途：藥用、油料、纖維。

苘麻屬 *Abutilon* Miller

磨盤草 *India Abutilon*

***Abutilon indicum* (L.) Sweet**

習性：一年生或多年生直立亞灌木狀草本。花期：8 月。

產地：大環、榕樹澳、大埔、元墩下、船灣、三桠村、昂船洲、大嶼山。生於路邊、草叢。

分佈：臺灣、福建、廣東、廣西、貴州和雲南。越南、老撾、柬埔寨、泰國、斯里蘭卡、緬甸、印度和印度尼西亞等熱帶地區。

用途：藥用、纖維。

金鈴花 (燈籠花) *Redvein Abutilon*

†****Abutilon striatum* Dickson**

習性：常綠灌木。

產地：公園及庭園栽培。

分佈：福建、浙江、江蘇、湖北、北京、遼寧等各大城市有栽培。原產巴西和烏拉圭。

用途：觀賞。

苘麻 *China jute*

***Abutilon theophrastii* Medik.**

習性：亞灌木。花期：7-8 月。

產地：元朗模範鄉。生於山地。

分佈：南北各地。越南、印度、日本及歐洲。

用途：纖維、油料、藥用。

木槿屬 *Hibiscus* L.

黃芙蓉 *Yellow Hibiscus*

****Hibiscus hamabo* Sieb. & Zucc.**

習性：常綠灌木。花期：5 月。

產地：公園栽培。

分佈：原產日本。

用途：觀賞。

木芙蓉 Changeable Rose-mallow

***Hibiscus mutabilis L.**

習性：落葉灌木或小喬木。花期：10月；果期：3月。

產地：公園栽培。

分佈：原產湖南。遼寧、河北、山東、陝西、安徽、浙江、江西、福建、臺灣、廣東、廣西、湖南、湖北、四川、貴州和雲南等省區栽培。日本及東南亞各國也有栽培。

用途：庭園觀賞、藥用、纖維。

朱槿（扶桑、大紅花） Chinese Hibiscus

***Hibiscus rosa-sinensis L.**

習性：常綠灌木。花期：全年。

產地：園林中廣泛栽培。

分佈：廣東、雲南、臺灣、福建、廣西和四川等省區栽培。

用途：觀賞、藥用、纖維。

玫瑰茄 Roselle

***Hibiscus sabdariffa L.**

習性：亞灌木。花期：7-10月。

產地：庭園栽培。

分佈：廣東、海南、福建、臺灣、廣西、雲南有栽培。熱帶地區廣泛栽培。

吊燈花 Coral Hibiscus

***Hibiscus schizopetalus (Masters) Hook. f.**

習性：常綠灌木。花期：全年。

產地：公園及庭園栽培。

分佈：臺灣、福建、廣東、廣西和雲南等省區栽培。原產東非熱帶。

用途：園林觀賞。

木槿 Rosa Of Sharon

***Hibiscus syriacus L.**

習性：落葉灌木。花期：7月。

產地：公園栽培。

分佈：臺灣、福建、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、湖南、湖北、安徽、江西、浙江、江蘇、山東、河北、河南和陝西等省區栽培。原產中國中部。

用途：觀賞、藥用、食用、纖維。

黃槿 Cuban Bast

Hibiscus tiliaceus L. (Paritium tiliaceum A. St. Hil.)

習性：常綠灌木或喬木。花期：7-8月。

產地：香港島、新界及離島。生於紅樹林後帶；公園栽培或作行道樹。

分佈：廣東、福建和臺灣；中南半島、緬甸、印度、印度尼西亞、馬來西亞及菲律賓有分佈。

用途：庭園綠化、行道樹種、材用、纖維。

野葵屬 Malva L.

錦葵 Chinese Mallow

***Malva sinensis Cavan.**

習性：二年生或多年生直立草本。花期：12月至翌年5月。

產地：公園栽培。

分佈：中國南北各地常見栽培。印度。

用途：觀賞、藥用。

冬葵 Musk Mallow

Malva verticillata L.

習性：常綠灌木。花期：2-5月。

產地：香港。

分佈：北自吉林、內蒙古，南達雲南、西藏，東起沿海，西至新疆、青海。印度、緬甸、錫金、朝鮮、歐洲和東非。

用途：藥、食用、纖維。

賽葵屬 Malvastrum A. Gray

賽葵 (黃花草、黃花棉) False Mallow

Malvastrum coromandelinum (L.) Garcke

習性：亞灌木。花期：6-7月。

產地：香港各地。路邊、田間雜草。

分佈：臺灣、福建、廣東、廣西和雲南等省區。熱帶地區廣佈。

用途：藥用。

懸鈴花屬 Malvaviscus Fabr.

垂花懸鈴花 Sleeping Waxmallow

***Malvaviscus arboreus var. penduliflorus Schery**

習性：灌木。花期全年。

產地：公園及庭園常見栽培。
分佈：廣東和雲南等省區引種栽培。原產墨西哥和哥倫比亞。
用途：觀賞。

黃花稔屬 *Sida* L.

黃花稔 *Acute Sida*

Sida acuta Burm. f.

習性：直立亞灌木狀草本。花期：夏月。
產地：香港島、荔枝角、大埔、流浮山、大嶼山。生於路旁或荒坡。
分佈：臺灣、福建、廣東、廣西和雲南等省區。印度、越南和老撾。
用途：藥用。

橙葉黃花稔 *Alderleaf Sida*

†*Sida alnifolia* L.

習性：直立小灌木。花期：1-2月。
產地：九龍、大帽山。
分佈：雲南、廣西、廣東、福建和臺灣。熱帶和亞熱帶地區。

長梗黃花稔 *Long-stalked Sida*

Sida cordata (Burm. f.) Boiss. (*Sida humilis* Willd.)

習性：披散狀亞灌木。花期：5-6月。
產地：香港島、清水灣、大埔滘、上下白泥、逢吉鄉等。生於路邊、荒地。
分佈：臺灣、福建、廣東、廣西和雲南。印度、斯里蘭卡和菲律賓。

心葉黃花稔 *Heart-leaved Sida*

Sida cordifolia L.

習性：直立亞灌木。花期：幾乎全年。
產地：香港島、荔枝角、沙田、大埔、大浪西灣、大嶼山。生於路旁、荒地。
分佈：臺灣、福建、廣東、廣西、四川和雲南等省區。亞洲和非洲熱帶和亞熱帶地區。
用途：藥用、纖維。

白背黃花稔 *Sida Hemp*

Sida rhombifolia L.

習性：直立亞灌木。花期：5-12月。
產地：香港各地。生於山坡灌叢間、曠野和

溝谷兩岸。

分佈：臺灣、福建、廣東、廣西、貴州、雲南、四川和湖北。中南半島和印度。
用途：藥用、纖維。

榛葉黃花稔 *Subcordate Sida*

Sida subcordata Span.

習性：直立亞灌木。花期：9月至翌年1月。
產地：大埔、林村、鍾屋村、大嶼山。生於路旁或荒地。
分佈：廣東、廣西和雲南。越南、老撾、緬甸、印度和印度尼西亞。

肖槿屬 *Thespesia* Soland. ex Corr.

恒春黃槿 (繖楊) *Portia Tree*

Thespesia populnea (L.) Soland. ex Correa (*Hibiscus populneus* L.)

習性：常綠灌木。花期：幾乎全年。
產地：大埔、蝴蝶灣、龍鼓灘、南涌、鹿頸、大嶼山、馬灣、蒲台島等。生於海邊紅樹林附近。
分佈：臺灣、廣東和海南。越南、柬埔寨、斯里蘭卡、印度、泰國、菲律賓非洲。

梵天花屬 *Urena* L.

肖梵天花 (鵝頭婆) *Rose Mallow*

Urena lobata L. (*Urena lobata* var. *scabriuscula* DC.)

習性：直立亞灌木狀草本。花期：7月至翌年2月。
產地：香港各地。生於路邊或荒地。
分佈：長江流域以南地區；越南、柬埔寨、老撾、泰國、緬甸和日本。
用途：藥用、纖維、油料。

梵天花 *Procumbent Indian Mallow*

Urena procumbens L. [*Urena lobata* var. *sinuata* (L.) Gagnep.]

習性：小灌木。花期：7-11月。
產地：大坳門、大帽山、田夫仔、上水、三桠村、大嶼山等。路邊、荒地。
分佈：臺灣、福建、浙江、江西、湖南、廣東、廣西。
用途：藥用、纖維。

108. 豬籠草科 Nepenthaceae

豬籠草屬 *Nepenthes* L.

豬籠草 Pitcher Plant

Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce

習性：草本。花期：4-11 月。

產地：大欖涌、掃管笏、青山、大嶼山。生於潮濕溝邊。

分佈：廣東、海南。中南半島、馬來西亞。

用途：觀賞。著名食蟲植物。

109. 茅膏菜科 *Droseraceae*

茅膏菜屬 *Drosera* L.

錦地羅（落地金錢） Sundew

Drosera burmannii Vahl

習性：草本。花果期：全年。

產地：香港仔、薄扶林、最高信山。生於平地、山林。

分佈：廣東、海南、廣西、雲南、福建、臺灣。廣佈於亞洲、非洲和大洋洲的熱帶和亞熱帶地區。

用途：藥用。

長葉茅膏菜 Indian Sundew

Drosera indica L.

習性：草本。花期：2 月。

產地：鶴咀、東涌。生於潮濕地或水田邊。

分佈：臺灣、福建、廣東、廣西。分佈於亞洲、非洲和大洋洲的熱帶和亞熱帶地區。

長柱茅膏菜

†*Drosera oblanceolata* Y. Z. Ruan

習性：草本。花果期：5-7 月。

產地：大東山。

分佈：廣西、廣東。

光萼茅膏菜 Crescent-leaved Sundew

Drosera pelata var. *glabrata* Y. Z. Ruan

習性：草本。花果期：4-6 月。

產地：八仙嶺、屏風山。生於草叢、灌叢和疏林下。

分佈：廣東、廣西、湖南、湖北、安徽、浙

江、江西、福建、江蘇、臺灣。

寬苞茅膏菜

Drosera spathulata var. *loueirii* (Hook. & Arn.) Y. Z. Ruan

習性：草本。花期：3-5 月。

產地：香港島、大帽山、河背、馬鞍山、青山、大嶼山。生於草叢和灌叢中。

分佈：廣東、廣西。

110. 大風子科 Flacourtiaceae

嘉賜木屬 *Casearia* Jacq.

嘉賜樹 *Casearia*

Casearia glomerata Roxb.

習性：喬木或灌木。花期：8-12 月。

產地：柏架山、沙田、大埔滘、粉嶺、西貢。生於山坡疏林中。

分佈：海南、廣東、廣西、福建、西藏。印度、越南。

用途：藥用。

毛嘉賜樹 Villous *Casearia*

Casearia velutina Blume (*Casearia villilimba* Merr.; *Casearia grewiaefolia* auct. non Vent: Check List HK Pl. 1993.)

習性：喬木。花期：3-5 月。

產地：馬鞍山、梅子林、大埔滘、烏蛟騰。生於疏林中。

分佈：海南、廣東、廣西、福建、貴州、雲南。亞州南部。

錫蘭梅屬 *Dovyalis* E. Meyer ex Arn.

錫蘭梅 Ceylon Gooseberry

**Dovyalis hebecarpa* Warb.

習性：喬木。花期：8-9 月；果期：10-11 月。

產地：公園栽培。

分佈：廣東有栽培。原產斯里蘭卡、印度。用途：食用。

刺籬木屬 *Flacourtia* Comm.ex L'Herit.

大葉刺籬木 Rukam

Flacourtia rukam Zoll. & Mor.

習性：喬木。花期：3—4 月；果期：5—7 月。

產地：城門。生於山坡疏林或村旁。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南。印度、越南、泰國、馬來西亞、菲律賓。

用途：食用。

馬蛋果屬 Gynocardia R. Br.

馬蛋果 Fragrant Gynocardia

†* **Gynocardia odorata** R. Br.

習性：喬木。

產地：公園栽培。

分佈：雲南、西藏。印度、緬甸。

用途：食用。

天料木屬 Homalium Jacq.

天料木 Cochinchina Homalium

Homalium cochinchinensis (Lour.) Druce

習性：小喬木至大灌木。花期：幾乎全年。

產地：香港各地。生於疏林中。

分佈：海南、廣東、廣西、湖南、福建、臺灣。越南。

用途：材用。

紅花天料木 Hainan Homalium

†* **Homalium hainanensis** Gagnep.

習性：喬木。花期：6—翌年 2 月。

產地：路旁或公園種植。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南。越南。

刺柎屬 Scolopia Schreb.

刺柎 Chinese Scolopia

Scolopia chinensis (Lour.) Clos

習性：小喬木或大灌木。花期：冬末春初。

產地：香港各地。生於低地或濕潤的山坡林中。

分佈：海南、廣東、廣西、福建。斯里蘭卡、老撾、越南、泰國、馬來西亞。

用途：藥用。

廣東刺柎 Scolopia

Scolopia saeva (Hance) Hance

習性：小喬木或大灌木。花期：夏季。

產地：香港各地。生於山坡疏林中。

分佈：海南、廣西、廣東、福建。

用途：材用。

柎木屬 Xylosma G. Forst.

長葉柎木 Longleaf Xylosma

Xylosma longifolium Clos

習性：小喬木或大灌木。花期：4-5 月；果期：6-10 月。

產地：粉嶺、林村、大埔滘、大埔、沙頭角等地。生於疏林中。

分佈：海南、廣東、廣西、貴州、雲南。中南半島。

柎木 Congested Xylosma

† **Xylosma racemorum** (Sieb. & Zucc.) Miq.

[*Xylosma congestum* (Lour.) Merr.]

習性：喬木。

產地：灣仔峽、粉嶺。生於山坡疏林中。

分佈：華南、華東、西南及西北。日本、朝鮮。

用途：藥用。

112. 紅木科 Bixaceae

紅木屬 Bixa L.

紅木 Arnotto Dye Plant

* **Bixa orellana** L.

習性：小喬木。花期：5—8 月；果期：秋冬。

產地：栽培。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、福建等地有栽培。原產熱帶美洲。

用途：觀賞、染料。

118. 堇菜科 Violaceae

堇菜屬 Viola L.

戟葉堇菜 Wild Violet

Viola betonicifolia J. E. Smith

習性：草本。花果期：4-9 月。

產地：香港島、九龍山。生於林緣或路邊。

分佈：秦嶺以南各省區。

用途：藥用。

蔓堇菜 Spreading Violet

Viola diffusa Ging

習性：草本。花期：3-5 月；果期：5-8 月。

產地：香港各地。生於次生林中、林緣、草

坡、溪谷旁、岩石縫隙中。
分佈：秦嶺以南各省區。日本、印度、尼泊爾、菲律賓、馬來西亞。
用途：藥用。

長萼堇菜 Longsepal Violet

Viola inconspicua Blume

習性：草本。花果期：3-11 月。

產地：大埔、梧桐寨。

分佈：秦嶺以南各省區。緬甸、菲律賓、馬來西亞。

香堇菜 Garden Violet

***Viola odorata** L.

習性：草本。

產地：香港各地。

分佈：我國各大城市有栽培。歐洲、非洲、亞洲。

用途：觀賞。

三色堇 Pansy

***Viola tricolor** var. **hortensis** DC.

習性：草本。花期：4-7 月；果期 5-8 月。

產地：庭園栽種。

分佈：我國各地公園常見栽培。原產歐洲。

用途：栽培供觀賞。

堇菜 Common Violet

Viola verecunda A. Gray (*Viola alata* auct. non Burg.; *Viola areolata* auct. non Blume: Check List HK Pl. 1993.)

習性：草本。花果期：5-10 月。

產地：沙頭角、馬鞍山、城門、大帽山。生於草地上、路旁。

分佈：幾遍全國各地。俄羅斯、蒙古、朝鮮、日本。

用途：藥用。

119. 檉柳科 Tamaricaceae

檉柳屬 *Tamarix* L.

檉柳 Chinese Tamarisk

***Tamarix chinensis** Lour.

習性：灌木或喬木。

產地：栽培。

分佈：安徽、江蘇、山東、河南、河北、遼寧等省區。華東、華南、西南各省區均有栽培。

用途：觀賞、藥用。

125. 西番蓮科

Passifloraceae

西番蓮屬 *Passiflora* L.

雞蛋果 Purple Granadilla

***Passiflora edulis** Sims

習性：藤本。花期：夏秋。

產地：栽培。

分佈：原產巴西，現廣植於熱帶和亞熱帶地區。

用途：觀賞、飲料。

龍珠果 Passion Flower

***Passiflora foetida** L.

習性：藤本。果期：7-11 月。

產地：香港各地。生於荒地灌叢中。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南（歸化）。墨西哥、美國南部和中部，南美洲。

蛇王藤

Passiflora moluccana var. **teysmanniana** (Miq.) De Wilde (*Passiflora cochinchinensis* Spreng.)

習性：藤本。花期：1-4 月。

產地：龍鼓灘、蒲台島。生於灌木叢中。

分佈：廣東、廣西、海南。

南美西番蓮

***Passiflora suberosa** L. (*Passiflora viridiflora* Cav.)

習性：蔓性草本。

產地：栽培。

分佈：原產巴西。

127. 番木瓜科 Caricaceae

番木瓜屬 *Carica* L.

番木瓜 Papaya

***Carica papaya** L.

習性：喬木。

產地：栽培。
分佈：華南及西南有栽培。原產熱帶美洲。
用途：水果。

130. 葫蘆科 Cucurbitaceae

冬瓜屬 *Benincasa* Savi

冬瓜 White Gourd

**Benincasa hispida* (Thunb.) Cogn.

習性：一年生蔓生草本。花果期：春夏季。

產地：田園栽種。

分佈：中國各地栽培。亞洲熱帶、亞熱帶、
澳大利亞東部、馬達加斯加。

用途：食用、藥用。

節瓜 Chieh-gua

**Benincasa hispida* var. *chieh-gua* How

習性：一年生蔓生草本。花果期：春夏。

產地：田園栽種。

分佈：中國南方，尤其廣西、廣東普遍栽培。

用途：食用。

西瓜屬 *Citrullus* Schrad.

西瓜 Water-melon

**Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. &
Nakai (*Citrullus vulgaris* Schrad.)

習性：一年生蔓生藤本。花果期：春夏。

產地：田園偶有栽培。

分佈：中國各地栽培。世界熱帶至溫帶地區
均有栽培；原產非洲。

用途：食用。

紅瓜屬 *Coccinia* Wight & Arn.

紅瓜 Ivygourd

†*Coccinia grandis* (L.) Voigt

習性：攀援草本。花期：5-6月；果期：7-9
月。

產地：黃竹坑、荃灣、山寮、坪山。生於灌
叢、林中。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南。非洲熱帶、
亞洲東南部。

黃瓜屬 *Cucumis* L.

甜瓜 Muskmelon

**Cucumis melo* L.

習性：一年生匍匐或攀援草本。花果期：夏

季。

產地：田園栽種。

分佈：世界溫帶至熱帶地區栽培。

用途：食用、藥用。

白瓜（越瓜） Oriental Pickling Melon

**Cucumis melo* var. *conomon* (Thunb.)

Makino

習性：一年生匍匐或攀援草本。花果期：夏
季。

產地：田園栽種。

分佈：中國各地栽培。

用途：食用。

黃瓜（青瓜） Cucumber

**Cucumis sativus* L.

習性：一年生蔓生或攀援草本。花果期：夏
季。

產地：田園栽種。

分佈：中國各地栽培。世界熱帶至溫帶地區
栽培。

用途：食用、藥用。

南瓜屬 *Cucurbita* L.

南瓜（番瓜） Pumpkin

**Cucurbita moschata* (Duch. ex Lam.) Duch.
ex Poiret

習性：一年生蔓生草本。花果期：夏秋季。

產地：田園栽種。

分佈：世界各地栽培，原產墨西哥至中美洲
一帶。

用途：食用。

金瓜屬 *Gymnopetalum* Arn.

金瓜（越南裸瓣瓜） Golden *Gymnopetalum*
Gymnopetalum chinense (Lour.) Merr.

[*Gymnopetalum cochinchinense* (Lour.)
Kurz]

習性：草質藤本。花期：7-9月；果期：9-12
月。

產地：大埔。生於灌叢。

分佈：雲南、廣西、海南、廣東。印度至亞
洲東南部。

絞股藍屬 *Gynostemma* Blume

絞股藍 Fiveleaf *Gynostemma*

†*Gynostemma pentaphyllum* (Thunb.)
Makino

習性：草質藤本。花期：3-11月；果期：4-12月。

產地：大帽山、梧桐寨、子門田。生於林中或灌叢。

分佈：陝西南部和長江以南各省區。東亞至亞洲熱帶地區。

用途：藥用。

葫蘆屬 *Lagenaria* Ser.

葫蘆 Bottle Gourd

**Lagenaria siceraria* (Molina) Standl.

習性：一年生攀援草本。花期：夏季；果期：秋季。

產地：田園栽種。

分佈：中國各地栽培。世界熱帶至溫帶地區栽培。

用途：食用、藥用。

絲瓜屬 *Luffa* Mill.

廣東絲瓜（絲瓜） Singkwa Towelgourd

**Luffa acutangula* (L.) Roxb.

習性：一年生草質攀援藤本。花果期：夏秋季。

產地：田園栽種。

分佈：中國各地栽培；但北方少見。世界熱帶地區栽培。

用途：食用、藥用。

水瓜 Vegetable Sponge

**Luffa aegyptica* Mill. (*Luffa cylindrica* Roem.)

習性：一年生攀援草質藤本。花果期：夏秋季。

產地：田園栽種。

分佈：中國各地栽培。世界熱帶至溫帶地區栽培。

用途：食用、藥用。

苦瓜屬 *Momordica* L.

苦瓜 Bitter Cucumber

**Momordica charantia* L.

習性：一年生攀援藤本。花果期：5-11月。

產地：田園栽種。

分佈：中國各地栽培。世界熱帶至溫帶地區栽培。

用途：食用、藥用。

木鼈子 Wooden Tortoise

Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.

習性：藤本。花期：6-10月；果期：8-11月。

產地：大埔、林村、粉嶺、沙頭角。生於山旁、林緣。

分佈：西藏、雲南、四川、貴州、廣西、海南、廣東、湖南、江西、福建、臺灣、浙江、江蘇、安徽。印度、中南半島。

用途：藥用。

佛手瓜屬 *Sechium* P. Browne

佛手瓜 Chayote

**Sechium edule* (Jacq.) Swartz

習性：草質藤本。花期：7-10月；果期：8-11月。

產地：田園栽種。

分佈：雲南、廣西、廣東、四川栽培或逸為野生。原產美洲。

用途：食用。

茅瓜屬 *Solena* Lour.

茅瓜 Claspinglestem *Solena*

Solena amplexicaulis (Lam.) Gandhi

習性：攀援草質藤本。花期：5-10月；果期：6-11月。

產地：香港各地。生於山谷路旁、林中或灌叢，攀援在樹上或灌叢。

分佈：西藏、雲南、四川、貴州、廣西、海南、廣東、江西、福建、臺灣。印度、錫金、越南、印度尼西亞（爪哇）。

用途：藥用。

栝樓屬 *Trichosanthes* L.

蛇瓜 Snakegourd

**Trichosanthes anguina* L. [*Trichosanthes cucumerina* var. *anguina* (L.) Haines]

習性：一年生攀援草質藤本。花果期：夏末及秋季。

產地：引種栽培。

分佈：中國各地栽培。原產印度；非洲東部、日本、馬來西亞、菲律賓亦有栽培。
用途：食用、藥用。

全緣栝樓 (野王瓜) Wild Snakegourd

Trichosanthes ovigera Blume

習性：攀援草質藤本。花期：5-9月；果期：8-12月。

產地：香港島、川龍、大帽山、大埔滘、屏山、大嶼山、南丫島。生於林中或灌叢。

分佈：雲南、貴州、廣西、海南、廣東、福建、臺灣。日本、東喜馬拉雅、泰國、越南、印度尼西亞。

叉指葉栝樓

Trichosanthes pedata Merr. & Chun

習性：草質藤本。花期：夏季。果期：夏至冬季。

產地：蛤塘。生於林中或灌叢。

分佈：廣東、海南。

中華栝樓 Rosthorn Snakegourd

Trichosanthes rosthornii Harms
(*Trichosanthes kirilowii* auct. non Maxim: Check List HK Pl. 1993.)

習性：攀援草質藤本。花期：4-10月；果期：8-12月。

產地：香港島、大帽山、烏蛟騰、大嶼山。生於林中或灌叢。

分佈：雲南、四川、貴州、廣東、江西、湖北、陝西、甘肅。

用途：藥用。

老鼠拉冬瓜屬 *Zehneria* Endl.

老鼠拉冬瓜 Indian *Zehneria*

Zehneria indica (Lour.) Keraudren

習性：攀援或平臥草本。花期：4-10月；果期：7-11月。

產地：大帽山、大埔、大埔滘、甲龍。生於林中或灌叢。

分佈：雲南、四川、廣西、海南、廣東、湖南、江西、福建、浙江、江蘇、安徽、湖北。朝鮮、日本、印度、越南、印度尼西亞、菲律賓。

用途：藥用。

133. 秋海棠科 *Begoniaceae*

秋海棠屬 *Begonia* L.

紅花竹節秋海棠 Scarlet *Begonia*

***Begonia coccinea** W. J. Hook.

習性：多年生草本。花期：夏季至秋季。

產地：公園栽種。

分佈：巴西。

用途：觀賞。

粗喙秋海棠

†**Begonia crassirostris** Irmsh.

習性：多年生草本。花期：4-5月。

產地：大帽山、梅子林、子門田、吊燈籠。生於林下和溪邊濕地。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南。

四季秋海棠 Perpetual *Begonia*

***Begonia cucullata** Willd. (*Begonia semperflorens* Link. & Otto)

習性：多年生草本。花期：全年。

產地：栽培。

分佈：巴西。

用途：觀賞。

紫背天葵 Mountain *Begonia*

Begonia fimbristipula Hance

習性：多年生草本。花期：5-8月。

產地：梧桐寨、馬鞍山、大東山。生於溪邊潮濕石上。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、貴州、湖南、福建。

用途：藥用、觀賞。

竹節秋海棠 Spotted-leaf *Begonia*

†***Begonia maculata** Raddi

習性：多年生草本。花期：夏至秋季。

產地：栽培。

分佈：巴西。

用途：觀賞。

裂葉秋海棠 Cut-leaved *Begonia*

Begonia palmata D. Don (*Begonia*

laciniata Roxb.)

習性：多年生草本。花期：夏季。

產地：香港島、大帽山、梧桐寨、馬鞍山、八仙嶺、大東山、鳳凰山。生於山谷、溪邊濕地。

分佈：長江以南各省區。印度、尼泊爾、緬甸、越南。

用途：觀賞。

斑葉秋海棠 Rex Begonia

**Begonia rex-cultorum* Bailey

習性：多年生草本。花期：夏至秋季。

產地：栽培。

分佈：園藝雜交種，各地廣泛栽培。

用途：觀賞。

球根海棠 Tuberous Begonia

†**Begonia* × *tuberhybrida* Voss

習性：多年生草本。花期：夏季。

產地：栽培。

分佈：園藝雜交種，各地廣泛栽培。

用途：觀賞。

134. 楊柳科 Salicaceae

柳屬 *Salix* L.

垂柳 Weeping Willow

**Salix babylonica* L.

習性：落葉喬木。花期：3-4月；果期：4-5月。

產地：庭園栽種。

分佈：全國各地。亞洲、歐洲。

用途：觀賞。

銀柳 (棉花柳)

**Salix* × *leucopithecia* Kimura

習性：落葉灌木。花期：3-4月。

產地：花農栽種。

分佈：園藝雜交種，現廣泛栽培於世界各地。

用途：觀賞。

136. 白花菜科

Capparidaceae

山柑屬 *Capparis* L.

獨行千里 (尖葉槿果藤)

Capparis acutifolia Sweet (*Capparis membranacea* Gard. & Champ.)

習性：攀援藤本。花期：4-6月。果期：8月至翌年1月。

產地：香港島、荃灣、大帽山、沙頭角、大嶼山。

分佈：江西、湖南、福建、臺灣。

用途：藥用。

廣州槿果藤 Canton Caper

Capparis cantoniensis Lour.

習性：攀援灌木。花期：3-11月；果期：11月至翌年3月。

產地：香港島、大嶼山、長洲、蒲台島。生於山坡疏林中。

分佈：廣西、貴州、福建、雲南。印度、錫金、中南半島、印度尼西亞及菲律賓。

白花菜屬 *Cleome* L.

印度白花菜 Burmann's Cleome

**Cleome burmannii* Wight & Arn.

習性：一年生草本。

產地：沙田、荃灣、川龍、上白泥。生於曠野。

分佈：印度、斯里蘭卡。

白花菜 Wild Spider-flower

**Cleome gynandra* L.

習性：一年生草本。花果期：7-10月。

產地：長洲。栽培或逸為野生。

分佈：南北各地。世界熱帶及亞熱帶地區。

用途：藥用。

†**Cleome rutidosperma* DC.

習性：草本。

產地：栽培。

分佈：原產非洲。

醉蝶花 Spider-flower

***Cleome spinosa** Jacq.

習性：草本。花果期：3—8月。
產地：栽培。
分佈：原產西印度群島，現各大中城市常有栽培。
用途：觀賞。

黃花草（臭屎菜） Stink Grass

Cleome viscosa L.

習性：一年生草本。花期：7月。
產地：灣仔、黃竹坑、城門等地。生於荒坡、路旁及田野。
分佈：海南、廣東、廣西、湖南、江西、福建、浙江、安徽、臺灣。世界熱帶及亞熱帶地區。
用途：藥用。

魚木屬 Crateva L.

鈍葉魚木 Obtuse Leaf Crateva

†***Crateva trifoliata** (Roxb.) B. S. Sun
(*Crateva religiosa* auct. non Forst.:
Check List HK Pl. 1993.)
習性：喬木或灌木。花期：3—5月；果期：8—9月。
產地：八仙嶺、梧桐寨。野生或栽培。
分佈：海南、廣東、廣西、雲南。印度、緬甸、泰國、老撾、越南及柬埔寨等。
用途：行道樹或觀賞樹。

樹頭菜 Spider Tree (no index)

***Crateva unilocularis** Buch.-Ham. (*Crateva religiosa* auct. non Forst.: Check List HK Pl. 1993.)
習性：喬木。花期：3-7月；果期：7-9月。
產地：栽種公園內或行道旁。
分佈：廣東、廣西、雲南。越南、緬甸、老撾、尼泊爾、印度。
用途：觀賞、行道樹。

137. 十字花科 Cruciferae

藝薹屬 Brassica L.

芥蘭 Chinese Kale

***Brassica alboglabra** L. H. Bailey
習性：一年生草本。花期：3-4月。
產地：田園栽種。
分佈：廣東、廣西常見栽培。

用途：蔬菜。

擘藍（芥蘭頭） Kohlrabi

***Brassica caulorapa** DC. ex Laveille
習性：二年生草本。花期：4月。
產地：田園栽種。
分佈：全國大多數省區均有栽培。原產歐洲。
用途：蔬菜（球莖）。

青菜（白菜） Chinese White Cabbage

***Brassica chinensis** L.
習性：一、二年生草本。花果期：4-5月。
產地：田園栽種。
分佈：全國各地。原產亞洲。
用途：蔬菜。

芥菜 Indian mustard

***Brassica juncea** (L.) Czern. & Coss.
習性：草本。
產地：田園栽種。
分佈：全國各地栽培。
用途：蔬菜、調味料及藥用（種子）。

大葉芥菜（梅菜） Miu Choi

***Brassica juncea** var. *foliosa* L. H. Bailey
習性：草本。
產地：田園栽種。
分佈：我國南方有栽培。
用途：蔬菜。

花椰菜（椰菜花） Cauliflower

***Brassica oleracea** var. *botrytis* L.
習性：草本。花期：4月。
產地：田園栽種。
分佈：全國各地栽培。
用途：蔬菜。

甘藍（椰菜） Cabbage, Savoy Cabbage

***Brassica oleracea** var. *capitata* L.
習性：二年生草本。花期：4月。
產地：田園栽種。
分佈：全國各地栽培。
用途：蔬菜。

菜心 Flowering Chinese Cabbage

**Brassica parachinensis* L. H. Bailey

習性：一、二年生草本。

產地：田園栽種。

分佈：全國各地栽培。

用途：蔬菜。

白菜（紹菜、黃牙白） Chinese Cabbage

**Brassica pekinensis* (Lour.) Rupr.

習性：二年生草本。花期：5月。

產地：田園栽種。

分佈：全國廣泛栽培。原產華北。

用途：蔬菜。

蕪菁（大頭菜） Turnip

**Brassica rapa* L.

習性：二年生草本。花期：3-4月；果期：5-6月。

產地：田園栽種。

分佈：全國各地栽培。原產歐洲。

用途：蔬菜（塊根）或飼料。

薺菜屬 *Capsella* Medik.

薺菜 Shepherd's Purse

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

習性：一、二年生草本。花果期：1-3月。

產地：香港仔、扯旗山、西貢、梧桐寨、碗窰。生於山坡、田邊及路旁。

分佈：幾遍全國。廣佈於全世界溫帶地區。

用途：蔬菜、藥用。

碎米薺屬 *Cardamine* L.

彎曲碎米薺（碎米薺） Bitter Cress

Cardamine flexuosa With.

習性：一或二年生草本。花期：1-3月。

產地：香港各地。生於田邊、路旁及草地。

分佈：幾遍全國。朝鮮、日本、俄羅斯、歐洲、北美洲。

用途：藥用。

臭薺屬 *Coronopus* Zinn

臭薺 Wart Cress

Coronopus didymus (L.) J. E. Smith

習性：一或二年生草本。花期：3月；果期：

4月。

產地：扯旗山、大坑、沙田。生於路旁或荒地。

分佈：廣東、福建、江西、安徽、江蘇、浙江、臺灣、山東、湖北、四川、雲南。歐洲、北美、亞洲。

獨行菜屬 *Lepidium* L.

獨行菜 Papergrass

†*Lepidium apetalum* Willd.

習性：一或二年生草本。花期：5-7月

產地：大嶼山。生於山溝、路旁。

分佈：東北、華北、華東、西北、西南。俄羅斯、亞洲東部及中部、喜馬拉雅地區。

用途：藥用。

香雪球屬 *Lobularia* Desv.

香雪球

**Lobularia maritima* (L.) Desv.

習性：多年生草本。花期：3-4月

產地：栽培。

分佈：我國部分地區（園圃）有栽培。原產地中海地區。

用途：觀賞。

豆瓣菜屬 *Nasturtium* R. Br.

西洋菜 Water Cress

**Nasturtium officinale* R. Br. [*Rorippa nasturtium-aquaticum* (L.) Hayek]

習性：多年生水生草本。花期4-5月。

產地：田園栽種。

分佈：廣東、廣西、四川、貴州、雲南、西藏、河北、山西、山東、河南、安徽、江蘇、陝西、黑龍江。

用途：蔬菜、藥用。

蘿蔔屬 *Raphanus* L.

蘿蔔（萊菔） Chinese Radish

**Raphanus sativus* L.

習性：一或二年生草本。花期：4-5月；果期：5-6月。

產地：田園栽種。

分佈：全國各地普遍栽培。

用途：蔬菜。

蔞菜屬 *Rorippa* Scop.

廣州蔞菜 (微子蔞菜)

Rorippa cantoniensis (Lour.) Ohwi
(*Nasturtium microspermum* DC.)

習性：一或二年生草本。花期：3-4月。
產地：上水。生於田邊路旁、溝邊潮濕地。
分佈：遼寧、河北、山東、河南、安徽、江蘇、浙江、江西、福建、臺灣、湖北、湖南、廣東、廣西、陝西、四川、雲南。朝鮮、俄羅斯、越南、日本。

無瓣蔞菜

Rorippa dubia (Pers.) Hara

習性：一年生草本。
產地：香港有記錄。生於路旁、濕地。
分佈：安徽、江蘇、浙江、江西、福建、湖北、湖南、廣東、廣西、陝西、甘肅、四川、貴州、雲南、西藏。日本、菲律賓、印度尼西亞、印度、美國。
用途：藥用 (全草)。

蔞菜 (塘葛菜)

Rorippa indica (L.) Hiern

習性：一或二年生草本。花期：4--5月。
產地：新界、大嶼山。生於路旁、田邊潮濕地，亦見於田園栽種。
分佈：廣東、湖南、四川、雲南、西藏、山東、河南、江蘇、浙江、江西、福建、臺灣、陝西、甘肅。日本、朝鮮、菲律賓、印度尼西亞、印度。
用途：藥用 (全草)。

147. 杜鵑花科 *Ericaceae*

吊鐘屬 *Enkianthus* Lour.

吊鐘 Chinese New Year Flower

Enkianthus quinqueflorus Lour.

習性：灌木。花期：1-2月；果期：秋季。
產地：香港各地。生於山地灌叢或早期次生林中。
分佈：海南、廣東、廣西、湖南和福建。
用途：觀賞、藥用。

珍珠花屬 *Lyonia* Nutt.

珍珠花 Ovate-leaf *Lyonia*

Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude

習性：灌木或小喬木。花期：4-5月。

產地：馬鞍山。

分佈：西藏、四川、雲南、貴州、廣西、廣東和臺灣。尼泊爾、錫金、不丹和中南半島。

用途：藥用。

馬醉木屬 *Pieris* D. Don

長萼馬醉木 Long-calyx *Pieris*

†***Pieris swinhoei*** Hemsl.

習性：灌木。花期：3-5月。

產地：城門。

分佈：廣東和福建。

杜鵑花屬 *Rhododendron* L.

毛葉杜鵑 Champion's *Rhododendron*

Rhododendron championae Hook.

習性：灌木或小喬木。花期：3-4月；果期：9-10月。

產地：扯旗山、馬鞍山、烏蛟騰、大澳、新洲。生於山地次生林中。

分佈：廣東、廣西、福建、湖南和浙江。

用途：觀賞。

華麗杜鵑 Mrs. Farrer's *Rhododendron*

Rhododendron farrerae Tate

習性：灌木。花期：2-8月；果期：9月。

產地：香港島、馬鞍山、沙頭角、大嶼山。生於山坡灌叢中。

分佈：華南和華中地區。

用途：觀賞。

香港杜鵑 Hongkong *Azalea*

Rhododendron hongkongense Hutch.

習性：灌木。花期：4月；果期：10月。

產地：跑馬地、聶高信山、馬鞍山、大嶼山。

分佈：廣東。

白杜鵑 White *Azalea*

****Rhododendron mucronatum*** (Blume) G. Don

習性：常綠灌木。花期：2-3月；果期：8-9月。

產地：常見栽種於園林中。

分佈：中國東南部和日本。

用途：觀賞。

錦繡杜鵑 Lovely Azalea

**Rhododendron pulchrum* Sweet

習性：灌木。花期：2-3 月；果期：9-10 月。

產地：見栽種於園林中。

分佈：原產中國。

用途：觀賞。

紫杜鵑花 Purple Azalea

**Rhododendron pulchrum* var. *phoeniceum*
(G. Don) Rehd.

習性：常綠灌木。花期：2-4 月；果期：9-10 月。

產地：見栽種於園林中。

用途：觀賞。

南華杜鵑 South China *Rhododendron*

Rhododendron simiarum Hance

習性：灌木。花期：4-5 月；果期：10 月。

產地：馬鞍山、大嶼山。生於山坡灌叢中。

分佈：海南、廣東、廣西、湖南、江西、福建和浙江。

紅杜鵑 Red Azalea

Rhododendron simsii Planch.

習性：灌木。花期：2-3 月；果期：7-9 月。

產地：香港各地。生於山坡灌叢中。

分佈：長江流域以南各省區。越南和泰國。

用途：庭園綠化、藥用。

羊角杜鵑 Westland's *Rhododendron*

Rhododendron moultainense Hook. f.
(*Rhododendron westlandii* Hemsl.)

習性：灌木或喬木。花期：4-5 月；果期：6-7 月。

產地：馬鞍山、八仙嶺、烏蛟騰、大嶼山。生於次生林中。

分佈：雲南、貴州、廣西、廣東、湖南和福建。緬甸、越南、泰國和馬來西亞。

烏飯樹屬 *Vaccinium* L.

小葉烏飯樹 Don Blue Berry

†*Vaccinium bracteatum* var. *chinense*
(Lodd.) Chun ex Sleumer (*Vaccinium*

bracteatum auct. non Thunb.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：灌木或小喬木。花期：6-7 月；果期：11-12 月。

產地：香港仔、淺水灣、扯旗山、大帽山、馬鞍山。常生於海拔 500 米以上的山地灌叢中。

分佈：廣東、廣西。

151. 山欖科 Sapotaceae

金葉樹屬 *Chrysophyllum* L.

金葉樹 Golden Leaf Tree

Chrysophyllum lanceolatum var. *stellatocarpon* van Royen

習性：喬木。花期：5 月；果期：10 月。

產地：跑馬地、黃泥涌、荔枝窩。生於山坡雜木林中。

分佈：海南、廣西。印度尼西亞、斯里蘭卡、中南半島至新加坡。

人心果屬 *Manilkara* Adans.

人心果 *Sapodilla*

**Manilkara zapota* (L.) P. Royen (*Sapota achras* Mill.; *Achras zapota* L.)

習性：喬木。花果期：4-6 月。

產地：庭園和果園栽培。

分佈：廣西、廣東、雲南有栽培。原產中美洲。

用途：食用。

香欖屬 *Mimusops* L.

香欖 (牛油果) Spanish-Cherry

**Mimusops elengii* L.

習性：喬木。

產地：公園和庭園栽種。

分佈：臺灣有栽培。斯里蘭卡、印度、越南至馬來西亞。

用途：藥用。

肉實樹屬 *Sarcosperma* Hook.

肉實樹 Fleshy Nut Tree

Sarcosperma laurinum (Benth.) Hook. f.

習性：喬木。花期：8-9 月；果期：12-1 月。

產地：香港各地。生於山坡雜木林中。

分佈：海南、廣西。印度尼西亞、斯里蘭卡、
中南半島、馬來西亞、新加坡等。

鐵欖屬 *Sinosideroxylon* (Engl.)
Aubr.

革葉鐵欖 (鐵欖) Iron Olive

Sinosideroxylon wightianum (Hook. & Arn.)
Aubr.

習性：喬木。

產地：黃泥涌、扯旗山、城門、沙田、獅子
山、馬鞍山、大帽山、大嶼山。

分佈：廣東、雲南、貴州。越南。

152. 柿科 Ebenaceae

柿屬 *Diospyros* L.

烏柿 (烏材) Woollyflower Persimmon

Diospyros eriantha Champ. ex Benth.

習性：喬木或灌木。花期：7-8月；果期：
10-12月。

產地：香港各地。生於低地山坡疏林中或溪
邊林中。

分佈：廣東、海南、廣西、臺灣。老撾、越
南、馬來西亞、印度尼西亞。

柿 Kaki Persimmon

****Diospyros kaki*** Thunb.

習性：喬木或灌木。花期：5-6月；果期：
9-10月。

產地：庭園或果園栽種。

分佈：原產我國，南北各地均有分佈或栽
培。日本、印度、歐洲等地有引種。

用途：食用、藥用。

羅浮柿 Morris Persimmon

Diospyros morrisiana Hance

習性：喬木。花期：5-6月；果期：11月。

產地：香港各地。生於山坡或溪畔疏林中。

分佈：海南、廣東、廣西、貴州、湖南、江
西、浙江、福建、臺灣、雲南、四川。
越南。

用途：塗料、藥用。

油杯子 (延平柿)

Diospyros tsangii Merr.

習性：喬木。果期：7-10月。

產地：西貢、大潭。生於疏林中。

分佈：廣東、廣西、福建、湖南、江西。

嶺南柿 Tutcher's Persimmon

Diospyros tutcherii Dunn

習性：喬木。花期：4-5月；果期：8-10
月。

產地：歌賦山、芬梨道、大潭、大帽山、八
仙嶺。生於溝谷疏林中。

分佈：廣東、廣西、湖南、貴州。

小果柿 Small Persimmon

Diospyros vaccinioides Lindl.

習性：灌木。花期：5月；果期：冬季。

產地：香港各地。生於溝谷、疏林或山坡灌
叢中。

分佈：廣東。

153. 安息香科 Styracaceae

赤楊葉屬 *Alniphyllum* Matsum.

赤楊葉 Fortune's China-bell

Alniphyllum fortunei (Hemsl.) Makino

習性：喬木。花期：4-7月；果期：8-10月。
產地：跑馬地、觀音山、大嶼山。生於次生
林中。

分佈：長江流域以南各省區。印度、越南、
緬甸。

用途：材用。

山茱萸屬 *Huodendron* Rehd.

嶺南山茱萸 (小花山茱萸) Smallflower
Huodendron

†***Huodendron biaristatum*** subsp.
parviflorum (Merr.) C. Y. Tang

習性：喬木或灌木。花期：3-5月；果期：
8-10月。

產地：梧桐寨。生於山谷林中。

分佈：廣東、廣西、湖南、江西和雲南。

木瓜紅屬 *Rehderodendron* Hu

廣東木瓜紅 Kwangtung Rehdertree

Rehderodendron kwangtungensis Chun

習性：喬木。花期：3-4月；果期：7-9月。

產地：梧桐寨、觀音山。生於密林中。

分佈：廣東、湖南、廣西、雲南。

安息香屬 *Styrax* L.

賽山梅 (狗肝柴) *Confused Styrax*

Styrax confusus Hemsl. (*Styrax faberi* auct. non Park.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：灌木。花期：4-6 月；果期：9-11 月。

產地：大嶼山。生於疏林中或林緣。

分佈：海南、廣東、廣西、貴州、四川、福建、江西、江蘇、安徽。

芬芳安息香 *Fragrant Snow-bell*

Styrax odoratissimus Champ.

習性：灌木。花期：4-6 月；果期：7-11 月。

產地：淺水灣、灣仔峽、黃竹坑、薄扶林、香港仔、大潭篤、大東山。生於疏林中或林緣。

分佈：貴州、廣西、廣東、江西、福建、湖南、浙江、江蘇、湖北和安徽。

栓葉安息香 (紅皮) *Cork-leaved Snow-bell*

Styrax suberifolius Hook. & Arn.

習性：喬木。花期：3-6 月；果期：7-11 月。

產地：扯旗山、聶高信山、大潭、鶴咀、大帽山。生於疏林中。

分佈：長江流域以南各省區。越南。

155. 山礬科 *Symplocaceae*

山礬屬 *Symplocos* Jacq.

腺葉山礬 *Glandularleaf Sweetleaf*

†*Symplocos adenophylla* Wall.

習性：喬木。花果期：7-8 月。

產地：馬鞍山。生於山地疏林中。

分佈：海南、廣東、廣西、福建、雲南。越南、印度、馬來西亞、新加坡、印度尼西亞。

腺柄山礬 *Glandularstipe Sweetleaf*

Symplocos adenopus Hance

習性：喬木。花期：11-12 月；果期：翌年 7-8 月。

產地：香港 (僅見記錄)。

分佈：廣東、廣西、福建、湖南、雲南、貴州。

薄葉山礬

†*Symplocos anomala* Brand.

習性：常綠小喬木。花期：9 月。

產地：大東山。生於雜木林中。

分佈：長江流域以南各省區。

黃牛奶樹 *Laurel Sweetleaf*

Symplocos cochinchinensis var. *laurina*

Nooteb. [*Symplocos laurina* (Retz.) Wall.]

習性：喬木。花期：8-12 月；果期：翌年 3-6 月。

產地：香港各地常見。生於次生林或灌叢中。

分佈：華南、華中、西南及華東等省區。印度、斯里蘭卡。

用途：藥用；材用。

南嶺山礬 *Confuse Sweetleaf*

Symplocos confusa Brandis

習性：小喬木。花期：6-8 月；果期：9-11 月。

產地：鳳凰山。生於次生林中。

分佈：廣東、廣西、江西、湖南、福建、臺灣、浙江、雲南、貴州。

密花山礬 *Denseflower Sweetleaf*

Symplocos congesta Benth.

習性：喬木或灌木。花期：8-11 月；果期：翌年 1-2 月。

產地：香港島、大嶼山。

分佈：海南、廣東、廣西、江西、湖南、福建、臺灣、雲南。

厚葉山礬 *Thickbark Sweetleaf*

Symplocos crassifolia Benth.

習性：喬木。花期：6-11 月。果期：12 月至翌年 5 月。

產地：馬鞍山、大帽山、大嶼山、香港島。生於次生林中。

分佈：海南、廣東、廣西。

美山礬 *Beautiful Sweetleaf*

†*Symplocos decora* Hance

習性：小喬木。花期：3-5 月；果期：7-10 月。

產地：大帽山。生於次生林中。
分佈：廣東、廣西、浙江。

三裂山馨 Ford Sweetleaf

Symplocos fordii Hance

習性：喬木。花果期：5-11月。
產地：扯旗山、西高山。生於山頂疏林中。
分佈：廣東。

羊舌樹 Glaucous Sweetleaf

Symplocos glauca (Thunb.) Koidz.

習性：喬木。花期：4-8月；果期：8-10月。
產地：大潭篤、鶴咀、大坳門、蠔涌、西貢、大帽山、大埔、荔枝窩。生於低海拔次生林中。
分佈：廣東、廣西、雲南、福建、臺灣、浙江。

光葉山馨 Smoothleaf Sweetleaf

Symplocos lancifolia Sieb. & Zucc.
(*Symplocos microcarpa* Champ.)

習性：小喬木。花期：3-11月；果期：6-12月。
產地：香港各地。生於疏林或灌叢中。
分佈：長江以南各省區。日本。

白檀 Sapphirebetty Sweetleaf

Symplocos paniculata (Thunb.) Miq.

習性：落葉灌木或小喬木。
產地：大浪灣、城門、大埔滘、粉嶺、河背、大欖涌、青山。生於灌叢中或草地。
分佈：幾遍全國。朝鮮、日本、印度。
用途：藥用。

山馨

Symplocos sumuntia Buch.-Ham. ex D. Don

習性：草本。花期：2-3月；果期：6-7月。
產地：扯旗山、馬鞍山、大嶼山。生於山頂疏林中。
分佈：長江以南各省區。尼泊爾、不丹、印度。

微毛山馨 Puberulous Sweetleaf

†**Symplocos wikstroemiifolia** Hayata

習性：灌木或小喬木。

產地：馬鞍山。生於次生林中。

分佈：海南、廣東、廣西、湖南、福建、臺灣、浙江、雲南、貴州。

157. 紫金牛科 Myrsinaceae

蠟燭果屬 *Aegiceras* Gaertn.

蠟燭果 (桐花樹)

Aegiceras corniculatum (L.) Blanco

習性：常綠灌木。花期：12-2月；果期：10-12月。
產地：香港各地海邊泥灘地。生於紅樹林中。
分佈：海南、廣東、廣西、福建。印度、中南半島、馬來西亞至澳大利亞。

紫金牛屬 *Ardisia* Sw.

小紫金牛 Chinese Ardisia

Ardisia cymosa Blume (*Ardisia chinensis* Benth.)

習性：常綠灌木。花期：4-6月；果期：10-12月。
產地：柏架山、烏蛟騰、大帽山。生於山谷林下、溪邊。
分佈：華東、華南。中南半島、泰國、馬來西亞。

朱砂根 Hilo holly

Ardisia crenata Sims

習性：常綠灌木。花期：5-6月；果期：10-12月。
產地：香港各地。生於山谷疏林下。
分佈：華中、華東、華南、西南。日本、中南半島、馬來西亞。
用途：藥用、觀賞。

東方紫金牛

†***Ardisia elliptica** Thunb. (*Ardisia squamulosa* Presl)

習性：常綠灌木。花期：2-4月；果期：9-11月。
產地：錦繡花園、米埔。栽培或逸為野生。
分佈：臺灣。印度、泰國至馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓。
用途：觀賞。

月月紅

†*Ardisia faberii* Hemsl.

習性：常綠灌木。花期：5-7 月；果期：11 月至翌年 1 月。

產地：青衣。生於溪邊、林下。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、湖北、湖南。

用途：觀賞。

灰色紫金牛

Ardisia fordii Hemsl. (*Ardisia affinis* auct. non Hemsl.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：常綠灌木。花期：6-8 月；果期：10-12 月。

產地：大帽山、大埔滘、烏蛟騰。生於林下。

分佈：廣東、廣西。泰國。

郎傘樹 Hance's Ardisia

Ardisia hanceana Mez (*Ardisia elegans* auct. non Andr.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：常綠灌木。花期：6-7 月；果期：12 月至翌年 4 月。

產地：香港仔、鶴咀、聶高信山、黃竹洋、西貢、馬鞍山、梧桐寨、大帽山、大嶼山。生於山谷林下。

分佈：海南、廣東、廣西、福建。越南。

用途：觀賞。

山血丹（腺點紫金牛） Spotted Ardisia

Ardisia lindleyana D. Dietr. (*Ardisia punctata* Lindl.)

習性：常綠灌木。花期：5-7 月；果期：10-12 月。

產地：香港各地。山谷林下。

分佈：廣東、廣西湖南、江西福建、浙江；越南。

用途：觀賞。

心葉紫金牛

†*Ardisia maclurei* Merr.

習性：常綠小灌木。花期：5-6 月；果期：11-12 月。

產地：大埔滘自然保護區。山谷林下。

分佈：廣東、廣西、貴州。

虎舌紅

Ardisia mamillata Hance

習性：常綠灌木。花期：6-7 月；果期：11 月至翌年 1 月。

分佈：大埔滘、大帽山、甲龍。生於山谷林下。

產地：廣東、廣西、雲南、四川、貴州、湖南、福建。

用途：觀賞。

蓮座紫金牛

Ardisia primulifolia Gardn. & Champ.

習性：常綠亞灌木。花期：6-7 月；果期：11 月至翌年 5 月。

產地：香港島、西貢、大埔滘、大帽山、大嶼山。生於林下。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、湖南、江西、福建。越南。

用途：觀賞。

九節龍 Creeping Ardisia

†*Ardisia pusilla* A. DC. (*Ardisia reptans* auct. non Merr.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：常綠亞灌木。花期：5-7 月；果期：7-12 月。

產地：柏架山、大埔、大嶼山、南丫島。生於林下。

分佈：廣東、廣西、四川、貴州、湖南、江西、福建。

羅傘樹 Asiatic Ardisia

Ardisia quinquegona Blume

習性：常綠灌木。花期：3-6 月；果期：8 月至翌年 2 月。

產地：香港各地。生於林下、溪邊。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、福建、臺灣。日本、印度、泰國、中南半島、馬來西亞。

用途：觀賞。

多枝紫金牛

†*Ardisia sieboldii* Miq. (*Ardisia obtusa* auct.

non Mez: Check List HK Pl. 1993.)

習性：常綠灌木。花期：3-6 月；果期：1-4 月。

產地：香港有記錄。生於海邊林緣。

分佈：福建、臺灣。日本。

用途：觀賞。

雪下紅

Ardisia villosa Roxb. (*Ardisia dumetosa* Tutcher)

習性：常綠灌木。花期：4-7 月；果期：12 月至翌年 7 月。

產地：粉嶺、上水。生於溪邊、林下。

分佈：廣東、廣西、臺灣。緬甸、泰國、中南半島、馬來西亞。

用途：觀賞。

酸藤子屬 *Embelia* Burm. f.

酸藤子 Twig-hanging *Embelia*

Embelia laeta (L.) Mez

習性：常綠藤本。花期：12 月至翌年 3 月；果期：4-6 月。

產地：香港各地。生於林緣、灌叢中。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、江西、福建、臺灣。中南半島。

當歸藤 Small-leaved *Embelia*

Embelia parviflora Wall. ex A. DC.

習性：半落葉藤本。花期：12 月至翌年 5 月；果期：1-11 月。

產地：大帽山、大東山。生於林下。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、貴州、福建。印度、緬甸、中南半島、馬來西亞。

用途：藥用。

白花酸藤子 White-flowered *Embelia*

Embelia ribes Burm. f.

習性：常綠藤本。花期：1-7 月；果期：5-12 月。

產地：香港各地。林緣、路邊、灌叢中。

分佈：海南、廣東、廣西、西藏、雲南、福建。印度、緬甸、泰國、中南半島、馬來西亞。

網脈酸藤子

†*Embelia rudis* Hand.-Mazz.

習性：常綠藤本。花期：10-12 月；果期：4-7 月。

產地：大帽山、大嶼山。生於林下、灌叢中。

分佈：廣東、廣西、四川、貴州、湖南、江西、浙江、福建、臺灣。

平葉酸藤子 long-leaved *Embelia*

Embelia undulata (Wall.) Mez [*Embelia longifolia* (Benth.) Hemsl.]

習性：常綠藤本。花期：6-8 月；果期：11 月至翌年 1 月。

產地：香港仔、聶高信山、上禾坑、大嶼山。生於山谷林下。

分佈：廣東、廣西、雲南、四川、貴州、江西、福建。

密齒酸藤子 Lentice-bearing *Embelia*

Embelia vestita Roxb. (*Embelia oblongifolia* Hemsl.)

習性：常綠藤本。花期：10 月至翌年 2 月；果期：11 月至翌年 3 月。

產地：大帽山。生於林緣、灌叢中。

分佈：海南、廣東、廣西、西藏、雲南、四川、貴州、湖南、福建、浙江。印度、緬甸、越南。

杜莖山屬 *Maesa* Forssk.

杜莖山 Japanese *Maesa*

Maesa japonica (Thunb.) Moritz & Zoll.

習性：常綠灌木。花期：1-3 月；果期：10 月至翌年 5 月。

產地：香港各地。生於林緣、灌叢中。

分佈：廣東、廣西、雲南、四川、貴州、湖北、湖南、江西、浙江、臺灣。日本、越南。

用途：觀賞。

鯽魚膽

Maesa perlarius (Lour.) Merr.

習性：常綠藤本。花期：3-4 月；果期：12 月至翌年 5 月。

產地：香港各地。生於林緣、灌叢中。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、四川、貴

州、臺灣。泰國、越南。
用途：藥用。

金珠柳

Maesa montana A. DC. (*Maesa tenera* auct. non Mez: Check List HK Pl. 1993.)

習性：常綠灌木。花期：2-4 月。
產地：大帽山、馬鞍山。生於林緣、灌叢中。
分佈：海南、廣東、廣西、福建、臺灣、四川、雲南。印度、緬甸、泰國、越南。

鐵仔屬 *Myrsine* L.

密花樹

Myrsine sequinii Lévl. [*Rapanea neriifolia* (Sieb. & Zucc.) Mez ; *Rapanea linearis* acut. non (Lour.) Poiret: Check List HK Pl. 1993.]

習性：常綠灌木。花期：4-5 月；果期：10-12 月。

產地：香港各地。生於林緣、灌叢中。
分佈：長江以南各省。緬甸、泰國、中南半島、日本。

用途：觀賞。

158. 報春花科 *Primulaceae*

琉璃繁縷屬 *Anagallis* L.

琉璃繁縷 Poor Men's Weather-glass

Anagallis arvensis L.

習性：一年生草本。花期：3-4 月。
產地：香港有記錄。生於荒地、草地中。
分佈：廣東、福建、浙江、臺灣。廣佈於溫帶和熱帶地區。

仙客來屬 *Cyclamen* L.

仙客來 (兔仔花) *Cyclamen*

***Cyclamen persicum** Mill.

習性：多年生草本。花期：冬至春季。
產地：栽培。
分佈：原種產於地中海區。

過路黃屬 *Lysimachia* L.

香港過路黃 Hongkong Loosestrife

Lysimachia alpestris Champ. ex Benth.

習性：多年生草本。花期：4-5 月。
產地：香港島、城門、馬鞍山。生於次生林

下，灌叢中。

分佈：廣東 (新會)。

用途：觀賞。

澤珍珠菜

Lysimachia candida Lindl.

習性：二年生草本。花期：3-6 月。
產地：掃桿埔。生於田邊、溝邊、溪邊。
分佈：陝西、河南、山東和長江以南各省區。
緬甸、越南、日本。

延葉珍珠菜

Lysimachia decurrens Forst. f.

習性：多年生草本。花期：4-5 月。
產地：七木橋、鹿頸、大嶼山。生於山谷溪邊、林緣。
分佈：廣東、廣西、雲南、貴州、湖南、江西、福建、臺灣。印度、泰國、中南半島、馬來西亞。

紅根草 Fortune's loosestrife

Lysimachia fortunei Maxim.

習性：多年生草本。花期：6-8 月。
產地：薄扶林道。生於溝邊、路邊濕地。
分佈：華南、華東、華中各省區。朝鮮、日本、越南。
用途：藥用。

報春花屬 *Primula* L.

藏報春 Chinese Primrose

***Primula sinensis** Sabine

習性：多年生草本。花期：12 月至翌年 3 月。
產地：栽培。
分佈：四川、貴州。各地廣泛栽培。
用途：觀賞。