

160. 牛栓藤科 Connaraceae

紅葉藤屬 *Rourea* Aubl.

小葉紅葉藤 (紅葉藤) Littleleaf *Rourea*

Rourea microphylla (Hook. & Arn.) Planch.

習性：攀援灌木。花期：3-10 月；果期：5 月至翌年 3 月。

產地：香港各地。生於山坡或林中。

分佈：雲南、廣西、海南、廣東、福建。印度斯里蘭卡、越南、印度尼西亞。

用途：藥用、單寧。

大葉紅葉藤 (牛栓藤) Bigleaf *Rourea*

Rourea minor (Gaertn.) Alston

習性：藤本或攀援小灌木。花期：4-10 月；果期：5 月至翌年 3 月。

產地：香港仔、海下、赤徑、大嶼山。生於灌叢或林中。

分佈：雲南、海南、廣東、臺灣。印度、斯里蘭卡、老撾、越南、柬埔寨、菲律賓、澳大利亞 (昆士蘭)。

165. 海桐花科

Pittosporaceae

海桐花屬 *Pittosporum* Banks

光葉海桐 (崖花子) Glabrous *Pittosporum*

Pittosporum glabratum Lindl.

習性：灌木。

產地：香港各地。生於山坡疏林中。

分佈：海南、廣西、湖南、貴州。

用途：藥用。

狹葉海桐 Oleanderleaf *Pittosporum*

†*Pittosporum glabratum* var. *neriifolium*

Rehd. & Wils.

習性：灌木。

產地：香港仔。

分佈：貴州、湖南、湖北、江西。

海桐 *Pittosporum*

**Pittosporum tobira* (Thunb.) Ait.

習性：灌木。

產地：果洲群島、公園栽培。

分佈：長江以南各地。日本、朝鮮。

用途：觀賞。

167. 繡球花科

Hydrangeaceae (incl. Philadelphaceae)

常山屬 *Dichroa* Lour.

常山 Antifebrile *Dichroa*.

Dichroa febrifuga Lour.

習性：灌木。花期：2-4 月；果期：5-8 月。

產地：扯旗山、大帽山、大嶼山、西貢、林村。生於陰濕林下、灌叢中。

分佈：長江流域以南各省區。印度、越南、緬甸、馬來西亞、菲律賓、印度尼西亞、日本(琉球群島)。

用途：藥用。

繡球屬 *Hydrangea* L.

繡球 *Hydrangea*

**Hydrangea macrophylla* (Thunb.) Ser.

習性：落葉灌木。花期：6-8 月。

產地：公園及庭園栽培。

分佈：華南、華中、華東。朝鮮、日本。

用途：觀賞。

冠蓋藤屬 *Pileostegia* Hook. f. & Thoms.

星毛冠蓋藤

†*Pileostegia tomentella* Hand.-Mazz.

習性：常綠藤本。花期：3-8 月；果期：9-12 月。

產地：大帽山。生於林緣。

分佈：廣東、廣西、湖南、江西、福建。

用途：觀賞。

冠蓋藤

Pileostegia viburnoides Hook. f. & Thoms.

習性：常綠藤本。花期：7-8 月；果期：9-12 月。

產地：柏架山、大帽山、大嶼山。生於林緣。

分佈：長江以南各省。印度、越南、日本。

169. 鼠刺科 Grossulariaceae

鼠刺屬 *Itea* L.

老鼠刺 (鼠刺) *Itea*

Itea chinensis Hook. & Arn.

習性：灌木或小喬木。花期：4—5 月；果期：6—8 月。

產地：香港各地。生於疏林中。

分佈：廣東、廣西、雲南。不丹、老撾、印度。

矩形葉老鼠刺

†**Itea chinensis** var. **oblonga** (Hand.-Mazz.) C. Y. Wu

習性：灌木或小喬木。花期 3—5 月，果期 6—8 月。

產地：大帽山。生於山坡灌叢。

分佈：長江流域以南各省。

174. 景天科 **Crassulaceae**

落地生根屬 **Bryophyllum** Salisb.

落地生根 **Air-plant**

***Bryophyllum pinnatum** (L.) Oken
[*Kalanchoe pinnatum* (Lam.) Pers.]

習性：一年生草本。花期：夏至秋季。

產地：栽培或逸為野生。

分佈：原產非洲，現廣佈於熱帶、亞熱帶地區。

用途：觀賞。

青鎖龍屬 **Crassula** L.

玉樹

†***Crassula argentea** Thunb. (*Crassula portulaca* Lam.)

習性：常綠灌木。少見開花。

產地：栽培。

分佈：南非。

用途：觀賞。

青鎖龍

***Crassula lycopodioides** Lam.

習性：多年生草本。

產地：栽培。

分佈：原產南非。

用途：觀賞。

蓮花掌屬 **Echeveria** DC.

蓮花掌

***Echeveria glauca** Baker

習性：多年生草本。花期：夏至秋季。

產地：栽培。

分佈：原產墨西哥。

用途：觀賞。

伽藍菜屬 **Kalanchoe** Adans.

多花伽藍菜

†***Kalanchoe blossfeldiana** V. Poellnitz

習性：多年生草本。花期：10 月至翌年 2 月。

產地：栽培。

分佈：馬達加斯加。

用途：觀賞。

大葉落地生根

†***Kalanchoe daigremontiana** Hamet & Perr.

習性：多年生草本。花期：夏秋季。

產地：栽培。

分佈：馬達加斯加。

用途：觀賞。

紅川蓮 (紅花伽藍菜)

†***Kalanchoe flammea** Stapf

習性：多年生草本。花期：冬季。

產地：栽培。

分佈：原產熱帶非洲。

用途：觀賞。

伽藍菜

***Kalanchoe laciniata** (L.) DC.

習性：多年生草本。花期：幾全年。

產地：栽培。

分佈：南非。

用途：觀賞。

匙葉伽藍菜

***Kalanchoe spatulata** DC.

習性：一年生草本。花期：1-3 月。

產地：鶴咀。栽培或逸為野生。

分佈：海南、廣東、廣西、福建、雲南、西藏。印度、越南、印度尼西亞、菲律賓。

趣蝶蓮

†***Kalanchoe synsepala** Bak.

習性：多年生草本。花期：夏秋季。
產地：栽培。
分佈：馬達加斯加。
用途：觀賞。

洋吊鐘

***Kalanchoe verticillata** Elliot

習性：多年生草本。花期：夏秋季。
產地：栽培。
分佈：南非。
用途：觀賞。

景天屬 Sedum L.

東南景天

***Sedum alfredii** Hance

習性：一年生草本。花期：4-5月。
產地：栽培。
分佈：華南、華中、華東。朝鮮、日本。
用途：藥用。

佛甲草

Sedum lineare Thunb. (*Sedum chrysastrum*
auct. non Hance: Check List HK Pl.
1993.)

習性：多年生草本。花期：4-5月。
產地：栽培。生於向陽濕潤處。
分佈：秦嶺以南各省區。日本。
用途：藥用。

176. 虎耳草科 Saxifragaceae

虎耳草屬 Saxifraga L.

虎耳草 Creeping Rockfoil

***Saxifraga stolonifera** Meerb.

習性：草本。花期：3-4月；果期：4-5月。
產地：庭園或公園栽培。生於林下、灌叢、
蔭濕岩隙間。
分佈：長江流域以南各省區。朝鮮、日本。

177. 薔薇科 Rosaceae

龍芽草屬 Agrimonia L.

龍牙草 Pilose Cocklebur

Agrimonia pilosa Ledeb. (*Agrimonia*
eupatoria auct. non L.: Check List HK

Pl. 1993.)

習性：多年生草本。花果期：5-12月。
產地：大園。生於草地或灌叢中。
分佈：中國南北各省區。歐洲中部、俄羅斯、
蒙古、朝鮮、日本、和越南北部。
用途：藥用。

黃龍尾 Nepal Agrimonia

†**Agrimonia pilosa** var. **nepalensis** (D. Don)
Nakai (*Agrimonia eupatoria* auct. non
L.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：草本。花果期：5-12月。
產地：薄扶林。生於草地或灌叢中。
分佈：西藏、雲南、四川、貴州、廣西、廣
東、湖南、河南、安徽、浙江、江蘇、
山東、河北、山西、陝西、甘肅。日
本、尼泊爾、錫金、印度、緬甸、泰
國、老撾和越南。
用途：藥用。

蛇莓屬 Duchesnea J. E. Smith

蛇莓 Indian Mock Strawberry

Duchesnea indica (Andr.) Focke

習性：多年生草本。花期：2-8月；果期：
4-10月。
產地：香港島、大埔滘、梧桐寨。生於村莊
近水邊或路邊草地。
分佈：遼寧以南各省區。阿富汗至日本、南
達印度、菲律賓、歐洲和美洲。
用途：藥用。

枇杷屬 Eriobotrya Lindl.

香花枇杷 (山枇杷) Wild Loquat

Eriobotrya fragrans Champ. ex Benth.

習性：小喬木或灌木。花期：10-12月；果
期：5-6月。
產地：香港島、大帽山、馬鞍山、大嶼山。
生於山邊或林中。
分佈：廣西、廣東。

枇杷 Loquat

***Eriobotrya japonica** (Thunb.) Lindl.

習性：小喬木。花期：10-12月；果期：5-6
月。
產地：公園及庭園栽培。

分佈：甘肅以南各省區栽培或逸為野生。日本、印度、緬甸、泰國、越南、印度尼西亞亦有栽培。

用途：水果、藥用、材用。

石楠屬 *Photinia* Lindl.

閩粵石楠 Bentham *Photinia*

Photinia benthamiana Hance

習性：灌木或小喬木。花期：3-5 月；果期：7-12 月。

產地：香港各地。生於石坡、林中或村旁。

分佈：海南、廣東、湖南、福建、浙江、越南。

饒平石楠 Rauping *Photinia*

Photinia raupingensis Kuan (*Photinia prunifolia* auct. non Lindl.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：喬木。花期：3-4 月；果期：7-12 月。

產地：香港各地。生於山邊或林中。

分佈：廣西、廣東。

櫻桃屬 *Prunus* L.

全緣櫻桃（鑲邊櫻） Entire Cherry-laurel

Prunus marginata Dunn [*Laurocerasus marginata* (Dunn) Yü & Lu]

習性：小喬木或灌木。花期：春夏；果期：秋冬。

產地：大嶼山。生於林中。

分佈：廣東。

梅 *Mume*

**Prunus mume* Sieb. & Zucc. (*Armeniaca mume* Sieb.)

習性：小喬木或灌木。花期：1-2 月；果期：3-6 月。

產地：果園、庭園及公園栽培。

分佈：中國各地栽培，亦見野生。日本、朝鮮亦有引種。

用途：食用、藥用、香料、觀賞。

桃 *Peach*

**Prunus persica* (L.) Batsch (*Amygdalus persica* L.)

習性：喬木。花期：3-4 月；果期：4-9 月。

產地：花圃、庭園及公園栽培。

分佈：全國各省區栽培或野生。世界各地均有栽培。

用途：食用、藥用、桃膠作粘合劑。

腺葉桂櫻（腺葉野櫻） Wild Cherry

Prunus phaeosticta (Hance) Maxim. [*Laurocerasus phaeosticta* (Hance) Schneid.]

習性：灌木或小喬木。花期：3-5 月；果期：4-11 月。

產地：香港各地。生於林中、曠野或路邊。

分佈：雲南、貴州、廣西、海南、廣東、湖南、江西、福建、浙江、臺灣。日本、印度、緬甸、孟加拉、泰國、越南。

李 *Japanese Plum*

**Prunus salicina* Lindl.

習性：喬木。花期：4-5 月；果期：7-8 月。

產地：庭園及果園栽培。

分佈：全國各地栽培或野生。世界各地均有種植。

用途：食用。

大葉桂櫻 *Bigleaf Cherry-laurel*

†*Prunus zippeliana* Miq [*Laurocerasus zippeliana* (Miq.) Yü & Lu]

習性：喬木。花期：7-10 月；果期：冬季。

產地：梧桐寨、大帽山。生於林中。

分佈：雲南、四川、貴州、廣西、廣東、福建、臺灣、浙江、江西、湖南、湖北、陝西、甘肅。越南、日本。

臀果木屬 *Pygeum* Gaertn.

臀果木 *Pygeum*

Pygeum topengii Merr.

習性：喬木。花期：6-10 月；果期：冬季。

產地：城門、元墩下、大埔滘、林村谷、梧桐寨。生於林中或路旁。

分佈：雲南、貴州、廣西、海南、廣東、福建。

用途：油料。

火棘屬 *Pyracantha* Roem.

細圓齒火棘（火棘） *Firethorn*

***Pyracantha crenulata** (D. Don) Roem.

習性：灌木或小喬木。花期：3-5 月；果期：9-12 月。

產地：公園和庭園栽培。

分佈：雲南、四川、貴州、廣西、廣東、湖南、湖北、陝西、江蘇。印度、不丹、尼泊爾。

用途：觀賞。

梨屬 Pyrus L.

豆梨 (麻子梨) Callery Pear

Pyrus calleryana Decne.

習性：喬木。花期：2-4 月；果期：6-12 月。

產地：城門、大帽山、石崗、東涌。野生或栽培，生於山坡或林中。

分佈：廣西、廣東、湖南、江西、福建、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、山東。朝鮮、越南。

用途：砧木、觀賞。

沙梨 (梨) Sand Pear

***Pyrus pyrifolia** (Burm. f.) Nakai [*Pyrus pyrifolia* var. *culta* (Makino) Nakai; *Pyrus sinensis* auct. non Lindl.: Check List HK Pl. 1993.]

習性：喬木。花期：4 月；果期：6-8 月。

產地：果園和庭園栽培。

分佈：中國各地；野生或栽培。朝鮮、日本亦有種植。

用途：水果。

石斑木屬 Raphiolepis Lindl.

石斑木 (車輪梅、春花) Hongkong Hawthorn

Raphiolepis indica (L.) Lindl.

習性：灌木或小喬木。花期：2-4 月；果期：5-12 月。

產地：香港各地。生於山坡、路邊、曠野或灌叢及林中。

分佈：雲南、貴州、廣西、海南、廣東、湖南、江西、福建、臺灣、浙江、安徽。日本、泰國、老撾、越南、柬埔寨、印度尼西亞。

用途：材用、果可食。

柳葉石斑木 Willowleaf Raphiolepis

†**Raphiolepis salicifolia** Lindl.

習性：灌木或小喬木。花期：2-4 月；果期：10-12 月。

產地：扯旗山、海下、青衣島。生於林緣或林中、灌叢。

分佈：廣西、廣東、福建。越南。

薔薇屬 Rosa L.

月季花 China Rose

***Rosa chinensis** Jacq.

習性：灌木。花期：4-9 月；果期：6-11 月。

產地：栽培。

分佈：原產中國。各地普遍栽培。

用途：觀賞、藥用。

小果薔薇 Smallfruit Rose

***Rosa cymosa** Tratt.

習性：攀援灌木。花期：5-6 月；果期：7-11 月。

產地：公園栽培。

分佈：雲南、四川、貴州、廣西、廣東、湖南、江西、福建、安徽、湖北、河北。日本。

軟條七薔薇 (亨氏薔薇) Henry Rose

Rosa henryi Bouleng

習性：灌木。花期：4 月。

產地：大埔。生於山坡、灌叢。

分佈：雲南、四川、貴州、廣西、廣東、湖南、福建、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西。

廣東薔薇 Kwangtung Rose

†**Rosa kwangtungensis** Yü & Tsai (*Rosa multiflora* auct. non Thunb.: Check List HK Pl. 1993, p. p.)

習性：攀援小灌木。花期：3-5 月；果期：6-7 月。

產地：青山。生於灌叢。

分佈：廣西、廣東、福建。

重瓣廣東薔薇 Doubleflower Kwangtung Rose

Rosa kwangtungensis var. *plena* Yü & Ku

[*Rosa multiflora* auct. non Thunb.
Check List HK Pl. 1993, p. p.]
習性：攀援小灌木。花期：4-5 月。
產地：大潭篤。生於山坡灌叢中。
分佈：廣西、廣東、福建。

金櫻子 Cherokee Rose

***Rosa laevigata* Michx.**

習性：攀援灌木。花期：2-6 月；果期：6-11 月。
產地：香港島、沙田、大埔、大帽山、大嶼山。生於山野、溝邊、灌叢。
分佈：雲南、四川、貴州、廣西、廣東、湖南、江西、福建、臺灣、浙江、江蘇、安徽、湖北、陝西。日本。
用途：藥用、根皮制栲膠、果可釀酒。

野薔薇（七姐妹） Multiflora Rose

****Rosa multiflora* Thunb.**

習性：攀援灌木。花期：2-4 月。
產地：公園和庭園栽培。
分佈：廣東、江蘇、浙江、河南、山東等省。朝鮮、日本。
用途：觀賞。

玫瑰 Rugose Rose

****Rosa rugosa* Thunb.**

習性：灌木。花期：4-6 月；果期：8-9 月。
產地：公園和庭園栽培。
分佈：中國各地栽培，華北有野生。朝鮮、日本。
用途：觀賞、香料、藥用。

光葉薔薇 Wichura Rose

***Rosa wichuraiana* Crép.**

習性：攀援灌木。花期：3-7 月；果期：6-11 月。
產地：城門、西貢、榕樹澳、大埔、粉嶺、沙頭角。生於山坡、灌叢或林中。
分佈：廣西、廣東、福建、浙江、臺灣。朝鮮、日本、菲律賓。

懸鈎子屬 *Rubus* L.

粗葉懸鈎子 Giant Bramble

†***Rubus alceifolius* Poir. (*Rubus moluccanus***

auct. non L.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：攀援灌木。花期：7-9 月；果期：10-12 月。

產地：大帽山、川龍、城門、元墩下、西貢。生於林中或灌叢。

分佈：雲南、四川、貴州、廣西、海南、廣東、湖南、江西、福建、江蘇、臺灣。朝鮮、日本、緬甸、泰國、老撾、越南、柬埔寨、印度尼西亞、菲律賓。
用途：藥用。

白花懸鈎子 Whiteflower Raspberry

***Rubus leucanthus* Hance**

習性：攀援灌木。花期：4-6 月；果期：6-7 月。
產地：香港各地。生於山坡、溝邊、灌叢。
分佈：雲南、貴州、廣西、海南、廣東、湖南、福建。泰國、老撾、越南、柬埔寨。
用途：食用、藥用。

茅莓（草楊莓子） Japanese Raspberry

***Rubus parvifolius* L.**

習性：灌木。花期：3-6 月；果期：6-8 月。
產地：香港島、大埔、大帽山、西貢、大嶼山。生於山坡、曠野。
分佈：除新疆、青海、西藏、內蒙古外，全國均有。朝鮮、日本。
用途：食用、藥用。

梨葉懸鈎子 Pearleaf Raspberry

†***Rubus pirifolius* Smith (*Rubus hexagynus* auct. non Roxb: Check List HK Pl. 1993.)**

習性：攀援灌木。花果期：4-11 月。
產地：西貢、大埔。生於灌叢。
分佈：雲南、四川、貴州、廣西、海南、廣東、福建、臺灣。泰國、老撾、柬埔寨、印度尼西亞、菲律賓。
用途：藥用。

鏽毛莓（蛇泡筋） Rustyhair Raspberry

***Rubus reflexus* Ker**

習性：攀援灌木。花期：4-7 月；果期：8-9

月。
產地：香港各地。生於山坡、溝邊、灌叢。
分佈：雲南、廣西、海南、廣東、湖南、江西、福建、浙江、臺灣。印度、馬來西亞、菲律賓。
用途：食用、藥用。

空心泡 (薔薇莓) Mauritius Raspberry

Rubus rosaefolius Smith

習性：直立或攀援灌木。花期：2-5 月；果期：6-7 月。

產地：林村、扯旗山。生於林中。
分佈：廣東、廣西、貴州、雲南、四川、湖南、江西、福建、臺灣、安徽、湖北。日本、朝鮮、非洲、馬達加斯加、印度、緬甸、泰國、老撾、越南、柬埔寨、印度尼西亞、大洋洲。

用途：藥用。

光葉懸鈎子 Tsang Raspberry

†**Rubus tsangii** Merr.

習性：攀援灌木。花期：4-5 月；果期：6-7 月。

產地：大嶼山。生於林中。
分佈：雲南、四川、貴州、廣西、廣東、福建、浙江。

東南懸鈎子 Tsangor Raspberry

†**Rubus tsangorum** Hand.-Mazz.

習性：藤本。花期：4-7 月；果期：8-9 月。

產地：大埔。生於灌叢。
分佈：廣東、廣西、湖南、江西、福建、浙江、安徽。

繡線菊屬 *Spiraea* L.

麻葉繡線菊 (麻葉繡球) Reeves *Spiraea*

****Spiraea cantoniensis*** Lour.

習性：灌木。花期：3-5 月；果期：7-9 月。

產地：庭園及公園栽培。
分佈：廣西、廣東、湖南、江西、福建、浙江。日本。

用途：觀賞。

中華繡線菊 Chinese *Spiraea*

Spiraea chinensis Maxim.

習性：灌木。花期：3-6 月；果期：6-10 月。

產地：馬鞍山、鳳凰山。生於山坡灌叢。
分佈：雲南、四川、貴州、廣西、廣東、湖南、江西、江蘇、安徽、湖北、河南、河北、陝西、內蒙古。

李葉繡線菊 Bridalwreath *Spiraea*

****Spiraea prunifolia*** Sieb. & Zucc.

習性：灌木。花期：3-5 月。

產地：庭園及公園栽培。
分佈：四川、貴州、湖南、江西、江蘇、安徽、山東、湖北、陝西。朝鮮、日本。
用途：觀賞。

珍珠繡線菊 Thunberg *Spiraea*

****Spiraea thunbergii*** Sieb. ex Blume

習性：灌木。花期：2-5 月；果期：7 月。

產地：公園及庭園栽培。

分佈：華東。日本。

用途：觀賞。

183. 含羞草科 Mimosaceae

金合歡屬 *Acacia* P. Mill.

耳葉相思 Earleaf acacia

****Acacia auriculiformis*** A.Cunn. ex Benth.

習性：喬木。

產地：引種栽培種植。

分佈：廣東有引種。原產澳大利亞及新西蘭。

藤金合歡 (小合歡) *Acacia* vine

Acacia concinna (Willd.) DC. [*Acacia sinuata* (Lour.) Merr.]

習性：木質藤本。花期：4-6 月；果期：7-12 月。

產地：深水灣、黃竹坑、石澳、大帽山。生於疏林或灌叢中。

分佈：海南、廣西、廣東、雲南、貴州、江西、湖南。亞洲熱帶地區廣佈。

臺灣相思 Taiwan acacia

****Acacia confusa*** Merr.

習性：喬木。花期 3-10 月；果期：8-12 月。

產地：香港各地廣泛栽種。

分佈：海南、廣西、廣東、福建、浙江、臺灣、江西、雲南、四川。菲律賓、印度尼西亞。

用途：綠化荒山、芳香油、單寧、材用。

銀荊 Silver wattle

†**Acacia dealbata* Link.

習性：灌木或小喬木。花期：1月。

產地：大埔、元洲仔。引種栽培。

分佈：雲南、廣西、福建有引種。原產澳大利亞。

金合歡 Sweet acacia

**Acacia farnesiana* (L.) Willd.

習性：灌木或小喬木。花期：9-11月。

產地：香港島、元朗、長洲。引種栽培。

分佈：四川、雲南、廣西、廣東、福建、浙江、臺灣有引種。原產熱帶美洲。

用途：綠籬、樹膠、單寧、染料、材用、藥用、香精。

大葉相思 (馬占相思)

**Acacia mangium* Willd.

習性：喬木。花期：10月。

產地：香港各地有栽培。

分佈：廣東有栽培。原產澳大利亞。

羽葉金合歡 (笏仔梅) Snack acacia

Acacia pennata (L.) Willd.

習性：多刺藤本。花期：3-10月；果期：7月至翌年4月。

產地：沙頭角。林區攀附於它樹上。

分佈：海南、廣東、福建、雲南。亞洲和非洲熱帶地區廣佈。

珍珠合歡 Pearl acacia

**Acacia podalyriaefolia* A. Cunn. ex G. Don

習性：喬木。花期：3月；果期：3-6月。

產地：嘉道理農場有栽培。

分佈：原產新西蘭。

海紅豆屬 *Adenanthera* L.

海紅豆 Red sandalwood

Adenanthera microsperma Teijsm. &

Binnend. (*Adenanthera pavonina* auct. non L. : Check List HK Pl. 1993.)

習性：喬木。花期：4-7月；果期：7-10月。

產地：柴灣、跑馬地、汀角、林村、坑下莆、馬鞍山。

分佈：海南、廣西、廣東、福建、臺灣、雲南、貴州。緬甸、柬埔寨、老撾、越南、馬來西亞、印度尼西亞。

用途：綠化、材用。

合歡屬 *Albizia* Durazz.

楹樹 Chinese albizia

Albizia chinensis (Osbeck) Merr. [*Albizia stipulata* (DC.) Boiv.]

習性：喬木。花期：3-5月，果期：6-12月。

產地：香港島、大帽山。生於林中或曠野。

分佈：海南、廣西、廣東、福建、湖南、雲南、西藏。南亞至東南亞。

用途：材用。

天香藤 Corniculate albizia

Albizia corniculata (Lour.) Druce [*Albizia millettii* Benth.]

習性：攀援灌木。花、果期4-11月。

產地：香港各地。生於曠野或疏林中，攀附於他樹上。

分佈：海南、廣西、廣東、福建。越南、老撾、柬埔寨、泰國、菲律賓、加里曼丹。

合歡 Silk-tree

**Albizia julibrissin* Durazz.

習性：喬木。花期：5-7月。

產地：栽培。

分佈：西南、華南至東北各省區。中亞至東亞。

用途：綠化樹種。

大葉合歡 Lebeck tree

**Albizia lebeck* (L.) Benth.

習性：喬木。花期：5-9月；果期：10月至翌年5月。

產地：香港各地。栽培。

分佈：廣西、廣東、福建、臺灣。原產熱帶非洲。

用途：行道樹、觀賞樹、材用、飼料(葉)。

黃豆樹 White siris

†***Albizia procera** (Roxb.) Benth.

習性：喬木。花期：5-9 月；果期：9 月至翌年 2 月。

產地：藍塘道、深水灣、元朗。栽培。

分佈：廣西、廣東、臺灣、雲南。南亞至東南亞。

用途：材用。

雨樹 Rain tree

***Albizia saman** (Jacq.) F. Muell. [*Samanea saman* (Jacq.) Merr.]

習性：喬木。花期：8-9 月。

產地：香港島壽臣山。栽培。

分佈：海南、臺灣、雲南有引種。原產熱帶美洲。

用途：綠化樹種、材用、飼料（葉）。

猴耳環屬 *Archidendron* F. Muell.

猴耳環 Monkeypod

Archidendron clypearia (Jack.) Nielsen [*Pithecellobium clypearia* (Jack.) Benth.: *Abarema clypearia* (Jack.) Kosterm.]

習性：喬木。花期：2-6 月；果期：4-8 月。

產地：香港各地。生於林中。

分佈：海南、廣西、廣東、福建、浙江、臺灣、雲南。熱帶亞洲廣佈。

用途：單寧。

亮葉猴耳環 Chinese apea earring

Archidendron lucidum (Benth.) Nielsen [*Pithecellobium lucidum* Benth. ; *Abarema lucidum* (Benth.) Kosterm.]

習性：喬木。

產地：香港各地。生於疏林中。

分佈：海南、廣西、廣東、福建、浙江、臺灣、雲南、四川。泰國、越南、老撾、柬埔寨。

薄葉猴耳環

†**Archidendron utile** (Chun & How) Nielsen [*Pithecellobium utile* Chun & How; *Abarema utile* (Chun & How)

Kosterm.]

習性：灌木。花期：3-8 月；果期：4-12 月。

產地：八仙嶺、烏蛟騰。生於林中。

分佈：海南、廣西、廣東、福建。越南。

朱纓花屬 *Calliandra* Benth.

朱纓花 (紅絨球) Pink powder puff

***Calliandra haematocephala** Hassk.

習性：灌木。花期：8-9 月；果期：10-11 月。

產地：公園栽培。

分佈：廣東、福建、臺灣有引種。原產南美洲。

用途：觀賞。

小朱纓花 Surinam calliandra

***Calliandra riparia** Pittier (*Calliandra surinamensis* auct. non Benth.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：灌木。花期：1 月。

產地：公園栽培。

分佈：廣東有引種。原產南美洲。

合歡草屬 *Desmanthus* Willd.

合歡草 Slender mimosa

***Desmanthus virgatus** (L.) Willd.

習性：草本。花期：1-3 月；果期：5-11 月。

產地：黃泥涌。生於路邊荒地。

分佈：廣東、雲南有引種。原產熱帶美洲。

用途：飼料(葉)。

榼藤屬 *Entada* Adans.

榼藤 (過江龍) Giant bean

Entada phaseoloides (L.) Merr.

習性：藤本。果期：4 月。

產地：大埔滘、茅坪、海下。生於混交林中，攀援於他樹上。

分佈：海南、廣西、廣東、福建、臺灣、雲南、西藏。

用途：藥用。有毒！

南洋楹屬 *Falcataria* (I. C. Nielsen) Barreby & J. W. Grimes

南洋楹

†***Falcataria moluccana** (Miq.) Barneby & J. W. Grimes [*Albizia falcataria* (L.) Forsb.]

習性：常綠喬木。花期：4-7 月。
產地：引種栽培。
分佈：福建、廣東、廣西有栽培。原產馬六甲及印度尼西亞魯古群島。
用途：綠化樹種。

銀合歡屬 *Leucaena* Benth.

銀合歡 *White popinac*

**Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit
(*Leucaena glauca* Benth.)

習性：灌木。花期：4-7 月；果期：8-10 月。
產地：香港各地。栽培，逸為野生，生於林邊荒地。
分佈：海南、廣西、廣東、福建、臺灣、雲南有引種。原產熱帶美洲。
用途：綠肥、飼料。

含羞草屬 *Mimosa* L.

光莢含羞草

†**Mimosa bimucronata* (DC.) Kuntze
(*Mimosa sepiaria* Benth.)

習性：灌木。花期：3-9 月；果期：10-11 月。
產地：栽培逸為野生。
分佈：廣東有引種。原產熱帶美洲。

巴西含羞草

†**Mimosa diplotricha* C. Wright ex Sauvalle
習性：草本。
產地：元朗、汀角。生於荒地、濕田。
分佈：原產熱帶美洲。現廣佈亞洲，為嚴重害草。

無刺含羞草

†**Mimosa diplotricha* var. *inermis* (Adelb.)
Veldk.
習性：草本。
產地：沙田、元朗、沙頭角、上禾坑。生於荒地。
分佈：海南、廣東、雲南有引種。原產爪哇。
用途：覆蓋植物。有毒。

†**Mimosa pigra* L.

習性：草本。
產地：西貢井頭。生於荒地。
分佈：原產熱帶南美洲。現廣佈澳大利亞北

部及熱帶亞洲。

含羞草 *Sensitive plant*

**Mimosa pudica* L.

習性：灌木。花期：3-10 月；果期：5-11 月。
產地：香港島各地。生於路邊雜草地。
分佈：海南、廣西、廣東、福建、臺灣、雲南。原產熱帶美洲。
用途：觀賞、藥用，

牛蹄豆屬 *Pithecellobium* Mart.

牛蹄豆 *Manila tamarind*

**Pithecellobium dulce* (Roxb.) Benth.

習性：喬木。花期：3 月；果期：7 月。
產地：栽培。
分佈：海南、廣西、廣東、臺灣、雲南有引種。原產中美洲。
用途：材用、飼料（果）。

184. 蘇木科

Caesalpiaceae

羊蹄甲屬 *Bauhinia* L.

矮白花羊蹄甲 *Dwarf white Bauhinia*

**Bauhinia acuminata* L.

習性：小喬木。花期：4-6 月或全年；果期：6-8 月。
產地：栽培。
分佈：海南、廣東、廣西、雲南。印度、斯里蘭卡、菲律賓、越南、馬來西亞。
用途：觀賞。

洋紫荊 *Hong Kong Orchid Tree*

Bauhinia blakeana Dunn

習性：喬木。花期：全年，以 3-4 月最盛。
產地：香港各地。常見栽培於公園及行道旁。
分佈：海南、廣東。世界各地有栽培。
用途：觀賞。香港市花。

缺葉藤（龍鬚藤） *Champion's Bauhinia*

Bauhinia championii Benth.

習性：藤本。花期：6-10 月；果期：7-12 月。
產地：香港各地。生於疏林中。

分佈：貴州、湖北、湖南、江西、廣西、廣東、福建、浙江、臺灣。印度、越南、印度尼西亞。

首冠藤 (深裂葉羊蹄甲) Camel's foot

Bauhinia corymbosa Roxb.

習性：藤本。花期：4-6 月；果期：9-12 月。

產地：鹽田仔。生於林中。

分佈：海南、廣東。世界各熱帶、亞熱帶地區有栽培。

用途：觀賞。

嘉氏羊蹄甲 Galpin's Bauhinia

***Bauhinia galpinii** N. E. Br.

習性：攀援灌木。花期：5-8 月。

產地：栽培。

分佈：原產非洲。

粉葉羊蹄甲 (羊蹄甲藤) Climbing Bauhinia

Bauhinia glauca (Wall. ex Benth.) Benth.

習性：藤本。花期：4-6 月；果期：7-9 月。

產地：香港各地。生於山坡林緣和灌叢中。

分佈：雲南、貴州、廣西、廣東、湖南、江西。印度、中南半島、印度尼西亞。

紅花羊蹄甲 Purple camel's foot

***Bauhinia purpurea** L.

習性：喬木。花期：7-11 月。

產地：栽培。

分佈：中國南部。中南半島、印度、斯里蘭卡。

用途：觀賞。

黃花羊蹄甲 Thomas tree

***Bauhinia tomentosa** L.

習性：灌木。花期：7-11 月。

產地：栽培。

分佈：廣東有栽培。原產印度。

用途：觀賞。

宮粉羊蹄甲 Camel's foot tree

***Bauhinia variegata** L.

習性：喬木。花期：全年，3 月最盛。

產地：香港各地。栽培。

分佈：中國南部。中南半島、印度。

用途：觀賞、蜜源植物、木材。

白花洋紫荊 White Bauhinia

***Bauhinia variegata** var. **candida**

Buch.-Ham.

習性：喬木。花期：全年，3 月最盛。

產地：栽培。

分佈：中國南部。雲南有野生。

用途：觀賞。

雲實屬 **Caesalpinia** L.

刺果蘇木 Gray nicker

†***Caesalpinia bonduc** (L.) Roxb.

(*Caesalpinia crista* auct. non L.:
Check List HK Pl. 1993.)

習性：藤本。花期：8-10 月；果期：10 月至翌年 3 月。

產地：沙田、西貢、南丫島、大嶼山。

分佈：廣東、廣西。世界各熱帶地區。

華南雲實 (假老虎筋) Wood Gossip
Caesalpinia

Caesalpinia crista L. (*Caesalpinia nuga* Ait.)

習性：藤本。花期：4-7 月；果期：7-12 月。

產地：香港各地。生於林中。

分佈：中國西南部。南亞至東南亞。

雲實 Mysore thorn

Caesalpinia decapetala (Roth.) Alston

(*Caesalpinia sepiaria* Roxb.)

習性：藤本。花果期：4-10 月。

產地：青山。

分佈：黃河以南各省區。亞熱帶及溫帶地區廣佈。

用途：藥用。

喙莢雲實 (南蛇筋) Snake **Caesalpinia**

Caesalpinia minax Hance

習性：藤本。花期：4-5 月；果期：7 月。

產地：西貢、大埔、大嶼山。生於山溝灌叢中。

分佈：四川、雲南、貴州、廣西、海南、廣東。

用途：藥用 (種子)。

洋金鳳 (金鳳花) Parado spride

**Caesalpinia pulcherrima* (L.) Sw.

習性：藤本。花期。全年。

產地：栽培。

分佈：雲南、廣西、海南、廣東、臺灣有栽培。原產西印度群島，現熱帶各地有栽培。

用途：觀賞。

春雲實 Spring *Caesalpinia*

Caesalpinia vernalis Champ.

習性：藤本。花期：4月；果期：12月。

產地：香港各地。生於林中和溪邊。

分佈：廣東、福建、浙江。

決明屬 *Cassia* L.

翅莢決明 Winged Cassoa

**Cassia alata* L. [*Senna alata* (L.) Roxb.]

習性：灌木。花期：11月至翌年1月；果期：1-2月。

產地：蓮塘尾、大龍。生於疏林。

分佈：雲南、廣東。原產美洲熱帶地區。現廣佈於全世界熱帶地區。

雙莢決明 Double-fruited *Cassia*

**Cassia bicapsularis* L. [*Senna bicapsularis* (L.) Roxb.]

習性：灌木。花期：10-11月；果期：1月至翌年3月。

產地：栽培。

分佈：廣西、廣東。原產美洲熱帶地區，現全世界熱帶地區廣佈。

用途：觀賞、綠籬、綠肥。

臘腸樹 (豬腸豆) Golden-shower

**Cassia fistula* L.

習性：喬木。花期：6-8月；果期：10月。

產地：栽培。

分佈：中國南部及西南部有栽培。原產印度、緬甸和斯里蘭卡。

用途：觀賞、木材、藥用。

光葉決明 (多花槐) Flowery *Cassia*

**Cassia* × *floribunda* Cav. [*Senna* ×

floribunda (Cav.) H. Irwin & Barneby]

習性：灌木。花期：5-7月；果期：10-11月。
產地：栽培。

分佈：廣西、廣東。原產熱帶美洲，現廣佈於世界熱帶地區。

用途：觀賞、綠肥。

毛莢決明 Hairy-fruited *Cassia*

**Cassia hirsuta* L.

習性：灌木。花期：10-11月；果期：12月至翌年1月。

產地：薄扶林、香港仔、西貢、大埔滘。

分佈：雲南、海南、廣東有栽培。原產熱帶美洲，現全世界熱帶地區有引種。

爪哇決明 Apple-blossom

**Cassia javanica* L.

習性：灌木。花期：5-7月；果期：8-10月。

產地：栽培。

分佈：華南。熱帶亞洲廣泛栽培。

節果決明 Pink & white shower

**Cassia javanica* var. *indochinensis* Gagnep.

(*Cassia nodosa* Buch-Ham. ex Roxb.)

習性：喬木。花期：5-6月。

產地：栽培。

分佈：廣東。熱帶亞洲廣泛栽培。

短葉決明 Wild sensitive-plant

Cassia leschenaultiana DC.

習性：亞灌木狀草本。花期：6-8月；果期：9-11月。

產地：蒲台島。生於曠野。

分佈：中國西南部至東南部。印度、緬甸、越南。

含羞草決明 (山扁豆) Mimosa-leaf *Cassia*

Cassia mimosoides L. [*Chamaecrista mimosoides* (L.) E. Greene]

習性：亞灌木狀草本。花果期：8-10月。

產地：香港各地。

分佈：中國西南部至東南部。全世界熱帶、亞熱帶地區。

用途：綠肥、藥用。

密葉決明 Leafy Cassia

**Cassia multijuga* Rich.

習性：灌木或小喬木。花期：9-11 月；果期：12 月至翌年 2 月。

產地：栽培。

分佈：廣東有栽培。原產熱帶美洲，現廣植於世界各熱帶地區。

望江南 (野扁豆) Coffee Senna

Cassia occidentalis L. [*Senna occidentalis* (L.) Link]

習性：亞灌木。花期：4-8 月；果期：6-10 月。

產地：香港島、林村谷、大環、西貢咸田、大嶼山。生於曠野。

分佈：中國西南部至東南部。全廣佈於世界熱帶、亞熱帶地區。

用途：藥用。

多葉決明

**Cassia polyphylla* Jacq.

習性：灌木或喬木。

產地：栽培。

分佈：印度。

鐵刀木 Kassod tree

**Cassia siamea* Lam. [*Senna siamea* (Lam.) Irwin & Barneby]

習性：喬木。花期：10-11 月；果期：12 月至翌年 1 月。

產地：常見栽培於公園及行道旁。

分佈：雲南（野生）及中國南部（栽培）。

用途：材用。行道樹。

槐葉決明 (江南槐) Southern Cassia

Cassia sophera L. [*Senna sophera* (L.) Roxb.]

習性：亞灌木。花期：7-9 月；果期：10-12 月。

產地：大埔、鴨脷洲、大嶼山。生於路旁。

分佈：中國中部以南各地均有。廣佈於全世界熱帶、亞熱帶地區。

用途：藥用（種子）、食用（嫩葉、嫩莢）。

美麗決明 (美洲槐) Cassia

**Cassia spectabilis* DC. [*Senna spectabilis* (DC.) Irwin & Barneby]

習性：小喬木。花期：3-4 月；果期：7-9 月。

產地：香港島。栽培。

分佈：雲南、廣東有栽培。原產熱帶美洲。

黃槐決明 (黃槐) Sunshine tree

**Cassia surattensis* Burm. f. [*Senna surattensis* (Burm. f.) Irwin & Barneby]

習性：灌木或小喬木。花果期：幾全年。

產地：香港各地均有栽培。

分佈：廣西、廣東、福建、臺灣有栽培。原產熱帶亞洲，現世界各地有栽培。

用途：綠籬、觀賞。

決明 Sickle Senna

**Cassia tora* L. [*Senna tora* (L.) Roxb.]

習性：亞灌木狀草本。花果期：8-11 月。

產地：香港各地。

分佈：原產熱帶美洲、現世界各熱帶地區廣佈。

用途：藥用（種子）、染料。

鳳凰木屬 *Delonix* Raf.

鳳凰木 Flame tree

**Delonix regia* (Bojer ex Hook.) Raf.

習性：喬木。花期：6-7 月；果期：8-10 月。

產地：香港各地。栽培。

分佈：雲南、廣西、海南、廣東、福建、臺灣。原產馬達加斯加，現世界各熱帶地區常見栽培。

用途：觀賞。種子有毒！

皂莢屬 *Gleditsia* L.

小果皂莢 Small fruit honeylocust

Gleditsia australis Hemsl. (*Gleditsia macracantha* auct. non Desf.: Check List HK Pl. 1993, p. p.)

習性：喬木。花期：6-10 月；果期：11 月至翌年 4 月。

產地：大坑、黃泥涌、聶高信山、大圍。

分佈：廣西、廣東。越南。

華南皂莢 South China Honeylocust

Gleditsia fera (Lour.) Merr. (*Gleditsia macracantha* auct. non Desf.: Check List HK Pl. 1993, p. p.)

習性：喬木。花期：4-5 月；果期：6-12 月。

產地：大埔、大嶼山。野生或栽培。

分佈：廣西、廣東、江西、湖南、福建、臺灣。越南。

用途：果可作肥皂，殺蟲。

美國皂莢 Honeylocust

†***Gleditsia triacanthos** L.

習性：喬木。花期：4-6 月；果期：10-12 月。

產地：維多利亞公園。栽培。

分佈：上海有栽培。原產美洲。

用途：觀賞、木材。

儀花屬 *Lysidice* Hance

儀花 *Lysidice*

Lysidice rhodostegia Hance

習性：灌木或喬木。花期：6-8 月；果期：9-11 月。

產地：栽種於公園或行道旁。

分佈：雲南、廣西、廣東。越南。

用途：觀賞、藥用、作行道樹。

扁軸木屬 *Parkinsonia* L.

扁軸木 Horsebean

†***Parkinsonia aculeata** L.

習性：喬木。花期：4-5 月。

產地：維多利亞公園。栽培。

分佈：海南有栽培。原產熱帶美洲。

用途：藥用（樹皮、葉）。

盾柱木屬 *Peltophorum* (Vogel.) Benth.

盾柱木 Yellow Poinciana

***Peltophorum pterocarpum** (DC.) Backer ex K. Heyne

習性：喬木。果期：11 月。

產地：香港各地均有栽培。

分佈：廣州有栽培。越南、斯里蘭卡、馬來

西亞、印度尼西亞、大洋洲北部。

無憂花屬 *Saraca* L.

無憂花 Asoka

***Saraca indica** L.

習性：喬木。

產地：庭園或公園栽培。

分佈：臺灣有引種。老撾、泰國、馬來西亞、印度尼西亞。

用途：觀賞。

酸豆屬 *Tamarindus* L.

酸豆 Tamarind

***Tamarindus indica** L.

習性：喬木。花期：5-8 月；果期：12 月至翌年 5 月。

產地：香港仔、深水灣、大圍、坪洲。栽培。

分佈：雲南、廣西、海南、廣東、福建、臺灣。原產非洲，現各熱帶地區均有栽培。

用途：食用。

185. 蝶形花科 Fabaceae (Papilionaceae)

相思子屬 *Abrus* Adans.

廣州相思子（廣東相思子） Prayer-beads

Abrus cantoniensis Hance

習性：攀援灌木。花期：8-9 月；果期：10-12 月。

產地：八仙嶺、紅花嶺、布心排、大嶼山。生於疏林、灌叢或山坡。

分佈：廣西、廣東、湖南、泰國。

用途：藥用。

毛相思子 Hairy rosary pea

Abrus mollis Hance

習性：藤本。花期：7-8 月；果期：9-12 月。

產地：大埔滘、元墩下、烏蛟騰、麻雀嶺。生於疏林或灌叢中。

分佈：廣西、海南、廣東、福建。中南半島。

用途：藥用，但種子有毒。

相思子 Rosary Pea

Abrus precatorius L.

習性：藤本。花期：9 月；果期：10-12 月。

產地：大埔、上禾坑、布心排、浪茄、西貢、西貢性西一年生草本。花期：6月；果期：10月。生於疏林中。

分佈：雲南、廣西、廣東、臺灣。熱帶地區廣佈。

用途：藥用。種子可作裝飾品，但有劇毒！

合萌屬 *Aeschynomene* L.

美洲合萌 *Joint-vetch*

†**Aeschynomene americana* L.

習性：草本。果期：10-12月。

產地：紅磡公園、葵涌公園、泰亨、南華莆。

分佈：臺灣有引種。原產美洲。

用途：綠肥。

合萌（田皂角） *Sensitive joint vetch*

Aeschynomene indica L.

習性：一年生草本或灌木狀。果期：10-12月。

產地：香港各地。

分佈：幾全國各地。亞洲、非洲、大洋洲。

用途：綠肥、藥用（種子有毒）。

鏈莢豆屬 *Alysicarpus* Neck. ex Desv.

柴胡葉鏈莢豆 *Thorowax leaf Alysicarpus*

Alysicarpus bupleurifolius (L.) DC.

習性：多年生草本。花果期：9-11月。

產地：大坑、葵涌。生於荒地草叢中。

分佈：雲南、廣西、海南、廣東、福建、臺灣。亞洲東南部、波里尼西亞、毛里裘斯。

鏈莢豆 *Alyceclover*

Alysicarpus vaginalis (L.) DC. [*Alysicarpus vaginalis* var. *diversifolius* Chun]

習性：多年生草本。花果期：5-11月。

產地：香港各地。生於曠地、路旁、海邊沙地。

分佈：海南、雲南、廣西、廣東、臺灣。東半球熱帶地區。

用途：綠肥。

落花生屬 *Arachis* L.

落花生 *Groundnut*

**Arachis hypogaea* L.

產地：栽培。

分佈：原產南美洲，今世界各地廣泛栽培。

用途：油料作物。

黃芪屬 *Astragalus* L.

紫雲英 *Chinese clover*

**Astragalus sinicus* L.

習性：二年生草本。花期：2-6月。

產地：香港有記錄。

分佈：長江流域各省區。

用途：綠肥。

藤槐屬 *Bowringia* Champ. ex Benth.

藤槐 *Common Bowringia*

Bowringia callicarpa Champ. ex Benth.

習性：攀援灌木。花期：5-6月；果期：12月至翌年1月，

產地：香港島、梧桐寨、馬鞍山、大嶼山。生於林緣或河溪旁、攀援於它樹上。

分佈：廣西、海南、廣東、福建。越南。

木豆屬 *Cajanus* DC.

木豆 *Pigeon pea*

**Cajanus cajan* (L.) Millsp.

習性：灌木。花果期：全年。

產地：灣仔峽、大坑、掃桿埔、城門、大埔滘、大埔、青山、。

分佈：中國西南部至東南部有栽培。原產印度，現世界各熱帶、亞熱帶地區廣泛栽培。

用途：糧食、綠肥、飼料。

蔓草蠱豆 *Scarablike Cajanus*

Cajanus scarabaeoides (L.) Thou. [*Atylosia scarabaeoides* (L.) Benth.]

習性：藤本。花期：1月。

產地：香港島、荃灣、大欖涌、屯門、白泥、沙埔、昂船洲、鴨脷洲。生於曠野、山坡草叢。

分佈：雲南、四川、貴州、廣西、海南、廣東、福建、臺灣。亞洲、大洋洲、非洲。

用途：藥用（葉）。

刀豆屬 *Canavalia* DC.

刀豆 *Sword bean*

**Canavalia gladiata* (Jacq.) DC.

習性：纏繞草本。花期：7-9 月；果期：10 月。

產地：栽培。

分佈：我國長江各省區間有栽培。亞洲及非洲廣佈。

用途：綠肥、飼料、覆蓋作物。

狹刀豆 *Narrow sword bean*

Canavalia lineata (Thunb.) DC.

習性：纏繞草本。花果期：6-10 月。

產地：沙田、西貢、企嶺下、大嶼山等。生於海灘。

分佈：廣西、廣東、福建、浙江、臺灣。日本、朝鮮、菲律賓、越南至印度尼西亞。

海刀豆 *Sea sword bean*

Canavalia maritima (Aubl.) Thou.

習性：藤本。花期：6-7 月；果期：11 月。

產地：香港島、馬屎洲、馬灣、大嶼山。蔓生於海邊沙灘上。

分佈：我國東南部至南部。熱帶海岸地區廣佈。

距瓣豆屬 *Centrosema* (DC.) Benth.

距瓣豆

†**Centrosema pubescens* Benth.

習性：藤本。

產地：青山有栽培。

分佈：海南、廣東、臺灣有栽培。原產熱帶美洲。

蝙蝠草屬 *Christia* Moench.

鋪地蝙蝠草（羅藟草） *Obcordate Christia*

Christia obcordata (Poir.) Bakh. f.

習性：多年生草本。花期：4-5 月；果期：5-9 月。

產地：香港島、大鵬灣平洲。生於曠野草地、叢林中。

分佈：廣西、海南、廣東、福建、臺灣。南

亞、東南亞至澳大利亞北部。

蝙蝠草 *Common Christia*

**Christia vespertilionis* (L. f.) Bakh. f.

習性：多年生草本。花期：3-5 月；果期：10-12 月。

產地：栽培。

分佈：廣西、海南、廣東。全世界熱帶地區廣佈。

用途：藥用。

蝶豆屬 *Clitoria* L.

廣東蝶豆（韓氏蝶豆） *Hance's Butterfly Pea*

Clitoria hanceana Hemsl.

習性：灌木。花期：6 月；果期：10 月。

產地：九龍。生於荒地、路旁灌叢中。

分佈：廣西、廣東。越南、柬埔寨、泰國。

用途：藥用。

蝶豆 *Butterfly Pea*

**Clitoria ternatea* L.

習性：藤本。花果期：6-11 月。

產地：栽培。

分佈：雲南、廣西、海南、廣東、福建、浙江、臺灣有栽培。原產印度。

用途：綠肥、觀賞。種子有毒！

豬屎豆屬 *Crotalaria* L.

響鈴豆 *Rattlebox*

Crotalaria albida Heyne ex Roth

習性：多年生草本。花果期：5-12 月。

產地：香港島、葵涌、荃灣、城門、大帽山、大嶼山。生於荒地、山坡疏林下。

分佈：四川、雲南、貴州、廣西、海南、廣東、湖南、江西、福建、安徽。南亞至東南亞、太平洋諸島。

用途：藥用。

長萼豬屎豆 *Long-calyx Rattlebox*

Crotalaria calycine Scrank.

習性：多年生草本。花果期：6-12 月。

產地：石澳、蒲台島、長洲。生於路邊荒地。

分佈：西藏、雲南、廣西、海南、廣東、福建、臺灣。亞洲、非洲、大洋洲熱帶、

亞熱帶地區廣佈。

中國豬屎豆 Chinese Rattlebox

Crotalaria chinensis L.

習性：草本。花果期：6-12 月。

產地：粉嶺、大嶼山、果洲群島。生於荒地上。

分佈：雲南、廣西、海南、廣東、湖南、江西、福建、臺灣。南亞、中南半島。

假地藍 False Indigo

Crotalaria ferruginea R. Grah. ex Benth.

習性：草本。花果期：6-12 月。

產地：筆架山。生於荒山草地。

分佈：中國西南部至東南部。南亞至東南亞、菲律賓。

用途：藥用、綠肥、牧草。

印度麻 Sun Hemp

***Crotalaria juncea** L.

習性：草本。花果期：8 月至翌年 5 月。

產地：栽培。

分佈：四川、雲南、廣西、廣東、福建、臺灣、江蘇、山東有栽培。原產印度。現世界各熱帶、亞熱帶地區廣泛栽培或逸生。

用途：纖維、藥用、綠肥。

線葉豬屎豆 Linear-leaved rattlebox

***Crotalaria linifolia** L. f.

習性：多年生草本。花期：5-10 月；果期：8-12 月。

產地：栽培。

分佈：四川、雲南、貴州、廣西、海南、廣東、臺灣。印度、馬來西亞、大洋洲。

用途：藥用。

狹葉豬屎豆

†Crotalaria linifolia var. **stenophylla** (Vogel)

C. Y. Yang

習性：一年生或二年生草本。花期：5—10 月；果期：8—12 月。

產地：香港有記錄。

分佈：海南、廣東、廣西、湖南、臺灣。

豬屎豆 Smooth Crotalaria

Crotalaria pallida Aiton (*Crotalaria mucronata* Desv.)

習性：草本。花果期：9-12 月。

產地：香港島、荃灣、沙田、大嶼山。生於荒地上。

分佈：四川、雲南、廣西、海南、廣東、湖南、福建、浙江、臺灣、山東等省區有栽培。非洲、亞洲、美洲熱帶和亞熱帶地區。

用途：綠肥。

吊裙草 Retuse-leaved Crotalaria

Crotalaria retusa L.

習性：草本。花果期：幾全年。

產地：深水灣、筆架山、川龍、大帽山、林村谷、屯門、浪茄、大嶼山。生於荒山、草地、海濱沙灘。

分佈：海南、廣東、湖南有栽培。馬來西亞、斯里蘭卡、緬甸、越南、印度有分佈。美洲、非洲、大洋洲熱帶和亞熱帶地區。

用途：藥用。

野百合 Purple flower Crotalaria

Crotalaria sessiliflora L.

習性：草本。花果期：5 月至翌年 2 月。

產地：扯旗山、城門、馬鞍山。生於荒山路旁。

分佈：南北各地。東亞至東南亞地區。

用途：藥用。

球果豬屎豆 (鈎狀豬屎豆) Hooked Rattlebox

Crotalaria uncinella Lam.

習性：草本或亞灌木。花果期：8-12 月。

產地：香港島、沙田、大埔、西貢、蒲台島。生於路旁。

分佈：廣西、海南、廣東。非洲、亞洲熱帶、亞熱帶地區。

多疣豬屎豆 (藍花豬屎豆) Blue Crotalaria

***Crotalaria verrucosa** L.

習性：草本。花期：8-12月。
產地：獅子山、城門、青山灣。生於荒山、草地。
分佈：海南、廣東、臺灣。非洲、亞洲熱帶、亞熱帶地區。

光萼豬屎豆 *Glabrous sepal Crotalaria*
†**Crotalaria zanzibarica* Benth.
習性：草本或灌木。花果期：4-12月。
產地：清水灣。栽培逸為野生。
分佈：四川、雲南、廣西、海南、廣東、福建、臺灣。熱帶、亞熱帶地區廣佈。
用途：綠肥、覆蓋植物。

黃檀屬 *Dalbergia* L. f.

南嶺黃檀 *South China rose wood*
Dalbergia balansae Prain
習性：喬木。花期：5-10月；果期：9-12月。
產地：柏架山、司徒拔道、蕉坑、大帽山、古洞。生於雜木林或灌叢中。
分佈：四川、貴州、廣西、海南、廣東、福建、浙江。越南。
用途：觀賞樹種。

兩廣黃檀 *Bentham's rose wood*
Dalbergia benthamii Prain
習性：藤本。花期：2-4月；果期：4-5月。
產地：香港各地。生於疏林中，常攀援於它樹上。
分佈：廣西、海南、廣東。越南。

彎枝黃檀 (扭黃檀) *Twisted rose wood*
Dalbergia candenatensis (Dennst.) Prain
[*Dalbergia torta* Grah.]
習性：藤本。花期：6月；果期：7-8月。
產地：香港仔、大潭灣、沙田、榕樹澳。攀援於林中樹上。
分佈：廣西、廣東。亞洲、大洋洲熱帶地區。

藤黃檀 *Scandent rosewood*
Dalbergia hancei Benth.
習性：藤本。花期：4-5月；果期：7-12月。
產地：香港各地。生於山坡灌叢或山谷溪旁。

分佈：四川、貴州、廣西、海南、廣東、福建、江西、浙江、安徽。
用途：單寧、藥用。

香港黃檀 *Hongkong rosewood*
Dalbergia millettii Benth.
習性：藤本。花期：5-6月；果期：1月。
產地：香港各地。生於林中。
分佈：廣西、廣東、浙江。

降香黃檀
†**Dalbergia odorifera* T. Chen
習性：常綠喬木。花期：4—6月。
產地：公園栽培。
分佈：海南。

印度黃檀 *Sissoo*
†**Dalbergia sissoo* Roxb. ex DC.
習性：喬木。花期：3-4月；果期：5-6月。
產地：銅鑼灣、雅賓利道。栽培。
分佈：海南、廣東、福建有栽培。原產印度。
用途：觀賞樹、木材。

假木豆屬 *Dendrolobium* (Wight & Arn.) Benth.

假木豆 *Triangular Dendrolobium*
†*Dendrolobium triangulare* (Retz.) Schindl.
習性：灌木。花期：8-10月；果期：10-12月。
產地：屯門。生於荒地或山坡灌叢。
分佈：貴州、雲南、廣西、海南、廣東、臺灣。亞洲熱帶、亞熱帶地區及非洲。
用途：藥用。

魚藤屬 *Derris* Lour.

白花魚藤 *White-flowered Derris*
Derris alborubra Hemsl.
習性：藤本。花期：4-6月；果期：7-10月。
產地：大埔、上水、米埔、下坑、南涌、荔枝窩、烏蛟騰。生於疏林或灌叢中。
分佈：雲南、海南、廣東、廣西。越南。

亮葉中南魚藤 *Bright-leaved Ford's Derris*
Derris fordii var. *lucida* Hemsl.
習性：藤本。花期：4-6月；果期：7-10月。

產地：石澳峽。生於疏林中。
分佈：貴州、廣西、廣東。

魚藤 *Derris*

Derris trifoliata Lour.

習性：攀援灌木。花期：4-8月；果期：8-12月。

產地：大埔、汀角、鳳園、凹頭、米埔、青衣島。生於海邊灌叢、海岸紅樹林。

分佈：廣西、海南、廣東、福建、臺灣。印度、馬來西亞、澳大利亞北部。

山螞蟥屬 *Desmodium* Desv.

小槐花 (山螞蟥) *Desmodium*

Desmodium caudatum (Thunb.) DC.

習性：灌木。花期：7-9月；果期：9-11月。

產地：西貢、茅坪、大埔、粉嶺。生於路旁草地、林緣。

分佈：長江以南各省區、東至臺灣。馬來西亞、緬甸、斯里蘭卡、印度、朝鮮、日本。

用途：藥用。

大葉山螞蟥 Big-leaved *Desmodium*

Desmodium gangeticum (L.) DC.

習性：灌木。花期：4-8月；果期：8-9月。

產地：香港島、荃灣、城門、大埔、大帽山、大嶼山。生於荒地或次生林中。

分佈：雲南、廣西、海南、廣東、臺灣。亞洲、非洲、大洋洲熱帶地區。

假地豆 False Groundnut

Desmodium heterocarpon (L.) DC.

習性：灌木。花期：7-10月；果期：10-11月。

產地：香港各地。生於荒地、灌叢中。

分佈：長江以南各省區、臺灣。南至馬來西亞及大洋洲。

用途：藥用。

異葉山螞蟥 Heterophyllous tick clover

Desmodium heterophyllum (Willd.) DC.

習性：草本。花果期：7-10月。

產地：香港各地。生於河邊、田邊、草地。

分佈：雲南、海南、廣東、廣西、江西、福

建、臺灣、安徽。印度、斯里蘭卡、越南、緬甸、泰國、太平洋群島、大洋洲。

小葉三點金 (小葉山綠豆)

†***Desmodium microphyllum*** (Thunb.) DC.

習性：草本。

產地：香港各地。生於荒地草叢中或灌木林中。

分佈：長江以南各省區。印度、斯里蘭卡、尼泊爾、緬甸、泰國、越南、馬來西亞、日本和澳大利亞。

顯脈山綠豆 Distinct-nerved tick clover

Desmodium reticulatum Champ. ex Benth.

習性：灌木。花期：6-8月；果期：9-10月。

產地：大埔滘、鴉山、林村、新娘潭、大嶼山。生於山地灌叢或草坡上。

分佈：雲南、廣西、海南、廣東。緬甸、泰國、越南。

†****Desmodium scorpiurus*** (Sw.) Desv.

習性：多年生草本。

產地：大東山。

分佈：原產南美洲。

長波葉山螞蟥 Sinuate tick clover

†***Desmodium sequax*** Wall.

習性：灌木。花期：7-9月；果期：9-11月。

產地：大埔滘。生於草坡或林緣。

分佈：廣西、廣東、湖南、湖北、臺灣、貴州、雲南、四川、西藏。尼泊爾、印度、緬甸、印度尼西亞、新幾內亞。

金錢草 Snow-bell leaf tick clover

Desmodium styracifolium (Osbeck) Merr.

習性：草本。花果期：6-9月。

產地：河背、大嶼山。生於山坡、草地、灌叢中。

分佈：雲南、海南、廣西、廣東。印度至馬來西亞。

用途：藥用。

南美山螞蟥 (扭莢山綠豆) Beggarweed

***Desmodium tortuosum** (Sw.) DC.

習性：草本。花果期：7-9 月。
產地：香港島、荔枝角、大埔滘、大嶼山、
喜靈洲。逸生於荒地。
分佈：廣州。原產南美。

三點金 Three flower beggarweed

Desmodium triflorum (L.) DC.

習性：草本。花果期：6-10 月。
產地：香港各地。生於曠野草地。
分佈：雲南、海南、廣西、廣東、江西、福
建、浙江、臺灣。亞洲熱帶地區、大
洋洲、美洲。
用途：藥用。

絨毛山螞蟥 Velvet leaved Desmodium

Desmodium vellutinum (Willd.) DC.

習性：灌木。花果期：9-11 月。
產地：掃桿埔、城門、碗窰、大嶼山。生於
草坡、灌叢。
分佈：雲南、海南、廣西、廣東、貴州、臺
灣。熱帶亞洲及非洲。

野扁豆屬 *Dunbaria* Wight & Arn.

黃毛野扁豆 Yellow hairy dunbaria

Dunbaria fusca (Wall.) Kurz

習性：藤本。花期：7-9 月；果期：10-12
月。
產地：荃灣、城門、新娘潭。生於山坡或曠
野草地。
分佈：雲南、海南、廣西、廣東。印度、緬
甸、越南、老撾、泰國。

長柄野扁豆 Long stipe Dunbaria

Dunbaria podocarpa Kurz

習性：藤本。花果期：6-11 月。
產地：歌賦山、大埔、粉嶺。生於灌叢或曠
野。
分佈：海南、廣西、廣東、福建。印度、緬
甸、越南、老撾、柬埔寨。

圓葉野扁豆 Round leaf Dunbaria

Dunbaria rotundifolia (Lour.) Merr.

習性：藤本。花果期：9-10 月。
產地：香港仔、葵涌、沙田、粉嶺、石崗。

生於山坡灌叢或曠野草地。

分佈：四川、貴州、海南、廣西、廣東、江
西、福建、臺灣、江蘇。印度、印度
尼西亞、菲律賓。

雞頭薯屬 *Eriosema* (DC.) G. Don

雞頭薯(豬仔笠) Chinese *Eriosema*

Eriosema chinense Vogel

習性：多年生草本。花期：5-7 月；果期：
7-10 月。
產地：香港島、九龍水塘、粉嶺、河背、大
帽山、大嶼山。生於土壤貧瘠的草
坡。
分佈：貴州、雲南、海南、廣西、廣東、湖
南、江西。印度、緬甸、越南、泰國、
印度尼西亞。
用途：藥用。

刺桐屬 *Erythrina* L.

南非刺桐 African Coral tree

***Erythrina caffra** Thunb.

習性：喬木。花期：3 月；果期：6 月。
產地：栽培。
分佈：原產非洲南部。
用途：觀賞。

龍牙花 Coral tree

***Erythrina corallodendron** L.

習性：喬木。花期：5-9 月。
產地：栽培。
分佈：廣州、桂林、貴陽、西雙版納有引種。
原產西印度群島。
用途：觀賞。

雞冠刺桐 Cockspur Coral Tree

***Erythrina crista-galli** L.

習性：灌木。花期：6-10 月。
產地：栽培。
分佈：西雙版納有引種。原產巴西。
用途：觀賞。

納塔爾刺桐 Natal Coral Tree

***Erythrina humeana** Spreng.

習性：喬木。花期：7 月。
產地：栽培。

分佈：原產南非。
用途：觀賞。

黑刺桐 Kaffir boom

†***Erythrina lysistemon** Hitch.

習性：喬木。花期：2月。
產地：栽培。
分佈：原產非洲。
用途：觀賞。

象牙花 Ivory coral tree

***Erythrina speciosa** Andr.

習性：小喬木。花期：3月。
產地：栽培。
分佈：原產巴西。
用途：觀賞。

刺桐 Coral tree

***Erythrina variegata** L.

習性：喬木。花期：3-5月；果期：6-8月。
產地：栽培。
分佈：海南、廣西、廣東、福建、臺灣、印度、越南、老撾、柬埔寨、馬來西亞。原產印度至大洋洲海岸林中。
用途：觀賞、藥用。

千斤拔屬 *Flemingia* Roxb. ex W. T. Ait.

大葉千斤拔 Large leaf Flemingia

Flemingia macrophylla (Willd.) Prain
[*Moghania macrophylla* (Willd.) Kuntze]

習性：灌木。花期：6-9月；果期：10-12月。
產地：西貢、城門、大帽山、元墩下、亞媽笏。生於曠野草地或疏林下。
分佈：四川、貴州、雲南、海南、廣西、廣東、江西、福建、臺灣。熱帶亞洲。
用途：藥用。

千斤拔 Philippine Flemingia

Flemingia prostrata ex Roxb. [*Moghania philippinensis* (Merr. & Rolfe) Li]

習性：灌木。花果期：夏、秋季。
產地：大鵬灣平洲。生於曠野草地。

分佈：西南、華南、華東。東亞，菲律賓。
用途：藥用。

幹花豆屬 *Fordia* Hemsl.

幹花豆 Common Fordia

†****Fordia cauliflora*** Hemsl.

習性：灌木。花期：5-9月；果期：6-11月。
產地：栽培。
分佈：廣西、廣東。
用途：藥用。

乳豆屬 *Galactia* P. Br.

乳豆 Milk pea

Galactia tenuiflora (Klein ex Willd.) Wight & Arn.

習性：藤本。花果期：8-9月。
產地：鶴咀、大坳門、清水灣、蒲台島、長洲。生於村邊灌叢中。
分佈：雲南、海南、廣西、廣東、湖南、臺灣。印度、斯里蘭卡、馬來西亞、泰國、越南、菲律賓。

睫苞豆屬 *Geissaspis* Wight & Arn.

睫苞豆 (雞冠苞覆花) *Geissaspis*

Geissaspis cristata Wight & Arn.

習性：草本。花果期：5-8月。
產地：深水灣、西貢、大環、大網仔、西徑、大嶼山。生於海濱濕地上。
分佈：廣東。尼泊爾、斯里蘭卡、緬甸、泰國、印度尼西亞。

格力豆屬 *Gliricidia* Kunth

格力豆 Madre de Cacao, Nicaraguan cocoa-shade

†****Gliricidia sepium*** (Jacq.) Kunth ex Walp.

習性：喬木。花期：5月。
產地：栽培。
分佈：原產中美洲及南美洲。熱帶地區有栽培。
用途：遮蔭樹。種子及樹皮有毒。

大豆屬 *Glycine* Willd.

大豆 Soybean

****Glycine max*** (L.) Merr.

習性：草本。花期：6-7月；果期：7-9月。

產地：栽培。

分佈：原產我國，現世界各地均有栽培。

用途：油料作物。

長柄山螞蟥屬 *Hylodesmum* H.

Ohashi & R. R. Mill

側序長柄山螞蟥 Lateral inflorescence

Hylodesmum

Hylodesmum laterale (Schindl.) H. Ohashi &

R. R. Mill (*Desmodium laxum* auct.

non DC.: Check List HK Pl. 1993, p.

p.)

習性：草本。花期：9-10月。

產地：大帽山。生於林中溪旁。

分佈：海南、廣西、廣東、福建、臺灣、日本。

細長柄山螞蟥 Slender *Hylodesmum*

Hylodesmum leptopus (A. Gray ex Benth.) H.

Ohashi & R. R. Mill (*Desmodium*

laxum auct. non DC.: Check List HK

Pl. 1993, p.p.)

習性：灌木。花果期：8-9月。

產地：大帽山、茅坪。生於密林蔭處。

分佈：四川、雲南、海南、廣西、廣東、福建、湖南、江西、臺灣、泰國、越南、菲律賓、日本。

木藍屬 *Indigofera* L.

硬毛木藍（剛毛木藍） Hairy Indigo

Indigofera hirsuta L.

習性：灌木。花期：7-9月；果期：10-12月。

產地：香港島、荃灣、大欖涌、青山、大嶼山。生於溪邊、河旁雜木林或灌叢。

分佈：廣東、福建、浙江、安徽。日本。

穗序木藍（鋪地木藍） Spicate indigo

Indigofera spicata Forsk.

習性：草本。花果期：4-11月。

產地：牛池灣、沙田。生於路旁空地。

分佈：雲南、廣東、臺灣。亞洲熱帶地區、非洲。

野青樹 Anil Indigo

****Indigofera suffruticosa*** Mill.

習性：灌木、亞灌木。花期：3-5月；果期：6-10月。

產地：石澳、荃灣、葵盛圍、沙田、大埔、元墩下、大帽山、大嶼山。栽培或逸為野生。

分佈：雲南、海南、廣西、廣東、福建、臺灣、浙江、江蘇有栽培。原產熱帶美洲，現廣佈於全世界熱帶地區。

用途：藥用。

木藍（藍靛） Common indigo

Indigofera tinctoria L.

習性：亞灌木。花果期：幾全年。

產地：沙田、火炭、大嶼山。生於曠野。

分佈：雲南、海南、廣西、廣東、臺灣、安徽。亞洲、非洲熱帶地區廣佈。美洲亦有引種。

用途：藥用。

脈葉木藍 Veined-leaf indigo

Indigofera venulosa Champ. ex Benth.

習性：灌木。花期：3-5月。

產地：馬鞍山、大東山。生於林下。

分佈：廣東、臺灣。

雞眼草屬 *Kummerowia* Schindl.

雞眼草 Japanese Bushclover

Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.

習性：一年生草本。花期：7-9月；果期：8-10月。

產地：香港島、荃灣、馬料水。生於田邊、路旁、山坡草地。

分佈：西南、華南、華北、東北。朝鮮、俄羅斯、日本。

用途：藥用、飼料、綠肥。

扁豆屬 *Lablab* Adans.

扁豆 Hyacinth-bean

****Lablab purpureus*** (L.) Sweet (*Dolichos lablab* L.)

習性：藤本。花期：4-12月。

產地：栽培。

分佈：中國及世界各地廣泛栽培。原產地可能為印度。

用途：食用、藥用。

山鰲豆屬 *Lathyrus* L.

香豌豆 Sweet pea

**Lathyrus odoratus* L.

習性：一年生草本。花果期：6-9月。

產地：栽培。

分佈：中國及世界各地常見栽培。原產歐洲。

用途：觀賞。植株及種子有毒！

胡枝子屬 *Lespedeza* Michx.

中華胡枝子 Chinese Lespedeza

Lespedeza chinensis G. Don

習性：小灌木。花期：8-9月；果期：10-11月。

產地：香港島、西貢、咸田、大鵬灣平洲、大嶼山。生於草叢或灌叢。

分佈：四川、湖北、湖南、廣東、福建、江西、浙江、臺灣、江蘇、安徽。

截葉鐵掃帚 Cuneate Lespedeza

Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don

習性：小灌木。花期：7-8月；果期：9-10月。

產地：香港島、青山、大鵬灣平洲、大嶼山。生於路旁。

分佈：山東、甘肅、臺灣及江南各省區。朝鮮、日本、印度、巴基斯坦、阿富汗、澳大利亞。

美麗胡枝子 Beautiful Lespedeza

Lespedeza formosa (Vogel) Kochne

習性：灌木。花期：7-9月；果期：9-12月。

產地：香港島、大欖涌、青山、大帽山、大浪西灣。生於山坡路旁、林緣灌叢。

分佈：西南、華南、華東、華北及陝西、甘肅。印度、朝鮮、日本。

馬鞍樹屬 *Maackia* Rupr. & Maxim.

華南馬鞍樹 Southern yellowwood

Maackia australis (Dunn) Takeda (*Maackia ellipticarpa* Merr. ; *Cladrestis australis* Dunn)

習性：灌木。花期：7月。

產地：沙頭角、大嶼山。生於灌叢中。

分佈：廣東沿海島嶼。

大翼豆屬 *Macroptilium* (Benth.)

Urban

紫花大翼豆 Purple-bean

†**Macroptilium atropurpureum* (DC)

Urban

習性：蔓生草本。花期：7月。

產地：栽培。

分佈：廣東有栽培。原產熱帶美洲，現世界上許多地區有栽培，或逸為野生。

用途：牧草。

大翼豆 One leaf-clover

**Macroptilium lathyroides* (L.) Urban

習性：草本。花期：7月；果期：9-11月。

產地：栽培。

分佈：廣東、福建有栽培。原產熱帶美洲，現世界上許多地區有栽培。

用途：覆蓋作物。

苜蓿屬 *Medicago* L.

南苜蓿 Toothed medic

**Medicago polymorpha* L. [*Medicago hispida* Gaertn.]

習性：草本。花期：3-5月；果期：5-6月。

產地：栽培。

分佈：長江流域以南及陝西、甘肅、雲南、貴州。歐洲、亞洲、非洲、美洲、大洋洲亦有引種。

紫苜蓿 Alfafa

Medicago sativa L.

習性：多年生草本。花期：5-7月；果期：6-8月。

產地：歌賦山。

分佈：全國各地有栽培或呈半野生狀態。原產亞洲，現世界各地泛栽培。

用途：飼料。

崖豆藤屬 *Millettia* Wight & Arn.

綠花崖豆藤（綠花雞血藤） *Champion's Millettia*

Millettia championii Benth.

習性：藤本。花期：6-8月；果期：8-10月。
產地：歌賦山、柏架山、沙田、馬鞍山、南涌。生於山谷、溪邊灌叢。
分佈：廣西、廣東、福建。
用途：藥用。有毒！

香花崖豆藤 (山雞血藤) *Diel's Millettia*

***Millettia dielsiana* Harms**

習性：攀援灌木。花期：5-9月；果期：6-11月。

產地：大帽山。生於山坡雜木林或灌叢中。
分佈：中國西南部至東南部及陝西、甘肅、越南、老撾。

亮葉崖豆藤 (亮葉雞血藤)

Glittering-leaved Millettia

***Millettia nitida* Benth.**

習性：攀援灌木。花期：5-9月；果期：7-11月。

產地：香港各地。生於海岸灌叢或山地疏林。

分佈：貴州、海南、廣西、廣東、福建、江西。

皺果崖豆藤 *Wrinkly fruit Millettia*

***Millettia oosperma* Dunn**

習性：攀援灌木。花期：5-7月；果期：8-11月。

產地：鶴咀。生於疏林中。

分佈：貴州、雲南、海南、廣西、廣東、湖南、越南。

用途：種子有毒，可作殺蟲藥。

香港崖豆藤 *Hongkog Millettia*

†***Millettia oraria* Dunn**

習性：灌木或小喬木。花期：5-7月；果期：11月。

產地：石澳、大浪灣、鶴咀、奇力山、大嶼山。

分佈：廣西、廣東。

厚果崖豆藤 (厚果雞血藤)

Thick-pericarped Millettia

***Millettia pachycarpa* Benth.**

習性：藤本。花期：4-6月；果期：6-11月。
產地：城門、林村谷。生於常綠闊葉林內。
分佈：中國西南部至東南部。印度、尼泊爾、不丹、孟加拉、緬甸、老撾、泰國、越南。

用途：殺蟲藥。

印度崖豆藤 (印度雞血藤) *Indian Millettia*

***Millettia pulchra* (Benth.) Kurz (*Tephrosia tutcherii* Dunn)**

習性：灌木或小喬木。花期：4-8月；果期：6-10月。

產地：石澳、深水灣、香港仔、大埔滘、林村、大嶼山。生於林緣。

分佈：貴州、雲南、海南、廣西。印度、緬甸、老撾。

雞血藤 *Millettia*

***Millettia reticulata* Benth.**

習性：藤本。花期：5-10月。

產地：香港島、馬鞍山、大帽山、大嶼山、大鴉洲、大鵬灣平洲。生於山地及溝谷灌叢。

分佈：中國西南部至東南部。越南。

用途：觀賞。

美麗崖豆藤 (美麗雞血藤) *Showy Millettia*

***Millettia speciosa* Champ.**

習性：藤本。花期：7-10月；果期：翌年2月。

產地：香港島、沙田、大埔、大帽山、馬鞍山、西貢、大浪西灣、大嶼山。生於曠野、灌叢或疏林。

分佈：貴州、雲南、海南、廣西、廣東、湖南、福建。越南。

用途：藥用。

鰲豆屬 *Mucuna* Adans.

白花油麻藤 (勃氏鰲豆) *Birdwood's Mucuna*

***Mucuna birdwoodiana* Tutch.**

習性：藤本。花期：4-6月；果期：6-11月。

產地：香港島、城門、大帽山、大埔滘、元墩下、大刀岩、茅坪。攀援於喬木上。

分佈：四川、貴州、廣西、廣東、福建、江西。

用途：藥用。種子有毒！

港油麻藤 (香港蠶豆) Hongkong Mucuna
Mucuna championii Benth. (*Mucuna nigricans* var. *hongkongensis* Wilmot-Dear)

習性：攀援藤本。花期：3-8月；果期：9-12月。

產地：銅鑼灣、大埔、社山村、林村谷、鳳園、船灣、谷埔。攀援於它樹上。

分佈：福建、廣西、廣東。生於山谷岩石、溪邊灌叢中。

用途：根莖有毒。藥用。

大球油麻藤 (長莢蠶豆) Long fruited Mucuna

Mucuna macrobotrys Hance

習性：攀援灌木。

產地：香港。攀援於他樹上。

分佈：雲南、廣西。

紅豆屬 *Ormosia* Jacks.

凹葉紅豆 Emarginate-leaved *Ormosia*

Ormosia emarginata (Hook. & Arn.) Benth.

習性：小喬木。花期：5-6月。

產地：香港各地。生於混交林中。

分佈：海南、廣西、廣東。越南。

用途：木材。

韌莢紅豆 Hard-fruited *Ormosia*

Ormosia indurata L. Chen

習性：喬木。果期：11月。

產地：歌賦山、香港仔、茅坪、烏蛟騰、黃龍坑。生於雜木林內。

分佈：廣東、福建。

茸莢紅豆 Hairy-fruited *Ormosia*

Ormosia pachycarpa Champ. ex Benth.

習性：喬木。花期：6-7月。

產地：扯旗山、黃竹坑、蕉坑、大埔、打鐵崗。生於山地雜木林內。

分佈：廣東沿海地區。

用途：木材。

海南紅豆

†***Ormosia pinnata** (Lour.) Merr.

習性：常綠喬木。

產地：栽培。

分佈：海南、廣東、廣西。越南。

軟莢紅豆 Soft-fruited *Ormosia*

Ormosia semicastrata Hance

習性：喬木。花期：4-5月。

產地：大潭、大埔滘、馬鞍山。生於雜木林中。

分佈：海南、廣西、廣東、福建、江西。

用途：纖維。

豆薯屬 *Pachyrhizus* Rich. ex DC.

豆薯 (沙葛) Yam bean

***Pachyrhizus erosus** (L.) Urb.

習性：藤本。花期：8月；果期：11月。

產地：栽培。

分佈：中國西南部至東南部均有栽培。原產熱帶美洲，現許多熱帶地區均有栽培。

用途：蔬菜；種子作殺蟲藥。

排錢草屬 *Phyllodium* Desv.

毛排錢草 Hairy *Phyllodium*

Phyllodium elegans (Lour.) Desv.

習性：灌木。花期：7-8月；果期：10-11月。

產地：城門、元墩下、大埔滘、大埔、林村、粉嶺、沙頭角。生於荒地。

分佈：雲南、海南、廣西、廣東、福建。亞洲東南部。

排錢草 Beautiful *Phyllodium*

Phyllodium pulchellum (L.) Desv.

習性：灌木。花期：7-9月；果期：10-11月。

產地：香港各地。生於荒地。

分佈：雲南、海南、廣西、廣東、福建、臺灣、江西。亞洲熱帶地區及澳大利亞。

用途：藥用。

豌豆屬 *Pisum* L.

豌豆 Garden Pea

***Pisum sativum L.**

習性：攀援草本。花期：6-7月；果期：7-9月。

產地：栽培。

分佈：中國大部分地區有栽培。世界各地有栽培。

用途：食用、綠肥、飼料。

水黃皮屬 Pongamia Vent.

水黃皮 Pongamia

Pongamia pinnata (L.) Pierre

習性：喬木。花期：5-6月；果期：8-10月。

產地：沙田、榕樹澳、大嶼山。公園及行道旁亦有栽培。生於塘邊、溪邊、海邊。

分佈：海南、廣東、福建、臺灣。印度、斯里蘭卡、馬來西亞、印度尼西亞至澳大利亞。

用途：木材、行道樹。

四稜豆屬 Psophocarpus Neck. ex DC.

四稜豆 Winged-bean

†***Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC.**

習性：攀援草本。果期：10-11月。

產地：栽培。

分佈：雲南、海南、廣西、廣東、臺灣有栽培。亞洲南部、大洋洲、非洲均有栽培。

用途：食用。

補骨脂屬 Psoralea L.

補骨脂 Malaytea scurfpea

***Psoralea corylifolia L. (Cullen corylifolia (L.) Medik.)**

習性：一年生草本。花果期：7-10月。

產地：大埔。栽培。

分佈：雲南、四川有野生；廣西、廣東、江西、安徽、河南、河北、山西、甘肅有栽培。印度、緬甸、斯里蘭卡。

用途：藥用。

紫檀屬 Pterocarpus Jacq.

紫檀 Burmese rosewood

***Pterocarpus indicus Willd.**

習性：喬木。花期：2-8月；果期：11月。

產地：栽培。

分佈：雲南、廣東、臺灣有栽培。印度、菲律賓、印度尼西亞、緬甸。

用途：木材。

葛屬 Pueraria DC.

葛 Kudzu

Pueraria lobata (Willd.) Ohwi

習性：藤本。花期：9-10月；果期：11-12月。

產地：大埔。生於山地疏林中。

分佈：南北各地。東亞、東南亞至澳大利亞。

用途：藥用。

葛麻姆 Montana kudzu

†**Pueraria lobata var. montana (Lour.) Maesen [Pueraria montana (Lour.) Merr.]**

習性：藤本。花期：9-10月；果期：11-12月。

產地：香港各地。生於曠野灌叢或山地疏林。

分佈：西南部至東南部各省區。泰國、菲律賓、老撾、越南、日本。

粉葛 Thomson Kudzu

Pueraria lobata var. thomsonii (Benth.) Maesen (Pueraria thomsonii Benth.)

習性：藤本。花期：9月；果期：11月。

產地：元朗、林村、大埔。生於山野灌叢或栽培。

分佈：西藏、四川、雲南、海南、廣西、廣東。印度、泰國、老撾。

用途：食用。

三裂葉野葛 Tropical kudzu

Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth.

習性：藤本。花期：8-9月；果期：10-11月。

產地：薄扶林、石澳、城門、大埔滘、大埔、粉嶺、鹿頸。生於灌叢中。

分佈：雲南、海南、廣西、廣東、浙江。印度、中南半島、馬來西亞。

用途：綠肥。

密子豆屬 *Pycnospora* R. Br. ex
Wight & Arn.

密子豆 *Leutescent Pycnospora*

Pycnospora lutescens (Poir.) Schindl.

習性：灌木。花果期：8-9月。

產地：薄扶林、城門、鳳園、大鴉洲、南丫島。生於草地上。

分佈：貴州、雲南、海南、廣西、廣東、江西、臺灣。亞洲熱帶及澳大利亞。

用途：綠肥。

鹿藿屬 *Rhynchosia* Lour.

鹿藿 *Rat's eye bean*

Rhynchosia volubilis Lour.

習性：藤本。花期：5-8月；果期：9-12月。

產地：香港仔、沙田、大埔、林村、鳳園、粉嶺、大鵬灣平洲。生於草叢中。

分佈：長江以南各省區。朝鮮、日本、越南。

用途：藥用。

田菁屬 *Sesbania* Scop.

刺田菁 *Spiny Sesbania*

†*Sesbania bispinosa* (Jacq.) W. F. Wight

習性：草本。花果期：8-12月。

產地：黃泥涌峽、大坑、元朗、青山灣、屯門、沙埔、坪洲。生於濕潤山坡上。

分佈：四川、雲南、海南西沙群島、廣西、廣東。中亞、南亞、中南半島、馬來半島。

田菁 *Dhaincha*

†**Sesbania cannabina* (Retz.) Poir.

習性：草本。花果期：7-12月。

產地：栽培或逸為野生。

分佈：雲南、華南及華東有栽培或逸生。東半球熱帶有栽培或逸生。

用途：綠肥。

大花田菁 *Agati*

†**Sesbania grandiflora* (L.) Pers.

習性：小喬木。花果期：9月至翌年4月。

產地：栽培。

分佈：雲南、廣西、廣東、臺灣有栽培。巴基斯坦、印度、中南半島、菲律賓、

毛里裘斯。

用途：觀賞。

沼生田菁 *Java Sesban*

Sesbania javanica Miq. [*Sesbania cochinchinensis* (Lour.) DC.]

習性：草本。花期：6-10月。

產地：荔枝角、城門、屯門。生於低窪之地。

分佈：臺灣。熱帶亞洲、澳大利亞。

坡油甘屬 *Smithia* Ait.

密花坡油甘 *Crowded Flower Smithia*

Smithia conferta Smith

習性：一年生草本。花果期：7-10月。

產地：梅道、川龍、西貢、粉嶺、大嶼山。生於沙地上。

分佈：廣東。熱帶亞洲及澳大利亞。

槐屬 *Sophora* L.

槐 *Pagoda-tree*

**Sophora japonica* L.

習性：喬木。花期：7-8月；果期：8-10月。

產地：栽培。

分佈：南北各地廣泛栽培。原產中國，東亞、歐美許多國家均有引種。

用途：木材、藥用。

絨毛槐（海南豆樹） *Hairy Sophora*

Sophora tomentosa L.

習性：灌木或小喬木。花期：8-10月；果期：9-12月。

產地：大浪西灣。生於濱海沙丘地或栽培。

分佈：海南、廣東、臺灣。熱帶地區廣佈。

密花豆屬 *Spatholobus* Hassk.

密花豆 *Suberet Spatholobus*

†*Spatholobus suberectus* Dunn

習性：藤本。花期：6月；果期：11-12月。

產地：新界。生於溝谷林中。

分佈：雲南、廣西、廣東、福建。

用途：藥用。

綠玉藤屬 *Strongylodon* Vogel

綠玉藤 *Jade vine*

**Strongylodon macrobotrys* A. Grey

習性：藤本。花期：4-5 月。

產地：栽培。

分佈：原產菲律賓。

用途：觀賞。

筆花豆屬 *Stylosanthes* Sw.

圭亞那筆花豆 *Brazilian stylo*

†**Stylosanthes guianensis* (Aubl.) Sw.

習性：草本或亞灌木。花期：8-11 月。

產地：南丫島、葵涌公園。栽培。

分佈：原產南美。熱帶地區常見引種或歸化。

用途：牧草、綠肥。

葫蘆茶屬 *Tadehagi* Ohashi

葫蘆茶 *Triquetrous Tadehagi*

Tadehagi triquetrum (L.) Ohashi [*Pteroloma triquetrum* (L.) Desv. ex Benth.]

習性：灌木或亞灌木。花期：6-10 月；果期：10-12 月。

產地：香港各地。

分佈：雲南、貴州、廣西、海南、廣東、江西、福建。亞洲熱帶地區及澳大利亞北部。

用途：藥用。

灰毛豆屬 *Tephrosia* Pers.

白灰毛豆 *White Tephrosia*

**Tephrosia candida* DC.

習性：亞灌木。花期：10-11 月；果期：12 月。

產地：獅子山。栽培或逸生於草地。

分佈：雲南、廣西、廣東、福建有栽培或逸生。原產印度東部及馬來半島。

灰毛豆（紅花灰葉） *Purple Tephrosia*

Tephrosia purpurea (L.) Pers.

習性：亞灌木。花期：3-10 月。

產地：香港各地。生於海邊。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、福建、臺灣。廣佈於全世界熱帶地區。

用途：綠肥。

黃灰毛豆（黃毛灰葉） *Yellowhair Tephrosia*

Tephrosia vestita Vogel

習性：亞灌木。花期：6-10 月；果期：7-11 月。

產地：大嶼山。生於疏林或草地。

分佈：海南、廣東、江西。亞洲東南部至新幾內亞。

大班木屬 *Tipuana* (Benth.) Benth.

大班木 *Tipu*

**Tipuana tipu* (Benth.) Kuntze

習性：喬木。花期：5 月。

產地：扯旗山。

分佈：原產南美洲，熱帶地區常見引種。

用途：行道樹、木材。

車軸草屬 *Trifolium* L.

草原車軸草 *Low hop clover*

†**Trifolium campestre* Schreb.

習性：草本。花期：5 月。

產地：栽培。

分佈：原產地中海地區，歐洲廣佈。

白車軸草 *White clover*

**Trifolium repens* L.

習性：草本。花果期：5-10 月。

產地：薄扶林、大帽山、城門。栽培或逸生於草地。

分佈：原產歐洲和北非，現世界各地常見栽培。

用途：牧草、綠肥。

狸尾豆屬 *Uraria* Desv.

貓尾草 *Cat's Tail bean*

Uraria crinita (L.) Desv. ex DC.

習性：亞灌木。花果期：4-9 月。

產地：香港島、馬鞍山、城門、大埔滘、打鼓嶺、大嶼山、青衣島、蒲台島。生於乾燥曠野。

分佈：雲南、廣西、海南、廣東、江西、福建。亞洲熱帶地區及澳大利亞。

用途：藥用。

狸尾豆 *Dog's tail bean*

Uraria lagopodioides (L.) Desv. ex DC.

習性：草本。花果期：8-11 月。

產地：尖沙咀、城門、大帽山、大嶼山、大

鵬灣平洲。生於曠野灌叢。
分佈：雲南、貴州、廣西、海南、廣東、湖南、江西、福建、臺灣。亞洲熱帶地區及澳大利亞。
用途：藥用。

野豌豆屬 *Vicia* L.

蠶豆 Broad bean

†**Vicia faba* L.

習性：一年生草本。花期：4-5 月；果期：5-6 月。

產地：栽培。

分佈：全國各地均有栽培。原產北非至亞洲西南部。

用途：食用。

小巢菜 (翹搖) Tiny vetch

**Vicia hirsuta* (L.) S. F. Gray

習性：一年生草本。花果期：2-7 月。

產地：栽培。

分佈：中國大部分地區有栽培。東亞、歐洲、北美。

用途：綠肥、飼料、藥用。

野豌豆 Vetch

**Vicia sativa* L.

習性：一年生或二年生草本。花期：4-7 月；果期：7-9 月。

產地：栽培。

分佈：全國各地。原產歐洲南部、亞洲西部，現廣為栽培。

用途：綠肥、牧草。

豇豆屬 *Vigna* Savi

赤豆(紅豆) Adzuki bean

Vigna angularis (Willd.) Ohwi & Ohashi

習性：纏繞草本。花期：6-7 月；果期：9-10 月。

產地：栽培。

分佈：南北各地均有栽培。菲律賓、朝鮮、俄羅斯、日本。美洲、非洲有引種。

用途：食用、藥用。

濱豇豆 Marine cowpea

†**Vigna marina* (Burm.) Merr.

習性：攀援草本。果期：10 月。

產地：石澳。生於海邊沙地。

分佈：海南、臺灣。熱帶地區廣佈。

賊小豆 (山綠豆) Narrow-leaved kidney bean

†*Vigna minima* (Roxb.) Ohwi & Ohashi (*Phaseolus minimus* Roxb.)

習性：纏繞草本。花果期：8-10 月。

產地：歌賦山、城門、大帽山、大埔、大嶼山、。生於草叢或灌叢。

分佈：中國南部、東南部至北部。菲律賓、日本。

綠豆 Green grain

**Vigna radiata* (L.) Wilczek

習性：一年生草本。花期：5-6 月；果期：6-9 月。

產地：栽培。

分佈：南北各地均有栽培。世界各熱帶、亞熱帶地區廣泛栽培。

用途：食用、藥用。

赤小豆 Rice bean

**Vigna umbellata* (Thunb.) Ohwi (*Phaseolus chrysanthus* Savi)

習性：一年生草本。花期：5-8 月。

產地：栽培。

分佈：中國南部有栽培或野生。亞洲東南部、菲律賓、朝鮮、日本。

用途：食用、藥用。

豇豆 Cowpea

**Vigna unguiculata* (L.) Walp. [*Vigna sinensis* (L.) Savi ex Hassk.]

習性：一年生草本。花期：6-7 月；果期：8 月。

產地：栽培。

分佈：全國各地常見栽培。全球熱帶、亞熱帶地區廣泛栽培。

用途：食用。

短豇豆 (眉豆) Cat jang

†**Vigna unguiculata* subsp. *cylindrica* (L.)

Verdc. [*Vigna sinensis* (L.) Savi ex Hassk.]

習性：一年生草本。花期：4-5 月；果期：9 月。

產地：栽培。

分佈：全國各地常見栽培。日本、朝鮮、美洲有引種。

用途：食用。

長豇豆(豆角) Yard-long bean

****Vigna unguiculata* subsp. *sesquipedalis* (L.) Verdc.**

習性：一年生攀援草本。花果期：6-8 月。

產地：栽培。

分佈：全國各地常見栽培。非洲、亞洲熱帶地區廣泛栽培。

用途：食用。

紫藤屬 *Wisteria* Nutt.

紫藤 Chinese Wisteria

****Wisteria sinensis* (Sims) Sweet**

習性：藤本。花期：4-5 月；果期：5-8 月。

產地：栽培。

分佈：黃河流域以南。野生或栽培。

用途：觀賞。

丁癸草屬 *Zornia* J. F. Gmel

丁癸草 *Zornia*

***Zornia gibbosa* Span. (*Zornia cantoniensis* Mohlenbrock)**

習性：多年生草本。花期：4-7 月；果期：7-9 月。

產地：香港島、沙田、馬料水、汀角路、大嶼山。生於草地上。

分佈：江南各省區。印度、斯里蘭卡、緬甸、日本。

用途：藥用。

186. 胡頹子科 *Elaeagnaceae*

胡頹子屬 *Elaeagnus* L.

雞柏紫藤 (羅氏胡頹子)

***Elaeagnus loureirii* Champ.**

習性：常綠藤本。花期：10-12 月；果期：翌年 4-5 月。

產地：香港島、大帽山、馬鞍山、大埔滘、西貢、大網仔、大嶼山。生於疏林下、灌叢中。

分佈：廣東、廣西、雲南、江西。

用途：果可食。

香港胡頹子 (塔氏胡頹子)

***Elaeagnus tucherii* Dunn**

習性：常綠灌木。花期：11-12 月；果期：翌年 3 月。

產地：香港仔、扯旗山、鶴咀、大澳、大鵬灣平洲。生於疏林下、灌叢中。

分佈：廣東、湖南。

用途：果可食。

187. 山龍眼科 *Proteaceae*

銀樺屬 *Grevillea* R. Br.

昆士蘭銀樺 (紅花銀樺) Bank's *Grevillea*

****Grevillea banksii* R. Br.**

習性：喬木或灌木。

產地：公園栽培或路旁種植。

分佈：原產澳大利亞昆士蘭，現馬來半島、印度尼西亞有栽培。

用途：觀賞。

銀樺 Silk Oak

****Grevillea robusta* A. Cunn. ex R. Br.**

習性：喬木。花期：3-5 月；果期：6-8 月。

產地：公園栽培或路旁種植。

分佈：原產澳大利亞，現世界熱帶、亞熱帶有引種。

用途：觀賞。

山龍眼屬 *Helicia* Lour.

小果山龍眼 (越南山龍眼) Cochinchina *Helicia*

***Helicia cochinchinensis* Lour.**

習性：喬木。花期：6-10 月；果期：11 月至翌年 3 月。

產地：柏架山、跑馬地、林村。生於山坡或林緣。

分佈：廣東廣西、湖南、湖北、江西、福建、浙江、臺灣、雲南、四川。越南、日本。

用途：種子含澱粉，但有毒。

廣東山龍眼 Kwangtung Helicia

†*Helicia kwangtungensis* W. T. Wang

習性：喬木。

產地：大帽山、大嶼山。生於山坡混交林中。

分佈：廣東、廣西、湖南、江西、福建等地。

網脈山龍眼 Reticulate Helicia

Helicia reticulata W. T. Wang

習性：喬木或灌木。

產地：香港仔、爛泥灣、八仙嶺、梧桐寨、大嶼山。生於山坡或溝谷疏林中。

分佈：華東、華南及西南。

用途：種子含澱粉，但有毒。

澳洲堅果屬 *Macadamia* F. Muell.

澳洲堅果 Queensland Nut

**Macadamia ternifolia* F. Muell.

習性：喬木。

產地：嘉道理農場、大龍有栽培。

分佈：廣東、海南、雲南、臺灣有栽培。原產澳大利亞，現世界各熱帶地區有引種。

用途：食用。

188. 川苔草科 Podostemaceae

飛瀑草屬 *Cladopus* H. Moll.

飛瀑草

†*Cladopus nymani* H. Moll.

習性：水生草本。花果期：5月。

產地：大帽山。生於溪流石上。

分佈：海南、廣東及福建。亞洲東部及東南部。

189. 小二仙草科 Haloragidaceae

小二仙草屬 *Haloragis* J. R. er G.
Forst.

黃花小二仙草 Chinese Seaberry

Haloragis chinensis (Lour.) Merr.

習性：草本。花期：5-8月；果期：7-9月。

產地：香港各地。生於荒山沙質草地。

分佈：我國西南部至東部。越南、馬來西

亞、印度尼西亞和澳大利亞。

小二仙草 Smallflower Seaberry

Haloragis micrantha R.Br.

習性：草本。花期：5-7月；果期：6-10月。

產地：大東山。生於荒山草地上。

分佈：長江流域以南各省區。亞洲東南部和大洋洲。

雜屬 *Myriophyllum* L.

四蕊雜 Fourstamen Parrotfeather

†*Myriophyllum tetrandrum* Roxb..

習性：草本。花果期：3月。

產地：沙角尾。生於淺水塘。

分佈：海南。印度、越南。

雜草 Parrotfeather.

†*Myriophyllum spicatum* L.

習性：草本。花果期：4-8月。

產地：西貢。生於淺水塘中。

分佈：我國南北各省區。廣佈於全球。

用途：魚餌。

192. 千屈菜科 Lythraceae

水莧菜屬 *Ammannia* L.

耳基水莧 Sand *Ammannia*

†*Ammannia arenaria* H. B. & K. (*Ammannia senegalensis* auct. non. DC.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：草本。花果期：8-12月。

產地：沙田、坪洲、廈村。生於濕地上、水稻田中。

分佈：廣東、福建、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、河北、陝西、甘肅、雲南。廣佈於全球熱帶地區。

水莧菜 (細葉水莧) Common *Ammannia baccifera* L.

習性：草本。花期：8-10月；果期：9-12月。

產地：南丫島。生於水田或濕地上。

分佈：華東、華中、華南、西南各省區。越南、印度、菲律賓、馬來西亞、大洋洲及非洲。

多花水莧 Manyflower Ammannia

Ammannia multiflora Roxb. (*Ammannia sengalensis* auct. non Lam.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：草本。花果期：7-9月。
產地：掃桿埔。生於濕地或稻田中。
分佈：我國南部各省區。廣佈於、歐洲、亞洲、非洲及大洋洲。

薄瓣節節菜 Thinpetal Rotala

Ammannia pentandra (Rotb.) Blatt. (*Ammannia leptopetala* auct. non. Koehne: Check List HK Pl. 1993.)

習性：草本。花果期：7月。
產地：香港。
分佈：廣東、福建、江蘇、廣西、貴州、雲南。亞洲東部、南部、阿富汗、印度尼西亞、菲律賓和日本。

萼距花屬 *Cuphea* Adans. ex P. Br.

細葉萼距花 False Heather

†***Cuphea hyssopifolia** H. B. & K.

習性：灌木。花果期：7-8月。
產地：庭園或公園栽培。
分佈：原產南美洲。
用途：觀賞。

黏毛萼距花 Petioled Cuphea

†***Cuphea petiolata** (L.) Koehne

習性：灌木。花期：7-8月。
產地：栽培。
分佈：原產美洲。
用途：觀賞。

火紅萼距花（雪茄花） Cigan flower.

†***Cuphea platycentra** Lemarie (*Cuphea ignea* A. DC.)

習性：灌木。花期：7-8月。
產地：庭園或公園栽培。
分佈：原產墨西哥。
用途：觀賞。

麗薇屬 *Lafoenisia* Vand.

麗薇（萊浮樹） Vandell *Lafoenisia*

**Lafoenisia vandelliana* Cham. & Schlecht.

習性：灌木。花期：7-8月。
產地：庭園或公園栽培。
分佈：原產巴西和巴拉圭。
用途：觀賞。

紫薇屬 *Lagerstroemia* L.

廣東紫薇 Ford Crapemyrtle.

Lagerstroemia fordii Oliv. & Koehne

習性：喬木。花期：6-10月；果期：8-10月。
產地：黃竹坑、大潭、鶴咀、香港仔、聶高信山、薄扶林、跑馬地、大嶼山。生於山地疏林中。
分佈：廣東、福建。

紫薇 Common Crapemyrtle

***Lagerstroemia indica** L.

習性：灌木或小喬木。花期：6-9月；果期：9-12月。
產地：庭園及公園栽培。生於肥沃濕潤的土地上。
分佈：華東、華南、華中及西南各省均有生長或栽培。原產亞洲，現廣植於熱帶地區。

大花紫薇（洋紫薇） Queen Crapemyrtle

***Lagerstroemia speciosa** (L.) Pers.

習性：大喬木。花期：5-7月；果期：10-11月。
產地：公園栽培。
分佈：廣東、廣西、福建均有栽培。斯里蘭卡、印度、馬來西亞、越南及菲律賓。
用途：觀賞、材用、藥用。

南紫薇 South Crapemyrtle

Lagerstroemia subcostata Koehne

習性：落葉喬木或灌木。花期：6-8月；果期：7-10月。
產地：香港仔。生於林緣、溪邊。
分佈：廣東、廣西、湖南、湖北、江西、福建、浙江、臺灣、江蘇、安徽、四川、青海。日本(琉球群島)。

散沫花屬 *Lawsonia* L.

散沫花 (指甲花) *Henna*

**Lawsonia inermis* L.

習性：灌木。花期：6-10月；果期：12月。

產地：庭園或公園栽培。

分佈：廣東、廣西、雲南、福建、江蘇、浙江等省區有栽培。亞洲及北非。

用途：觀賞、香料、染料。

節節菜屬 *Rotala* L.

異葉節節菜 *Diverseleaf Rotala*

†*Rotala diversifolia* Koehne

習性：草本。花期：11月。

產地：大龍。生於水旁濕地上。

分佈：海南、廣西。越南、老撾、泰國。

節節菜 *Indian Rotala*

Rotala indica (Willd.) Koehne

習性：草本。花期：9-10月；果期：10月至翌年4月。

產地：跑馬地、新圍、沙咀、觀塘、大浪、大嶼山。生於稻田或濕地上。

分佈：廣東、廣西、湖南、江西、福建、浙江、江蘇、安徽、湖北、陝西、四川、貴州、雲南。印度、斯里蘭卡、印度尼西亞、菲律賓、中南半島、日本、俄羅斯。

圓葉節節菜 *Roundleaf Rotala*

Rotala rotundifolia (Buch.-Ham. ex Roxb.) Koehne

習性：草本。花果期：12月至翌年6月。

產地：黃竹坑、沙田、大帽山、西貢、大嶼山。生於水田或潮濕地上。

分佈：廣東、廣西、福建、臺灣、浙江、江西、湖南、湖北、四川、貴州、雲南。印度、馬來西亞、斯里蘭卡、中南半島及日本。

蝦仔花屬 (五福花屬) *Woodfordia* Salisb.

蝦仔花 *Shrubby Woodfordia*

†**Woodfordia fruticosa* (L.) Kurz

習性：灌木。花期：3-5月。

產地：公園栽培。

分佈：廣東、廣西、雲南。越南、緬甸、印度、斯里蘭卡、印度尼西亞及馬達加斯加。

用途：觀賞、藥用。

197. 瑞香科 *Thymelaeaceae*

土沉香屬 *Aquilaria* Lam

土沉香 (牙香樹, 白木香) *Incense Tree*

Aquilaria sinensis (Lour.) Gilg.

習性：常綠喬木。花期：4月；果期：7月。

產地：香港各地。生於村邊風水林中。

分佈：海南、廣東、廣西、臺灣、雲南。

用途：藥用。

瑞香屬 *Daphne* L.

小葉瑞香 *Champion's Daphne*

Daphne championii Benth.

習性：半落葉灌木。花期：2-3月。

產地：紫羅蘭山、馬鞍山、大東山。生於林緣、山坡灌叢中。

分佈：廣東、廣西、湖南、江西福建。

白瑞香 *Papery Daphne*

Daphne papyracea Wall.

習性：常綠灌木。花期：2-3月。

產地：大帽山、大東山、鳳凰山。生於山谷林緣。

分佈：廣東、廣西、雲南、貴州、四川、湖北、湖南、江西、福建。

用途：觀賞。

堯花屬 *Endl.*

了哥王 *Indian Wikstroemia*

Wikstroemia indica (L.) C. A. May

習性：常綠灌木。花期：3-4月。

產地：香港各地。生於山坡灌叢，路邊。

分佈：長江以南各省。越南至印度等地。

用途：藥用。

北江堯花 *Chinese Wikstroemia*

Wikstroemia monnula Hance (*Wikstroemia chinensis* auct. non Meisn.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：落葉灌木。花期：4月。
產地：馬鞍山、大東山、鳳凰山。生於疏林下、灌叢中。
分佈：廣東、廣西、貴州、湖南、浙江。

細軸蕘花 Noding *Wikstroemia*

Wikstroemia nutans Champ.

習性：常綠灌木。花期：1-4月。
產地：香港各地。生於疏林下、灌叢中。
分佈：廣東、廣西、湖南、福建。

199. 桃金娘科 *Myrtaceae*

肖蒲桃屬 *Acmena* DC.

肖蒲桃 *Acuminate Acmena*

Acmena acuminatissima (Blume) Merr. & Perry

習性：喬木。花期：7-10月。
產地：扯旗山。
分佈：廣東和廣西。印度、中南半島、菲律賓、馬來西亞和印度尼西亞。
用途：材用、食用。

崗松屬 *Baeckea* L.

崗松 *Swarf Mountain Pine*

Baeckea frutescens L.

習性：喬木。花期：夏秋。
產地：香港各地常見。生於灌叢或草坡。
分佈：福建、廣東、廣西及江西。熱帶亞洲至澳大利亞。
用途：藥用、芳香油、栲膠。

紅千層屬 *Callistemon* R. Br.

松葉紅千層 *Green Bottlebrush*

****Callistemon pinifolius*** Sweet

習性：常綠灌木。花期：6月。
產地：栽培。
分佈：原產澳大利亞。
用途：觀賞。

紅千層 *Rigid Bottle Brush*

Callistemon rigidus R. Br. (*Callistemon coccineus* F. Muell.)

習性：喬木。花期：6-8月。
產地：園林及公園栽培。

分佈：原產澳大利亞。廣東和廣西也有栽培。

用途：庭園綠化樹種。

串錢柳 *Tall Bottle-brush*

****Callistemon viminalis*** G. Don

習性：喬木。花期：4月。
產地：栽培。
分佈：原產澳大利亞。
用途：庭園綠化。

水翁屬 *Cleistocalyx* Blume

水翁 *Lidded Cleistocalyx*

Cleistocalyx operculatus (Roxb.) Merr. & Perry

習性：喬木。花期：5-6月。
產地：香港各地。喜生於水邊。
分佈：華南和雲南。中南半島、印度、菲律賓、馬來西亞、印度尼西亞和澳大利亞。
用途：固堤及水旁綠化、食用、藥用、染料。

子楝屬 *Decaspermum* J. R. & G. Forst.

桑枝米碎葉 *Slender Decaspermum*

Decaspermum gracilentum (Hance) Merr. & Perry

習性：喬木。花期：3-5月。
產地：新界。生於林中。
分佈：廣東、廣西和臺灣。越南。

桉屬 *Eucalyptus* L'Herit.

赤桉 *River Red Gum*

****Eucalyptus camaldulensis*** Dehnh.

習性：喬木。花期：12月至翌年8月。
產地：公園及行道旁栽培。
分佈：中國南部至西南部有栽培。原產澳大利亞。
用途：材用、芳香油、栲膠。

檸檬桉 *Lemon-scented Gum*

****Eucalyptus citriodora*** Hook. f.

習性：喬木。花期：4-9月。
產地：公園及行道旁有種植。
分佈：華南有栽培。原產澳大利亞。

用途：材用、藥用、綠化。

窿緣桉

†***Eucalyptus exserta** F. v. Muell.

習性：喬木。花期：3月。

產地：公園及行道旁有種植。

分佈：華南有栽培。原產澳大利亞。

用途：材用、藥用。

大葉桉 Swamp Manogany

***Eucalyptus robusta** Smith

習性：喬木。花期：4-9月。

產地：公園及行道旁有種植。

分佈：華南和西南地區有栽培。原產澳大利亞。

用途：材用、芳香油、藥用、綠化。

細葉桉 Forest Red Gum

***Eucalyptus tereticornis** J. E. Smith

習性：喬木。花期：6-8月。

產地：公園及行道旁有種植。

分佈：華南和西南地區有栽培。原產澳大利亞。

毛葉桉 Cadaga

***Eucalyptus torelliana** F. v. Muell.

習性：喬木。花期：10月。

產地：公園及行道旁有種植。栽培。

分佈：廣東、廣西和雲南有栽培。原產澳大利亞。

用途：綠化。

番櫻桃屬 *Eugenia* L.

紅果仔 Surinam Cherry

***Eugenia uniflora** L.

習性：喬木。花期：春季。

產地：栽培。

分佈：華南有少量栽培。原產巴西。

用途：食用、觀賞。

維氏紅果仔 Weeping Lilly-Pilly

***Eugenia ventenatii** Benth.

習性：常綠灌木。花期：5月。

產地：栽培。

分佈：原產澳大利亞。

用途：觀賞。

澳洲茶屬 *Leptospermum* Forster & Forster f.

掃帚葉澳洲茶 Bloom Tea Tree

†***Leptospermum scoparium** Forst. & Forst.
f. (*Leptospermum flavescens* var.
citriodorum F. M. Bailey)

習性：喬木。花期：6月；果期：8月。

產地：公園栽培。

分佈：原產澳大利亞。

用途：觀賞、材用。

紅膠木屬 *Lophostemon* Schott

紅膠木 Brisbane Box

***Lophostemon confertus** (R. Br.) P. G.
Wilson & J. T. Waterhouse (*Tristania*
conferta R. Br.)

習性：喬木。花期：5-7月。

產地：香港各地常見種植。

分佈：海南和廣東栽培。原產澳大利亞。

用途：造林、作行道樹或庭園綠化。

黃花紅膠木 Brisbane Box

†***Lophostemon suaveolens** (Soland. ex
Gaertn.) P. G. Wilson & J. T.
Waterhouse

習性：喬木。花期：5-7月。

產地：公園種植。

分佈：原產澳大利亞。

用途：庭園綠化。

白千層屬 *Melaleuca* L.

下垂白千層 Bracelet Honey Myrtle

***Melaleuca armillaris** Sm.

習性：灌木至小喬木。花期：3月。

產地：栽培。

分佈：原產澳大利亞。

用途：觀賞。

***Melaleuca genistifolia** Smith

習性：常綠灌木。花期：4月。

產地：栽培。

分佈：原產澳大利亞。

用途：觀賞。

***Melaleuca nodosa** Smith

習性：常綠灌木。花期：4 月。

產地：栽培。

分佈：原產澳大利亞。

用途：觀賞。

小葉白千層 Small leaved Melaleuca

***Melaleuca parviflora** Lindl.

習性：常綠灌木。花期：8 月。

產地：栽培。

分佈：原產澳大利亞。

用途：觀賞。

白千層 Cajeput-tree

***Melaleuca quinquenervia** (Cav.) S. T. Blake

(*Melaleuca leucadendron* auct. non L.:

Check List HK Pl. 1993.)

習性：喬木。花期：11 月。

產地：香港各地常見種植。

分佈：原產澳大利亞。熱帶亞洲和大洋洲廣為栽培。

用途：植林，行道、庭園綠化、芳香油、填充物。

番石榴屬 *Psidium* L.

番石榴 Guava

***Psidium guajava** L.

習性：喬木。花期：8-9 月。

產地：栽培。

分佈：雲南、廣西、廣東和福建有栽培或逸生。原產南美洲。

用途：食用、芳香油、香料、材用。

草莓番石榴 Strawberry Guava

Psidium cattleianum var. **littorale** (Raddi)

Forsberg

習性：喬木。花期：5 月；果期：12 月至翌年 2 月。

產地：栽培。

分佈：中國南部有栽培。原產巴西。

用途：食用、觀賞。

桃金娘屬 *Rhodomyrtus* (DC.) Reich.

桃金娘 (崗檢) Rose Myrtle

Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Hassk.

習性：喬木。花期：4-5 月。

產地：香港各地常見。生於灌叢及草坡。

分佈：臺灣、福建、海南、廣東、廣西、湖南、貴州和雲南。中南半島、菲律賓、日本、斯里蘭卡、馬來西亞及印度尼西亞。

用途：食用及釀酒、藥用、栲膠、染料。

白心膠屬 *Syncarpia* Ten.

白心膠 Turpentine Wood

***Syncarpia glomulifera** (Sm.) Nied.

習性：喬木。

產地：植林或公園種植。

分佈：原產澳大利亞。

用途：庭園綠化、材用、抗白蟻。

蒲桃屬 *Syzygium* Gaertn.

赤楠 Box-leaf Syzygium

Syzygium buxifolium Hook. & Arn. (*Eugenia sinensis* Hemsl.)

習性：灌木或小喬木。花期：6-8 月。

產地：香港各地。生於灌叢和次生林中。

分佈：長江以南地區。越南和日本。

用途：材用、果用、釀酒。

灶地烏骨木 Champion Syzygium

Syzygium championii (Benth.) Merr. & Perry
(*Acmena championii* Benth.; *Eugenia championii* Hemsl.)

習性：灌木至小喬木。花期：8-11 月。

產地：扯旗山、柏架山、大潭、深水灣、鶴咀、八仙嶺、梧桐寨、西貢。生於次生林中。

分佈：華南、雲南、臺灣。中南半島、馬來西亞、印度、印度尼西亞、澳大利亞。

海南蒲桃 Jambolan Plum

***Syzygium cuminii** (L.) Skeels

習性：喬木。花期：2-3 月。

產地：香港島、林村。栽培。

分佈：雲南、華南、福建和臺灣。印度、斯里蘭卡、越南、馬來西亞、印度尼西亞和太平洋島嶼。

用途：行道樹、庭園綠化。

韓氏蒲桃 (紅鱗蒲桃) *Hance Syzygium*

Syzygium hancei Merr. & Perry

習性：喬木。花期：7-9月。

產地：香港各地。常見於次生林中。

分佈：華南。越南。

用途：材用、栲膠。

蒲桃 *Rose Apple*

****Syzygium jambos*** (L.) Alston

習性：喬木。花期：3-4月；果期：5-6月。

產地：引種栽培，多見於村邊或風水林中。

分佈：中國西南部至臺灣。中南半島、馬來西亞和印度尼西亞。

用途：庭園綠化、固堤防風、食用、藥用。

山蒲桃 *Levine Syzygium*

Syzygium levinei (Merr.) Merr. & Perry

習性：喬木。花期：7-9月。

產地：香港各地。生於林中。

分佈：廣西、廣東。越南。

用途：材用。

香花蒲桃 *Fragrant Syzygium*

Syzygium odoratum (Lour.) DC.

習性：喬木。花期：6-8月。

產地：新界。

分佈：廣東、廣西和海南；越南。

紅枝蒲桃 *Rehder Syzygium*

†***Syzygium rehderianum*** Merr. & Perry

習性：小喬木。花期：7月；果期：11月。

產地：馬鞍山、大嶼山等地。生於次生林或風水林中。

分佈：廣東和廣西。

用途：材用。

洋蒲桃 *Samarange Syzygium*

****Syzygium samarangense*** (Blume) Merr. & Perry

習性：喬木。花期：3-4月；果期：5-6月。

產地：栽培。

分佈：廣東、海南有栽培。原產馬來西亞和印度。

用途：行道、庭園綠化、食用。

200. 安石榴科 *Punicaceae*

安石榴屬 *Punica* L.

安石榴 *Pomegranate*

****Punica granatum*** L.

習性：灌木或小喬木。

產地：庭園及公園有栽種。

分佈：原產巴爾幹半島至伊朗及其鄰近地區，現全世界溫帶和熱帶地區均有種植。

用途：食用。

201. 柳葉菜科 *Onagraceae*

丁香蓼屬 *Ludwigia* L.

水龍 *Water-dragon*

Ludwigia adscendens (L.) Hara

習性：多年生草本。花期：5-8月。

產地：荔枝角、大埔、林村、梅子林、烏蛟騰、大嶼山。生於池塘、沼澤和潮濕地。

分佈：廣東、廣西、雲南、四川、江西、浙江。印度、中南半島、馬來西亞和澳大利亞北部。

毛草龍 *Primrose Willow*

Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven
(*Oenothera octovalvis* Jacq.)

習性：多年生草本。花期：7-10月。

產地：香港島、大埔、米埔、上水、西貢、大嶼山、蒲台島。生於水田邊、溝邊、潮濕地。

分佈：廣東、廣西、雲南江西、臺灣。廣佈於世界熱帶地區。

細花丁香蓼

Ludwigia perennis L. (*Jussiaea caryophylla* Lam.)

習性：一年生草本。花期：8-10月。

產地：沙田、大帽山。生於水稻田和低濕地。

分佈：中國南北各地。日本、印度至馬來西亞。

丁香蓼

Ludwigia prostrata Roxb.

習性：一年生草本。花期：8-10月。

產地：大欖涌。生於溝邊沼澤和潮濕地。

分佈：中國南北各地。日本、印度至馬來西亞。

月見草屬 *Oenothera* L.

海濱月見草

†**Oenothera drummondii** Hook. (*Oenothera littoralis* Schlecht.)

習性：多年生草本。花期：7-11月。

產地：西貢大灣。生於海邊沙地。

分佈：廣東、福建。廣佈於熱帶地區。

203. 野牡丹科 Melastomataceae

椴果花屬 *Barthea* Hook. f.

椴果花 (芭茜) South China *Barthea*

Barthea barthei (Hance) Krass.

習性：灌木。花果期：10月至翌年5月。

產地：扯旗山、大帽山、馬鞍山、烏蛟騰、大嶼山。常生於山坡次生林、山澗附近。

分佈：湖南、廣西、廣東、福建、臺灣。

柏拉木屬 *Blastus* Lour.

柏拉木 Cochinchina *Blastus*

Blastus cochinchinensis Lour.

習性：灌木。花期：6-8月；果期：10-12月。

產地：扯旗山、梧桐寨、烏蛟騰、荔枝窩、新娘潭、大東山。生於次生於林下。

分佈：雲南、廣西、廣東、福建、臺灣。印度至越南。

用途：藥用、栲膠。

少花柏拉木 Few Flower *Blastus*

Blastus pauciflorus (Benth.) Merr.

習性：灌木。花期：7月；果期：10月。

產地：扯旗山、馬鞍山和大帽山。生於次生

林中。

分佈：廣東。

異藥花屬 *Fordiophyton* Stapf

短莖異藥花

Fordiophyton brevicaule C. Chen

習性：草本。花期：6月。

產地：馬鞍山、龍珠潭、南涌。生於次生於林下或陰濕的地方。

分佈：廣東。

野牡丹屬 *Melastoma* L. f.

多花野牡丹 Many Flower *Melastoma*

†**Melastoma affine** D. Don

習性：灌木。花期：2-5月；果期：8-12月。

產地：大帽山、粉嶺、黃龍坑。生於山坡次生於林下或疏林下。

分佈：雲南、貴州、廣東和臺灣以南等地。中南半島、菲律賓至澳大利亞。

用途：藥用。

野牡丹 Common *Melastoma*

Melastoma candidum D. Don

習性：灌木。花期：5-7月；果期：10-12月。

產地：香港各地。生於灌叢和草坡中。

分佈：雲南、廣西、廣東、福建和臺灣。印度。

用途：藥用、栲膠。

地蒼 Twelve Stamen *Melastoma*

Melastoma dodecandrum Lour.

習性：匍匐草本。花期：5-7月；果期：7-9月。

產地：香港各地。生於山坡次生於林下或灌叢中。

分佈：貴州、湖南、廣東和廣西。越南。

用途：藥用、食用(果)。

細葉野牡丹 Intermediate *Melastoma*

Melastoma intermedium Dunn

習性：小灌木或灌木。花期：7-9月；果期：10-12月。

產地：大帽山、粉嶺。生於山坡草叢中。

分佈：貴州、廣東、廣西、福建、臺灣。

毛萼 Bloodred Melastoma

Melastoma sanguineum Sims

習性：大灌木。花果期：幾全年，通常 8-10 月。

產地：香港各地。生於溝邊、灌叢或矮灌叢中。

分佈：廣東和廣西。印度、馬來西亞和印度尼西亞。

用途：藥用、食用。

谷木屬 **Memecylon** L.

谷木 Privet Leaf Memecylon

Memecylon ligustrifolium Champ.
(*Memecylon scutellatum* Hook. & Arn.)

習性：小喬木。花期：5-8 月；果期：12 月至翌年 2 月。

產地：香港各地。生於次生林中。

分佈：廣東、廣西、雲南。

黑葉谷木 Black Leaf Memecylon

Memecylon nigrescens Hook. & Arn.

習性：小喬木。花期：5-6 月；果期：12 月至翌年 2 月。

產地：香港各地。生於次生林中。

分佈：廣東、越南。

金錦香屬 **Osbeckia** L.

金錦香 Chinese Osbeckia

Osbeckia chinensis L.

習性：直立草本或亞灌木。花期：7-9 月；果期：9-11 月。

產地：香港各地。生於山坡地或草叢。

分佈：長江以南各省區。日本、越南至澳大利亞。

用途：藥用。

野海棠屬 **Phyllagathis** Blume

葉底紅 Ford Metalleaf

Phyllagathis fordii (Hance) C. Chen
[*Bredia fordii* (Hance) Diels]

習性：小灌木、亞灌木或近草本。花期：6-8 月；果期：8-10 月。

產地：香港曾有記錄。生於溪邊、水邊、路

邊土層肥厚的地方。

分佈：貴州、廣西、廣東、浙江、江西、福建。

蜂斗草屬 **Sonerila** Roxb.

蜂斗草 Canton Sonerila

Sonerila cantonensis L.

習性：草本。花期：9-10 月；果期：12 月至翌年 2 月。

產地：屏風山、龜頭嶺。生於林下。

分佈：雲南、廣西、廣東、福建。

用途：藥用。

三蕊草 Shortanther Sonerila

Sonerila tenera Royle

習性：草本。花期：8-10 月；果期：10-12 月。

產地：歌賦山。生於林下。

分佈：雲南、廣西、廣東。印度、菲律賓。

204. 使君子科 **Combretaceae**

風車子屬 **Combretum** Leefl.

風車子

Combretum alfredii Hance

習性：木質藤本。

產地：燕岩、雞公嶺。生於林中。

分佈：廣東、廣西、湖南、江西。

欖李屬 **Lumnitzera** Willd.

欖李 **Lumnitzera**

Lumnitzera racemosa Willd.

習性：灌木或小喬木。花期：12 月至翌年 3 月。

產地：泥涌、企嶺下、榕樹澳、船灣、汀角、大嶼山。生於紅樹林中。

分佈：華南、海南和臺灣。熱帶亞洲、非洲、澳大利亞。

用途：材用。

使君子屬 **Quisqualis** L.

使君子 Rangoon Creeper

Quisqualis indica L.

習性：攀援狀灌木。花期：初夏；果期：秋末。

產地：公園和庭園栽植。

分佈：長江以南各地區。印度、緬甸、菲律賓。

用途：觀賞；藥用。

欖仁樹屬 *Terminalia* L.

阿江欖仁 *Arjuna Terminalia*

**Terminalia arjuna* Bedd.

習性：喬木。

產地：公園和庭園栽植。

分佈：印度。

用途：材用、行道、庭園綠化。

欖仁樹 *Indian Almond*

**Terminalia catappa* L.

習性：大喬木。花期：3-6 月；果期：7-9 月。

產地：庭園或行道旁栽植。

分佈：臺灣、海南、廣東、雲南。中南半島、馬來西亞、印度、波利尼西亞及南美。

用途：作行道樹、庭園綠化、材用、油料、染料。

訶子 *Medicine Terminalia*

**Terminalia chebula* Retz..

習性：喬木。花期：5 月；果期：7-9 月。

產地：栽種。

分佈：雲南、廣東和廣西常見栽培。中南半島、泰國、緬甸、馬來西亞、尼泊爾、印度。

用途：藥用、材用、鞣料。

205. 紅樹科 *Rhizophoraceae*

木欖屬 *Bruguiera* Lam.

木欖 *Many-petaled Mangrove*

Bruguiera gymnorhiza (L.) Sav.

習性：喬木或灌木。花果期：幾全年。

產地：石澳、西貢、橋咀洲、榕樹澳、大埔、荔枝灣、船灣、米埔、大嶼山。生於淺海和河流出口沖積帶的鹽灘。

分佈：福建、臺灣、廣東、海南、廣西。非洲東南部、印度、斯里蘭卡、馬來西亞、泰國、澳大利亞及波利尼西亞。

竹節樹屬 *Carallia* Roxb.

竹節樹 *India carallia*

Carallia brachiata (Lour.) Merr.

習性：喬木。花期：9-10 月；果期：1 月。

產地：香港各地。生於丘陵灌叢。

分佈：廣東、廣西。馬達加斯加、斯里蘭卡、印度、緬甸、泰國、越南、馬來西亞至澳大利亞。

秋茄屬 *Kandelia* Wight & Arn.

秋茄樹

Kandelia candel (L.) Druce

習性：灌木或小喬木。花果期：全年。

產地：香港各地。生於淺海和河流出口沖積帶的鹽灘。

分佈：廣東、海南、廣西、福建、臺灣。印度、緬甸、泰國、越南、馬來西亞、日本琉球群島南部。

206. 八角楓科 *Alangiaceae*

八角楓屬 *Alangium* Lam.

八角楓

Alangium chinense (Lour.) Harms

習性：落葉喬木或灌木。

產地：香港各地。生於疏林中。

分佈：華南、華東、華中、西南。東南亞、非洲東部。

207. 山茱萸科 *Cornaceae* (incl. *Nyssaceae*)

桃葉珊瑚屬 *Aucuba* Thunb.

桃葉珊瑚 *Chinese Aucuba*

Aucuba chinensis Benth.

習性：常綠小喬木或灌木。花期：1-2 月；果熟時達翌年 2 月。

產地：聶高信山、馬鞍山、大帽山、大東山、鳳凰山。生於常綠闊葉林中。

分佈：臺灣、福建、廣東、海南、廣西。

喜樹屬 *Camptotheca* Decne.

喜樹

†**Camptotheca acuminata* Decne.

習性：落葉喬木。花期：

產地：栽培。

分佈：廣東、廣西、雲南、貴州、四川、湖北、湖南、江西、浙江、福建。

用途：藥用、材用。

四照花屬 *Dendrobenthamia* Hutch.

香港四照花 *Hongkong Dogwood*

Dendrobenthamia hongkongensis (Hemsl.) Hutch.

習性：常綠喬木或灌木。花期：5-6 月；果期：11-12 月。

產地：柏架山、扯旗山、城門、大帽山、鳳凰山。生於濕潤山谷密林或混交林中。

分佈：浙江、江西、湖南、福建、廣東、廣西、貴州、雲南、四川。

211. 鐵青樹科 *Olacaceae*

青皮樹屬 *Schoepfia* Schreb.

華南青皮木（青皮樹） *Schoepfia*

Schoepfia chinensis Gardn. & Champ. (*Schoepfia jasminodora* auct. non Gardn. & Champ.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：小喬木。花期：2-3 月；果期：4 月。

產地：扯旗山、大帽山、大東山、薄刀岩。生於山谷、溪邊。

分佈：雲南、廣東、海南、廣西、湖南、江西、福建、臺灣。

212. 山柑子科 *Opiliaceae*

山柑藤屬 *Cansjera* Juss.

山柑藤（山柑）

Cansjera rheedii J. F. Gmel.

習性：攀援狀灌木。花期：11 月；果期：3 月。

產地：香港仔、深水灣、新界、大嶼山。生於山地疏林或灌叢。

分佈：廣東、廣西、雲南。亞洲南部和東南部。

213. 檀香科 *Santalaceae*

寄生藤屬 *Dendrotrophe* Miq.

寄生藤

Dendrotrophe frutescens (Benth.) Danser

習性：木質藤本。花期 12 月至翌年 2 月，果期 3—5 月。

產地：大帽山、大嶼山、香港仔、大嶼山昂坪、芬梨道、薄扶林水塘道、沙頭角、赤柱。生於灌叢。

分佈：福建、海南、廣東、廣西、雲南。越南。

用途：全株供藥用，外敷治跌打刀傷。

百蕊草屬 *Thesium* L.

百蕊草

Thesium chinense Turcz.

習性：多年生草本。花期：4—5 月；果期：6—7 月。

產地：大嶼山。生於山坡草地。

分佈：我國大部分省區均產。日本、朝鮮。

用途：全草有清熱解毒、解暑之功效。

215. 桑寄生科 *Loranthaceae*

離瓣寄生屬 *Helixanthera* Lour.

離瓣寄生（五瓣寄生）

Helixanthera parasitica Lour.

習性：灌木。花期 2—4 月。

產地：粉嶺、八仙嶺、烏蛟騰、照鏡潭。生於林中，寄生於殼斗科植物、樟樹、木荷上。

分佈：福建、海南、廣東、廣西、貴州、雲南、西藏。亞洲東南部。

用途：枝葉入藥，有祛風濕等功效。

鞘花屬 *Macrosolen* (Blume) Reichb.

鞘花（苞花寄生）

Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Van Tiegh.

習性：灌木。花期 3—4 月。

產地：大埔滘、汀角路、沙頭角

分佈：福建、海南、廣東、廣西、貴州、雲南、西藏、四川。常寄生於木荷、杉樹上。

用途：全株藥用，有清熱、止咳之功效。

梨果寄生屬 *Scurrula* L.

紅花寄生 *Witches' Broom*

Scurrula parasitica L.

習性：灌木。花期 10—12 月。

產地：深水灣、京士柏、大埔滘、梧桐寨、烏蛟騰、亞媽笏。常寄生於柚、黃皮、油茶樹上。

分佈：海南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、湖南、江西、福建、臺灣。亞洲東南部。

用途：全株入藥，用於治療風濕性關節炎等。

鈍果寄生屬 *Taxillus* Van Tiegh.

廣寄生

Taxillus chinensis (DC.) Danser

習性：灌木。花期幾全年，10—12月尤盛。

產地：香港各地。寄生於油茶、油桐、龍眼等樹上。

分佈：海南、廣東、廣西、福建。亞洲東南部。

用途：全株入藥，稱“廣寄生”，可治風濕痺痛、腰膝酸軟、筋骨無力、胎動不安、高血壓等。

216. 槲寄生科 *Viscaceae*

栗寄生屬 *Korthalsella* Van Tiegh.

栗寄生

†*Korthalsella japonica* (Thunb.) Engler

習性：寄生性亞灌木。花果期幾全年。

產地：馬鞍山。常寄生於殼斗科和山茶科植物上。

分佈：海南、廣東、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、湖北、浙江、福建、臺灣。亞洲東南部、澳大利亞、非洲衣索比亞、馬達加斯加。

槲寄生屬 *Viscum* L.

扁枝槲寄生 *Mistletoe*

Viscum articulatum Burm. f.

習性：亞灌木。花果期幾全年。

產地：京士柏、大帽山、大埔滘、烏蛟騰、照鏡潭。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南。亞洲東南部、澳大利亞。

瘤果槲寄生

Viscum ovalifolium DC. (*Viscum orientale*

auct. non Willd.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：灌木。

產地：跑馬地、蕉坑、大埔滘、元墩下、粉嶺、新娘潭。常寄生於柿樹及柚等果樹上。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南。亞洲東南部。

用途：枝葉入藥，有祛風、止咳、清熱解毒之功效。

218. 蛇菰科

Balanophoraceae

蛇菰屬 *Balanophora* J. R. & G. Forst.

紅菱蛇菰 *Harland's Balanophora*

Balanophora harlandii Hook. f.

習性：寄生草本。花期：9-11月。

產地：香港島、大帽山、馬鞍山、南丫島、吉澳島、東龍島。生於次生於林下。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南。

用途：藥用。

223. 衛矛科 *Celastraceae*

南蛇藤屬 *Celastrus* L.

青江藤 *Chinese Bitter-sweet*

Celastrus hindsii Benth.

習性：藤本。花期：5-7月；果期：7-10月。

產地：香港各地。生於林中。

分佈：西藏、四川、雲南、貴州、湖北、廣西、海南、廣東、湖南、江西、福建。南亞至東南亞。

圓葉南蛇藤

Celastrus kusanoi Hayata (*Celastrus orbiculatus* auct. non Thunb.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：攀援灌木。花期：2-4月；果期：7-10月。

產地：灣仔峽、西貢、大帽山、大欖涌。生於林緣。

分佈：海南、臺灣。

獨子藤（單子南蛇藤） *Bentham's*

bitter-sweet

Celastrus monospermus Roxb. (*Celastrus benthamii* Rehd. & Wils.)

習性：藤本。花期：4-6 月；果期：6-9 月。
產地：香港各地。生於林中。
分佈：雲南、貴州、海南、廣東、福建。印度、越南、緬甸、巴基斯坦。

福木屬 *Elaeodendron* Jacq.

福木 False olive

***Elaeodendron orientale** Jacq. [*Cassine orientalis* (Jacq.) Kuntze]

習性：灌木或小喬木。
產地：栽培。
分佈：原產毛里裘斯，
用途：觀賞。

衛矛屬 *Euonymus* L.

紫刺衛矛 Purple rickle *Euonymus*

Euonymus angustatus Sprague

習性：藤狀灌木。花期：2-4 月；果期：7-11 月。
產地：鶴咀、西貢、茅坪、大埔、大帽山、梧桐寨、大嶼山。生於山谷中。
分佈：廣西、廣東、湖南。

流蘇衛矛 Fimbriate petal *Euonymus*

Euonymus gibber Hance

習性：灌木；花期：6 月；果期：11 月。
產地：動植物公園。
分佈：海南、臺灣。

光葉衛矛 Glabrous-leaved *Euonymus*

***Euonymus glaber** Roxb.

習性：灌木。
產地：栽培。
分佈：原產印度。

常春衛矛 Ivylike *Euonymus*

Euonymus hederaceus Champ. ex Benth.

習性：藤狀灌木。花期：6 月；果期：8 月。
產地：扯旗山、大帽山、馬鞍山。生於疏林中。
分佈：海南、廣東、廣西、貴州、雲南、湖南、福建、臺灣。

銀邊衛矛 Silver margined *Euonymus*

***Euonymus japonicus** var. **albomarginatus**
T. Moort

習性：灌木。花期：6-7 月；果期：9-10 月。
產地：栽培。
分佈：原產日本。華南各地栽培。
用途：綠籬。

長葉衛矛 Long-leaved *Euonymus*

Euonymus kwangtungensis C. Y. Cheng
(*Euonymus longifolius* Champ., non Modic. 1782.)

習性：灌木。花期：2-6 月；果期：翌年 1 月。
產地：跑馬地、摩理臣山、馬鞍山、梅子林。生於林中。
分佈：廣東。

疏花衛矛 Loose-flowered *Euonymus*

Euonymus laxiflorus L.

習性：灌木。花期：3-6 月；果期：7-11 月。
產地：香港各地。生於闊葉林中或林緣。
分佈：四川、雲南、貴州、廣西、海南、廣東、湖南、臺灣。
用途：藥用。

中華衛矛 Chinese *Euonymus*

Euonymus nitidus Benth. (*Euonymus chinensis* Lindl.)

習性：灌木。花期：3-5 月；果期：6-10 月。
產地：香港各地。
分佈：廣西、廣東、江西、福建。

翅子藤屬 *Loeseneriella* A. C. Smith

程香仔樹 (希藤)

Loeseneriella concina A. C. Smith
[*Loeseneriella obtusifolia* (Roxb.) A. C. Smith; *Hippocrata obtusifolia* Roxb.]

習性：藤本。花期：7 月；果期：9 月。
產地：香港島、獅子山、大嶼山，生於山谷林中。
分佈：廣東、廣西、福建。

假衛矛屬 *Microtropis* Wall.

福建假衛矛 Fokien *Microtropis*

†*Microtropis fokienensis* Dunn

習性：灌木。花期：9月。

產地：花山。生於林中。

分佈：貴州、湖南、廣西、廣東、福建、臺灣。

廣州假衛矛 Broad-leaved *Microtropis*

Microtropis obscurinervia Merr. & Freè (*Microtropis latifolia* Wight)

習性：灌木。果期：9-12月。

產地：扯旗山、歌賦山、薄扶林、奇力山。

分佈：印度。

少脈假衛矛

Microtropis paucinervis Merr. & Chun ex Merr. & Freem.

習性：小喬木。花期：2月。

產地：香港島。生於林中。

分佈：海南、廣東、廣西。

細脈假衛矛 Thin-nerved *Microtropis*

Microtropis reticulata Dunn

習性：灌木。花期：3月。

產地：大帽山、大嶼山。

分佈：廣東。

228. 冬青科 *Aquifoliaceae*

冬青屬 *Ilex* L.

梅葉冬青 Rough-leaved Holly

Ilex asprella Champ.

習性：灌木。花期：夏季；果期：10月。

產地：香港各地。生於疏林中或灌叢中。

分佈：海南、廣東、廣西、江西、福建、臺灣、浙江。

用途：藥用。

凹葉冬青 Champion's Holly

†*Ilex championii* Loes.

習性：小喬木。

產地：馬鞍山、大東山。生於次生林中。

分佈：廣東、廣西、貴州。

沙壩冬青 Shaba Holly

†*Ilex chapaensis* Merr.

習性：喬木。花期：4月；果期：11月。

產地：馬鞍山。生於疏林中。

分佈：海南、廣東、廣西、福建、雲南。

灰冬青 Gray Holly

Ilex cinerea Champ.

習性：灌木或小喬木。花期：3-4月；果期：5-12月。

產地：香港島、九龍山、大坳門、八仙嶺、烏蛟騰、大嶼山。生於次生林中或灌叢中。

分佈：海南、廣東、廣西、江西。

金毛冬青 Denseleaf Holly

†*Ilex dasyphylla* Merr.

習性：喬木。

產地：大東山。生於次生林中。

分佈：廣東、廣西、福建、江西。

榕葉冬青 Fig-leaved Holly

Ilex ficoidea Hemsl.

習性：喬木。花期：3-4月；果期：10-11月。

產地：香港島、大埔滘、大帽山、大嶼山。生於次生林中。

分佈：華南、華中、華東及臺灣。

用途：材用。

細花冬青 Small-flowerd Holly

Ilex graciliflora Champ.

習性：喬木。

產地：香港島、馬鞍山、八仙嶺。生於次生林中。

分佈：廣東、浙江。

青茶冬青（青茶） Hance's Holly

Ilex hanceana Maxim.

習性：小喬木。

產地：香港島。生於疏林中。

分佈：廣東、廣西。

廣東冬青 Kwangtung Holly

Ilex kwangtungensis Merr.

習性：小喬木。花期：5-8 月；果期：9-12 月。

產地：香港島、大帽山、馬鞍山、大埔。生於次生林中。

分佈：海南、廣東、廣西、福建、江西、湖南、貴州、雲南、浙江。

大葉冬青 Large-leaved Holly

†**Ilex latifolia* Thunb.

習性：大喬木。花期：4 月；果期：11 月。

產地：栽培。

分佈：長江以南各省區。日本。

用途：材用、園林綠化樹種。

羅浮冬青 Lohfau Holly

†*Ilex lohfauiensis* Merr.

習性：小喬木。

產地：大帽山、大東山。生於山頂疏林中。

分佈：廣東、廣西、福建、江西、安徽、浙江。

大果冬青 Large-fruited Holly

Ilex macrocarpa Oliv.

習性：喬木。果期：10 月。

產地：烏蛟騰、上禾坑、香港島。生於低海拔次生林中。

分佈：華南、華中、西南、華東。

谷木葉冬青 Memecylonleaved Holly

Ilex memecylifolia Champ.

習性：喬木。果期：10-11 月。

產地：香港島、九龍水塘、浪茄、大嶼山。生於疏林中。

分佈：廣東、廣西、江西、福建。

毛冬青 Downy Holly

Ilex pubescens Hook. & Arn.

習性：灌木。花期：夏、秋季；果期：冬季。

產地：香港各地。生於疏林中或灌叢中。

分佈：海南、廣東、廣西、江西、湖南、安徽、福建、浙江、臺灣。

用途：藥用、造紙膠料。

鐵冬青 Chinese Holly

**Ilex rotunda* Thunb.

習性：喬木。花期：3-4 月；果期：翌年 2-3 月。

產地：栽培。

分佈：長江以南各省區。朝鮮、日本、越南。

用途：藥用、材用、樹皮可作染料。

小果鐵冬青(微果冬青) Small-fruited Holly

Ilex rotunda var. *microcarpa* (Lindl.ex Pax)

S. Y. Hu

習性：喬木。花期：春、夏季；果期：冬季。

產地：香港島、大帽山、大埔滘。生於次生林中。

分佈：長江以南各省區。

用途：藥用、材用、園林綠化樹種。

綠冬青(亮葉冬青) Small-leaved Holly

Ilex viridis Champ. ex Benth.

習性：小喬木。花期：6 月；果期：10 月。

產地：香港島、大帽山、馬鞍山、大埔滘、八仙嶺、大嶼山。生於次生林中或灌叢中。

分佈：長江以南各省區。

229. 茶茱萸科 Icacinaceae

甜果藤屬 *Mappianthus* Hand.-Mazz.

甜果藤 Common *Mappianthus*

†*Mappianthus iodoides* Hand.-Mazz.

習性：木質藤本。花期：4-7 月；果期：7-11 月。

產地：大帽山、嘉道理農場、八仙嶺、大埔滘。生於次生林中。

分佈：海南、廣東、廣西、湖南、福建、雲南、貴州。越南。

用途：藥用。

234. 黃楊科 Buxaceae

黃楊屬 *Buxus* L.

雀舌黃楊

†*Buxus bodinieri* Lévl.

習性：常綠灌木。

產地：南涌、石板潭、鹿頸。生於山谷溪邊。

分佈：秦嶺以南各省區。
用途：觀賞。

匙葉黃楊 Harland's Box

Buxus harlandii Hance

習性：常綠灌木。花期：5月。
產地：烏蛟騰。生於溪邊、疏林下。
分佈：海南、廣東。
用途：觀賞。

黃楊

Buxus sinica (Rhed. & Wils.) Cheng ex M. Cheng (*Buxus microphylla* var. *sinica* Rehd. & Wils.)

習性：常綠灌木。
產地：鶴咀、大潭、大蚊山、蒲台島。生於山谷溪邊灌叢中。
分佈：甘肅、陝西、山東及長江以南各省區。
用途：觀賞。

尖葉黃楊

†***Buxus sinica** subsp. *aemulans* (Rehd. & Wils.) M. Cheng (*Buxus sempervirens* auct. non L.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：常綠灌木。
產地：屏風山、黃龍坑、鳳凰山。生於溪邊。
分佈：長江流域及其以南各地。
用途：觀賞。

野扇花屬 *Sarcococca* Lindl.

長柄野扇花

†**Sarcococca longipetiolata** M. Cheng (*Sarcococca ruscifolia* auct. non Stapf.: Check List HK Pl 1993.)

習性：常綠灌木。花期：秋季。
產地：柏架山。生於溪邊林下。
分佈：廣東、湖南。
用途：觀賞。

236. 攀打科 **Pandaceae**

小盤木屬 *Microdesmis* Hook. f.

小盤木

†**Microdesmis caseariifolia** Planch.

習性：灌木或小喬木。花期：3-9月；果期：7-11月。

產地：凹下。生於疏林下或灌叢中。
分佈：廣東、海南、廣西、雲南。中南半島、馬來半島、菲律賓至印度尼西亞。
用途：藥用。

237. 大戟科 **Euphorbiaceae**

鐵莧菜屬 *Acalypha* L.

鐵莧菜 (朴草) *Acalypha*

Acalypha australis L.

習性：草本。花期：4-12月；果期：4-12月。
產地：扯旗山、粉嶺、上水、元朗。生於荒地中。
分佈：中國除西部高原及乾燥地區外，大部分省區均有分佈。俄羅斯遠東地區、朝鮮、日本、菲律賓、越南、老撾。印度和澳大利亞北部有逸生。
用途：藥用。

紅穗鐵莧菜 (狗尾紅) Redhot Cat-tail

***Acalypha hispida** Burm. f.

習性：灌木。花期：2-11月。
產地：公園及庭園栽培。
分佈：臺灣、福建、廣東、海南、雲南等庭園及公園栽培。原產太平洋島嶼，現世界熱帶及亞熱帶地區廣泛栽培。
用途：觀賞。

熱帶鐵莧菜 (山朴草) Indian *Acalypha*

***Acalypha indica** L.

習性：草本。花期：3-11月。
產地：筲箕灣、香港仔。
分佈：廣東、海南、臺灣。非洲熱帶地區、印度、斯里蘭卡、柬埔寨、越南、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓。中美洲有逸生。
用途：觀賞。

紅桑 Copper Leaf

***Acalypha wilkesiana** Muell. Arg.

習性：灌木。花期：幾乎全年。
產地：公園及庭園栽培。

分佈：臺灣、福建、廣東、海南、雲南等地
庭園及公園栽培。原產太平洋島嶼，
現世界熱帶及亞熱帶地區廣泛栽培。
用途：觀賞。

白邊紅桑 Whitepainted Copper Leaf

†**Acalypha wilkesiana* cv. Java White

習性：灌木。花期：幾乎全年。
產地：公園及庭園栽培。
分佈：臺灣、福建、廣東、海南有栽培。原
產印度尼西亞、爪哇。現世界熱帶及
亞熱帶地區廣泛栽培。
用途：觀賞。

金邊紅桑 Painted Copper Leaf

**Acalypha wilkesiana* cv. Marginata (*Acalypha godseffiana* Mast.)

習性：灌木。花期：全年。
產地：公園及庭園栽培。
分佈：臺灣、福建、廣東、廣西、海南公園
及庭園栽培。現世界熱帶及亞熱帶地
區廣泛栽培。
用途：觀賞。

山麻桿屬 *Alchornea* Sw.

紅背山麻桿 Christmas Bush

Alchornea trewioides (Benth.) Muell. Arg.
習性：灌木。花期：3-5 月；果期：6-8 月。
產地：香港各地。生於路邊、荒地及林緣。
分佈：福建、江西、湖南、雲南、廣東、廣
西、海南。泰國、越南、日本。
用途：觀賞。

石栗屬 *Aleurites* J. R. & G. Forst.

石栗 Candlenut Tree

**Aleurites moluccana* (L.) Willd.
習性：喬木。花期：4-10 月；果期：10-12
月。
產地：香港各地，行道旁及公園栽種。
分佈：福建、臺灣、雲南、廣東、廣西、海
南。亞洲熱帶及亞熱帶地區。
用途：藥用、材用、觀賞、作行道樹。

五月茶屬 *Antidesma* L.

五月茶 Chinese Laurei

Antidesma bunius (L.) Spreng.

習性：喬木。花期：3-5 月；果期：10-12
月。
產地：香港各地。生林中。
分佈：江西、湖南、貴州、西藏、福建、雲
南、廣東、廣西、海南。廣佈於亞洲
熱帶地區至澳大利亞昆士蘭。
用途：藥用、材用、觀賞。

黃毛五月茶 Ralamander Tree

Antidesma fordii Hemsl.

習性：喬木。花期：3-7 月；果期：7 月-翌
年 1 月。
產地：馬鞍山、大埔、梧桐寨、荔枝窩、沙
頭角。生林中。
分佈：福建、雲南、廣東、廣西、海南。越
南、老撾。
用途：觀賞、藥用。

方葉五月茶 Squareleaf Chinese Laurei

Antidesma ghaesembilla Gaertn.

習性：喬木。花期：3-9 月；果期：6-12 月。
產地：摩星嶺、香港仔、薄扶林道、大帽山、
大網仔、西貢、掃管笏、大埔。生林
中。
分佈：雲南、廣東、廣西、海南。印度、孟
加拉、不丹、緬甸、越南、斯里蘭卡、
馬來西亞、巴布亞新幾內亞、菲律
賓、澳大利亞。
用途：觀賞、藥用。

日本五月茶

Antidesma japonicum Sieb. & Zucc.

習性：喬木。花期：4-6 月；果期：7-9 月。
產地：香港各地。生林中。
分佈：長江以南各省區。日本、老撾、泰國、
馬來西亞。
用途：藥用、食用（果）、觀賞。

小葉五月茶

Antidesma venosum E. Mey. ex Tul. (*Antidesma microphyllum* Hemsl.)

習性：喬木。花期：5-6 月；果期：6-11 月。
產地：香港島、馬鞍山、大嶼山。生於疏林

下和灌叢中。
分佈：雲南、廣東、廣西、海南、四川、貴州。越南、老撾、泰國、非洲東部。
用途：觀賞。

銀柴屬 *Aporosa* Blume

銀柴 (大沙葉) *Aporosa*
Aporosa dioica (Roxb.) Muell. Arg.
習性：喬木。花期：幾全年；果期：幾全年。
產地：香港各地。生林中。
分佈：雲南、廣東、廣西、海南。印度、緬甸、馬來西亞、越南。
用途：觀賞、藥用。

秋楓屬 *Bischofia* Blume

秋楓 *Autumn maple*
Bischofia javanica Blume
習性：喬木。花期：4-5 月；果期：8-10 月。
產地：香港各地。生於林邊和林中。
分佈：長江以南各省區。熱帶亞洲、澳大利亞、波利尼西亞。
用途：材用、觀賞、藥用。

重陽木 *Chinese Bishopwood*
†****Bischofia polycarpa*** (H. Lévl.) Airy Shaw
花期：4-5 月；果期：10-11 月。
產地：上水、元朗有栽培。
分佈：秦嶺、淮河流域以南至福建至廣東北部。
用途：藥用、食用、材用、觀賞。優良行道樹種。

黑面神屬 *Breynia* J. R. & G. forst.

黑面神 *Waxy Leaf*
Breynia fruticosa (L.) Hook. f.
習性：灌木。花期：4-9 月；果期：5-12 月。
產地：香港各地。生於灌叢。
分佈：浙江、福建、廣東、湖南、廣西、貴州、雲南、四川。越南。
用途：觀賞、藥用。

紅葉黑面神 *Leaf-flower*
†****Breynia nivosa*** cv. ***Roseopicta***

習性：灌木。
產地：栽培。

分佈：熱帶地區。
用途：藥用。

土蜜樹屬 *Bridelia* Willd.

禾串樹 (大葉逼迫仔) *Prickly Bridelia*
Bridelia insulana Hance (**Bridelia balansae** Tutch.)
習性：灌木。花期：3-8 月；果期：9-11 月。
產地：香港島、大帽山、粉嶺、大埔。
分佈：福建、臺灣、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川。熱帶亞洲。
用途：觀賞、藥用。

土蜜樹 (逼迫仔) *Pop-gum Seed*
Bridelia tomentosa Blume
習性：灌木或小喬木。花期：3-12 月；果期：幾全年。
產地：香港各地常見。生林中或灌叢。
分佈：福建、臺灣、廣東、海南、廣西、貴州、雲南。亞洲東南部經印度尼西亞至澳大利亞。
用途：觀賞、藥用。

白桐樹屬 *Claoxylon* A. Juss.

白桐樹 *Claoxylon*
Claoxylon indicum (Reinw. ex Blume) Hassk.
[**Claoxylon polot** (Burm. f.) Merr.]
習性：喬木。花果期：3-12 月。
產地：石澳、大浪灣、鶴咀、大埔、林村、西貢、青山。生林中。
分佈：福建、臺灣、廣東、海南、廣西、貴州、雲南。亞洲熱帶地區。
用途：藥用

棒柄花屬 *Cleidion* Blume

棒柄花 (爪哇棘當) *Cleidion*
Cleidion brevipetiolatum Pax & Hoffm.
(**Cleidion javanicum** auct. non Blume: Check List HK Pl. 1993.)
習性：小喬木。花果期：2-10 月。
產地：鶴咀、青山。生於常綠林中。
分佈：廣東、海南、廣西、雲南、貴州。越南。

變葉木屬 *Codiaeum* A. Juss.

變葉木 (灑金榕) *Garden Croton*

***Codiaeum variegatum** (L.) A. Juss. [*Codiaeum variegatum* var. *pictum* (Lodd.) Muell. Arg.]

習性：灌木。花期：9-10月。

產地：公園及庭園栽種。

分佈：我國南部各省區常栽培。原產馬來半島至大洋洲。現廣泛栽培於世界熱帶地區。本種有許多栽培品種。

用途：觀賞。

巴豆屬 *Croton* L.

雞香骨 Thick-leaf Croton

Croton crassifolius Geisel.

習性：灌木。花期：11月至翌年2月。

產地：布力徑、薄扶林、大浪灣、粉嶺、大刀坳、羅湖、浪茄。生林中或灌叢。

分佈：廣西、海南、廣東、福建。越南、老撾、泰國。

用途：觀賞、藥用。

香港巴豆 Hongkong Croton

Croton hancei Benth.

習性：灌木或小喬木。花期：6月。

產地：青衣島。生於山地林中。

分佈：特產於香港。

毛果巴豆 Hairyfruit Croton

Croton lachnocarpus Benth.

習性：灌木。花期：4-5月。

產地：大潭、歌連臣山、北角、城門、烏蛟騰。生於林中。

分佈：江西、湖南、廣東、廣西、貴州。

用途：觀賞、藥用。

月光巴豆 Moon's Croton

****Croton moonii*** Thw.

習性：灌木。

產地：栽培。

分佈：原產斯里蘭卡。

用途：觀賞。

巴豆

Croton tiglium L.

習性：灌木或小喬木。花期：4-6月；果期：7-12月。

產地：香港仔、跑馬地、城門、大埔、沙頭角、大嶼山。生於林中。

分佈：浙江、福建、江西、湖南、廣東、海南、貴州、雲南、四川。亞洲南部和東南部各國、菲律賓、日本南部。

用途：藥用。種子有毒！

核果木屬 *Drypetes* Vahl

拱弧脈核果木

Drypetes arcuatinervia Merr. & Chun

習性：灌木。

產地：蒲苔島。生於灌叢中。

分佈：廣東、廣西。

臺灣核果木

Drypetes formosana (Kanch. & Sasaki ex Shimada) Kaneh.

習性：灌木。

產地：南丫島、宋崗、果洲群島、青洲。生於灌叢和林中。

分佈：廣東、臺灣。

藥用核果木 Officinal *Drypetes*

****Drypetes roxburghii*** (Wall.) Hurusawa (*Putranjiva roxburghii* Wall.)

習性：喬木。花期：4-7月。果期：7-9月。

產地：香港動植物公園。

分佈：印度、斯里蘭卡、緬甸、柬埔寨、老撾、印度尼西亞、新幾內亞。

用途：觀賞、藥用。

黃桐屬 *Endospermum* Benth.

黃桐 *Endospermum*

Endospermum chinense Benth.

習性：喬木。花期：5-8月；果期：8-11月。

產地：香港仔、聶高信山、城門、大埔、蠔涌、企嶺下老圍。生於山地常綠林中。

分佈：福建、廣東、海南、廣西、雲南。印度、緬甸、泰國、越南。

用途：觀賞、藥用、材用。

大戟屬 *Euphorbia* L.

火殃勒 Fleshy Spurge

****Euphorbia antiquorum*** L.

習性：灌木或小喬木。花果期：幾乎全年。
產地：庭園和公園栽培。
分佈：我國南北均有栽培。熱帶亞洲。
用途：觀賞、藥用。

海濱大戟 Littoral Euphorbia

Euphorbia atoto Forst. f.

習性：草本。花期：6-11月；果期：6-11月。
產地：深水灣、南丫島。生於海邊沙地上。
分佈：廣東、海南、臺灣。日本、泰國、斯里蘭卡、印度、印度尼西亞、太平洋諸島至澳大利亞。

細齒大戟 Bifid Euphorbia

Euphorbia bifida Hook. & Arn.

習性：草本。花期：4-10月；果期：4-10月。
產地：鯽魚涌、鹿頸、洲頭、青山。生於路旁或山腳陰濕地。
分佈：江蘇、浙江、江西、福建、臺灣、廣東、海南、廣西、貴州、雲南。印度、印度尼西亞至澳大利亞。

猩猩草 Redinvolute Euphorbia

†***Euphorbia cyathophora** Murr.

習性：多年生草本。花期：5-11月；果期：5-11月。
產地：栽培。
分佈：我國大部分省區有栽培。原產中南美洲，現歸化於舊大陸。
用途：觀賞。

乳漿大戟 (貓眼草、乳漿草) Leafy Spurge

†***Euphorbia esula** L.

習性：多年生草本。花果期：4-10月。
產地：栽培。
分佈：廣布於全國各地。西亞、歐洲。

澤漆 Sun Euphorbia

***Euphorbia helioscopia** L.

習性：一年生草本。花果期：4-10月。
產地：栽培。
分佈：全國大部分地區。
用途：藥用。

白苞猩猩草 (柳葉大戟) Painted Spurge

***Euphorbia heterophylla** L.

習性：多年生草本。花果期：2-11月。
產地：栽培。
分佈：廣泛栽培於熱帶、亞熱帶和暖溫帶地區。
用途：觀賞、藥用。

飛揚草 Garden Spurge

Euphorbia hirta L.

習性：一年生草本。花期：6-12月；果期：6-12月。
產地：香港各地。生於荒地。
分佈：江西、湖南、福建、臺灣、廣東、廣西、海南、貴州、雲南、四川。世界熱帶及亞熱帶地區廣佈。
用途：觀賞、藥用。

通奶草 Hypericeleaf Euphorbia

Euphorbia hypericifolia L. (*Euphorbia indica* Lam.)

習性：一年生草本。花果期：8-12月。
產地：香港各地。生於路旁或山腳陰濕地。
分佈：江西、臺灣、湖南、廣東、廣西、海南、貴州、雲南、四川。廣佈於世界熱帶及亞熱帶地區。
用途：觀賞、藥用。

鐵海棠 Crown-of-thorns

***Euphorbia milii** Des Moul.

習性：蔓生灌木。花果期：全年。
產地：庭園及公園栽植。
分佈：我國南北均有栽培。原產非洲(馬達加斯加)。現廣泛栽植於世界熱帶及亞熱帶地區。
用途：觀賞、藥用。

匍匐大戟 Prostrate Euphorbia

***Euphorbia prostrata** Aiton (*Euphorbia sanguinea* auct. non Hochst. & Steud.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：一年生匍匐狀草本。花果期：4-10月。
產地：扯旗山、歌賦山、汀九、上白泥。生

於路旁或山坡草地上。
分佈：江蘇、湖北、福建、臺灣、廣東、海南、雲南。原產美洲，現歸化於東半球熱帶及亞熱帶地區。
用途：觀賞、藥用。

一品紅 *Poinsettia*

**Euphorbia pulcherrima* Willd. ex Klotzsch
習性：灌木。花果期：10月至翌年4月。
產地：庭園及公園栽植。
分佈：全國各地栽培。原產中美洲。現廣泛栽於世界熱帶及亞熱帶地區。
用途：觀賞、藥用。

千根草 (小飛揚) *Thyme-leaf Spurge*

Euphorbia thymifolia L. (*Euphorbia sanguinea* auct. non Hochst. & Steud.:
Check List HK Pl. 1993)
習性：一年生草本。花果期：6-11月。
產地：香港各地。生於山坡草地或路旁。
分佈：江蘇、浙江、湖南、臺灣、江西、福建、廣東、海南、廣西、雲南。廣佈於世界熱帶及亞熱帶地區 (除澳大利亞)。
用途：觀賞、藥用。

綠玉樹 (光棍樹) *Milk-bush*

**Euphorbia tirucalli* L.
習性：灌木或小喬木。花果期：7-11月。
產地：白芒、南丫島、青山、稔灣、大鵬洲、大鵬灣平洲及庭園栽植。
分佈：我國南北均有栽培。原產非洲東部 (安哥拉)，現廣泛栽培於世界熱帶及亞熱帶地區。
用途：觀賞、藥用。

海漆屬 *Excoecaria* L.

海漆 *Flind-your-eye*

Excoecaria agallocha L.
習性：喬木。花果期：1-9月。
產地：香港仔、大潭灣、大浪灣、沙田、汀角、橋咀、泥涌、榕樹澳、大嶼山。生於山坡灌木叢中。
分佈：廣西、海南、廣東、臺灣。印度、斯里蘭卡、泰國、柬埔寨、越南、菲律賓

賓。

用途：觀賞。

紅背桂 *Cochinchinese Excoecaria*

**Excoecaria cochinchinensis* Lour.
習性：灌木。花果期：幾乎全年。
產地：公園栽植。
分佈：廣西；臺灣、海南、廣東、廣西、雲南栽培。亞洲東南部廣佈。
用途：觀賞。

白飯樹屬 *Flueggea* Willd.

白飯樹 (金柑藤) *Snow Berry*

Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt
習性：灌木。花期：3-8月；果期：7-12月。
產地：薄扶林、大潭、大埔、粉嶺。生於山坡灌木叢中。
分佈：華東、華南、西南各省區。非洲、大洋洲及亞洲東部及東南部。
用途：觀賞、藥用。

算盤子屬 *Glochidion* J. R. & G. Forst.

毛果算盤子 (漆大姑) *Hairy-fruited Abacus Plant*

Glochidion eriocarpum Champ. ex Benth.
習性：灌木。花果期：幾乎全年。
產地：香港各地。生於山坡灌叢中或林緣。
分佈：江蘇、福建、臺灣、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南。越南。
用途：觀賞、藥用。

厚葉算盤子 *Thick-leaved Abacus Plant*

Glochidion hirsutum (Roxb.) Voigt
習性：灌木或小喬木。花果期：幾乎全年。
產地：薄扶林、馬已仙峽、荃灣、城門、川龍、西徑、榕樹澳、三桠樹、大嶼山、南丫島。生於山地疏林或灌叢中。
分佈：福建、臺灣、廣東、海南、廣西、雲南、西藏。印度。
用途：藥用。

艾膠算盤子 (大葉算盤子) *Large-leaved Abacus Plant*

Glochidion lanceolarium (Roxb.) Voigt

(*Glochidion macrophyllum* Benth.)

習性：喬木或大灌木。花果期：4-9 月；果期：7 月翌年 2 月。

產地：香港各地。生於疏林中或灌叢中。

分佈：福建、廣東、海南、廣西、雲南。印度、泰國、老撾、柬埔寨、越南。

用途：觀賞、藥用。

甜葉算盤子 (菲島算盤子) Philippines
Abacus Plant

***Glochidion philippicum* (Cav.) C. B. Rob.**

習性：喬木。花期：4-8 月；果期：7-12 月。

產地：香港仔、黃竹坑、西貢。生於疏林或灌叢中。

分佈：福建、臺灣、廣東、海南、廣西、雲南、四川。馬來西亞、菲律賓、印度尼西亞。

用途：觀賞、藥用。

算盤子 Abacus Plant

***Glochidion puberum* (L.) Hutch.**

習性：灌木。花期：4-8 月；果期：7-11 月。

產地：石澳島、鶴咀、香港仔、柏架山、荃灣、大帽山、西貢、清水灣、粉嶺、大尾督。生於路旁或灌叢。

分佈：陝西、甘肅、江蘇、安徽、浙江、江西、福建、臺灣、河南、湖北、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、西藏。

用途：觀賞、藥用。

裏白算盤子 Triandian *Glochidion*

†***Glochidion triandrum* (Blanco) C. B. Rob.**

習性：灌木。花期：3-7 月；果期：7-12 月。

產地：梧桐寨。生灌叢中。

分佈：福建、臺灣、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、印度、尼泊爾、錫金、柬埔寨、日本、菲律賓。

用途：觀賞、藥用。

白背算盤子 Wright's Abacus Plant

***Glochidion wrightii* Benth.**

習性：灌木。花期：5-9 月；果期：7-12 月。

產地：香港各地。生灌叢中。

分佈：福建、廣東、海南、廣西、貴州、雲南。

用途：觀賞、藥用。

香港算盤子 Hong Kong Abacus Plant

***Glochidion zeylanicum* (Gaertn.) A. Juss.**
(*Glochidion hongkongense* Muell. Arg.)

習性：灌木或小喬木。花期：3-8 月；果期：7-11 月。

產地：香港島、城門、馬鞍山、大埔滘、大尾督、榕樹澳、西貢、大嶼山、南丫島。生疏林或灌叢中。

分佈：福建、臺灣、廣東、海南、廣西、雲南。印度、斯里蘭卡、越南、日本、印度尼西亞。

用途：觀賞、藥用。

麻瘋樹屬 *Jatropha* L.

麻瘋樹 Physic Nut

****Jatropha curcas* L.**

習性：喬木。花期：9-10 月；果期：10-12 月。

產地：沙田、大埔、粉嶺、鹿頸、上水、元朗、大嶼山等地有栽植。

分佈：福建、臺灣、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川等地栽培或少量逸為野生。原產美洲。現廣佈於全球熱帶地區。

用途：觀賞、藥用。

有腺麻瘋樹 (油蘆子) Glandular *Jatropha*

****Jatropha glandulifera* Roxb.**

習性：喬木。花期：8-10 月；果期：9-11 月。

產地：薄扶林。栽培。

分佈：原產美洲。印度、斯里蘭卡有栽培。

用途：觀賞、藥用。

棉葉麻瘋樹 Gossypineleaf *Jatropha*

****Jatropha gossypifolia* L.**

習性：灌木。花期：6-10 月。

產地：大埔滘。栽培。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南有栽培。原產巴西。印度、馬來西亞、新加坡有引種。

用途：觀賞、藥用。

戟葉麻瘋樹 Hastateleaf Jatropha

***Jatropha hastata** Jacq.

習性：喬木。花期：7-10 月。

產地：公園栽培。

分佈：原產南美洲。

用途：觀賞、藥用。

全緣葉珊瑚 Peregrina

†***Jatropha integerrima** Jacq.

習性：灌木。花期：6-10 月。

產地：公園栽培。

分佈：原產巴西。廣東、海南有栽培。

用途：觀賞。

佛肚樹 Gout Stalk

***Jatropha podagrica** Hook.

習性：灌木。花期：幾全年。

產地：庭園及公園栽培。

分佈：中國許多省區已有栽培。原產美洲。

用途：觀賞。

血桐屬 *Macaranga* Thou.

刺果血桐 Spinefruit *Macaranga*

†**Macaranga auriculata** (Merr.) Airy Shaw

習性：喬木。花期：1-5 月；果期：5-6 月。

產地：烏蛟騰、香港仔、大埔滘。生疏林或灌叢中。

分佈：福建、廣東、海南、廣西。越南、泰國、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓。

鼎湖血桐 Sampson *Macaranga*

Macaranga sampsonii Hance

習性：灌木。花期：5-6 月；果期：7-8 月。

產地：上禾坑、龜頭嶺、馬鞍山、梧桐寨。生疏林或灌叢中。

分佈：福建、廣東、廣西。越南。

血桐 Elephant's Ear

Macaranga tanarius (L.) Muell. Arg.

習性：喬木。花期：4-5 月；果期：6 月。

產地：香港各地。生疏林或灌叢中。

分佈：臺灣、廣東。日本、越南、泰國、緬

甸、馬來西亞、印度尼西亞、澳大利亞。

用途：材用，觀賞。

野桐屬 *Mallotus* Lour.

白背葉 (白桐、楸桐) Whitebackleaf

Mallotus

Mallotus apelta (Lour.) Muell. Arg.

習性：灌木或小喬木。花期：6-9 月；果期：8-11 月。

產地：城門、馬鞍山、粉嶺、元朗。生灌叢中。

分佈：江西、福建、湖南、廣東、海南、廣西、雲南。越南。

用途：工業用油。

粗毛野桐 Hooker *Mallotus*

Mallotus hookerianus (Seem.) Muell. Arg.

習性：小喬木或灌木。花期：3-5 月；果期：8-10 月。

產地：跑馬地、香港仔、黃泥涌、石澳、烏蛟騰、大嶼山。生於山地林中。

分佈：廣東、海南。越南。

山苦茶 (富列野桐) Oblongleaf *Mallotus*

Mallotus peltatus (Geiseler) Muell. Arg.

[*Mallotus oblongifolius* (Miq.) Muell. Arg.]

習性：小喬木或灌木。花期：2-4 月；果期：6-11 月。

產地：香港仔、深水灣道、大浪灣、金夫人馳馬徑、企嶺下老圍。生於山地林中

分佈：廣東、海南。亞洲東南部。

用途：香精原料。

白楸 Panicked *Mallotus*

Mallotus paniculatus (Lam.) Muell. Arg.

習性：喬木或灌木。花期：7-10 月；果期：11-12 月。

產地：香港各地。生於林緣。

分佈：臺灣、福建、廣東、海南、廣西、貴州、雲南。亞洲東南部。

用途：工業用油。

粗糠柴 Kamalatre

Mallotus philippensis (Lam.) Muell. Arg.

(*Mallotus philippenensis* Muell. Arg.)

習性：小喬木或灌木。花期：4-5月；果期：5-8月。

產地：扯旗山、薄扶林、歌賦山、大嶼山。生於林緣灌叢中。

分佈：四川、雲南、貴州、湖北、湖南、江西、安徽、江蘇、浙江、福建、臺灣、廣西、廣東、海南。亞洲南部及東南部、大洋洲熱帶地區。

用途：工業用油。

石岩楓 Creepy Mallotus

Mallotus repandus (Willd.) Muell. Arg.

習性：攀援灌木。花期：3-5月；果期：8-9月。

產地：香港仔、薄扶林道、大坑道、鶴咀、西貢。生於林緣灌叢中。

分佈：廣西、廣東、海南、臺灣。亞洲東南部和南部。

用途：纖維。

木薯屬 *Manihot* P. Mill.

木薯 Cassava

***Manihot esculenta** Crantz

習性：灌木。花期：9-11月。

產地：栽培。

分佈：福建、臺灣、廣東、海南、廣西、貴州、雲南等地有栽培。原產巴西，現全世界熱帶地區廣泛栽培。

用途：食用。

紅雀珊瑚屬 *Pedilanthus* Neck. ex Poit.

紅雀珊瑚 Redbird Cactus

***Pedilanthus tithymaloides** (L.) Poir.

習性：灌木。花期：12月至翌年6月

產地：庭園及公園栽植。

分佈：廣東、廣西、雲南等常見栽培，北方在溫室亦有栽培。原產美洲。

用途：觀賞。

葉下珠屬 *Phyllanthus* L.

越南葉下珠 Vietnam Leaf-Flower

Phyllanthus cochinchinensis (Lour.) Spreng.

習性：灌木。花期：6-12月；果期：6-12月。

產地：香港各地。生於灌叢或疏林中。

分佈：福建、廣東、海南、廣西、雲南、四川、西藏。印度、越南、柬埔寨、老撾。

用途：觀賞、藥用。

餘甘子 (油甘子) Myrobalan

Phyllanthus emblica L.

習性：喬木或灌木。花期：4-6月；果期：7-9月。

產地：香港各地。生於灌叢或疏林中。

分佈：江西、福建、臺灣、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川。印度、斯里蘭卡、中南半島、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓。

用途：藥用、食用、材用、觀賞。

細枝葉下珠 (幼枝葉下珠) *Leptocladous* Leaf-Flower

Phyllanthus leptocladus Benth.

習性：灌木。花期：5-7月；果期：7-10月。

產地：香港曾有記錄。生於山坡灌叢中。

分佈：福建、廣東、雲南。

瘤腺葉下珠 Myrtleleaf Leaf-Flower

†***Phyllanthus myrtifolius** (Wight) Muell. Arg.

習性：灌木。

產地：栽培。

分佈：原產斯里蘭卡。臺灣、海南有引種栽培。

用途：觀賞。

珠子草 Necklace Plant

Phyllanthus niruri L.

習性：一年生草本。花果期：1-10月。

產地：香港島。生路旁或山腳陰濕地。

分佈：臺灣、廣東、海南、廣西、雲南。印度、中南半島、馬來西亞、菲律賓至熱帶美洲。

用途：觀賞、藥用。

小果葉下珠 Reticulated Leaf-Flower

Phyllanthus reticulatus Poir.

習性：灌木。花期：3-6 月；果期：6-10 月。

產地：薄扶林、深水灣、馬鞍山、大埔滘、林村、大嶼山。生於曠野草地或灌叢中。

分佈：江西、福建、臺灣、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川。熱帶西非至印度、斯里蘭卡、中南半島、印度尼西亞、菲律賓、馬來西亞、澳大利亞。

用途：觀賞、藥用。

葉下珠（珍珠草） Common Leaf-Flower

Phyllanthus urinaria L.

習性：一年生草本。花期：4-6 月；果期：7-11 月。

產地：薄扶林、扯旗山、聶高信山、沙田、大埔、粉嶺、大嶼山。生於曠野草地。

分佈：華東、華中、西南、河北、山西、陝西。印度、斯里蘭卡、中南半島、日本、馬來西亞、印度尼西亞至南美。

用途：觀賞、藥用。

蜜甘草 Ussur Leaf Flower

Phyllanthus ussuriensis Rupr. ex Maxim.

(*Phyllanthus wilfordii* Croiz. et Metc.)

習性：一年生草本。花期：4-7 月；果期：7-10 月。

產地：深水灣、粉嶺、沙田。生於山坡草地。

分佈：東北、華東、華南。俄羅斯、蒙古、朝鮮、日本。

用途：藥用。

黃珠子草 Virgate Leaf Flower

Phyllanthus virgatus Forst. f. (*Phyllanthus simplex* Retz.)

習性：一年生草本。花期：4-5 月；果期：6-11 月。

產地：黃泥涌、沙田、屯門、坪洲、大嶼山。生於山地灌叢中。

分佈：河北、山西、陝西、華東、華南、西南。印度、東南亞至昆士蘭和太平洋沿岸。

用途：觀賞、藥用。

三籽桐屬 *Reutealis* Airy Shaw

三籽桐 Banucalang, Philippine Tung

Reutealis trisperma (Blanco) Airy Shaw

習性：喬木。

產地：栽培。

分佈：馬來西亞。

用途：油料。

蓖麻屬 *Ricinus* L.

蓖麻 Castor-oil Plant

***Ricinus communis** L.

習性：灌木。花期：幾乎全年；果期：10-12 月。

產地：沙田、粉嶺、上水、羅湖、元朗、大澳。栽培或野生。

分佈：華南、西南地區有栽培。原產非洲東北部，現廣泛栽培於世界熱帶至溫帶地區。

用途：藥用、油料植物、葉飼蠶。

烏柏屬 *Sapium* Jacq.

斑籽烏柏 Metcalf Tallow Tree

†**Sapium atrobadiomaculatum** Metc.

習性：灌木。花期：3-5 月；果期：6-9 月。

產地：聶高信山、淺水灣、紫羅蘭山、大潭篤、白臘仔、螺洲。生於疏林或灌叢。

分佈：福建、江西、湖南、廣東。

山烏柏 Mountain Tallow Tree

Sapium discolor (Champ. ex Benth.) Muell.

Arg.

習性：喬木。花期：4-6 月；果期：7-10 月。

產地：香港各地常見。生於疏林。

分佈：四川、雲南、貴州、湖南、廣西、廣東、江西、安徽、浙江、福建、臺灣。印度、緬甸、老撾、越南、馬來西亞、印度尼西亞。

用途：觀賞、藥用、材用、油料。

烏柏 Chinese Tallow Tree

Sapium sebiferum (L.) Roxb.

習性：喬木。花期：4-8 月；果期：8-11 月。

產地：香港島、沙田、粉嶺、大埔、上水、

元朗、大坳門、大嶼山。生疏林中。
分佈：黃河以南各省區，北達陝西、甘肅。
日本、越南、印度；歐美有栽培。
用途：藥用、材用、觀賞、油料。

守宮木屬 *Sauropus* Blume

守宮木 (樹仔菜) *Common Sauropus*

**Sauropus androgynus* (L.) Merr.

習性：灌木。花期：4-7月；果期：7-12月。
產地：大埔滘、上水、羅湖、元朗有栽培。
分佈：海南、廣東、廣西、雲南有栽培。印度、斯里蘭卡、老撾、柬埔寨、越南、菲律賓、印度尼西亞、馬來西亞。
用途：食用 (葉及嫩枝)、觀賞。

艾堇 *Berryshaped Sauropus*

Sauropus bacciformis (L.) Airy Shaw

[*Synostemon bacciformis* (L.) Webster]

習性：匍匐狀草本。花期：8-12月；果期：9月至翌年2月。
產地：大浪灣、香港仔、沙田、白石角、泥涌、大埔滘、分流、坪洲、馬鞍山。生於海邊沙灘。
分佈：臺灣、海南、廣東、廣西。毛里裘斯、印度、斯里蘭卡、越南、菲律賓、馬來西亞、印度尼西亞。

蒼葉守宮木 *Garrett Sauropus*

†**Sauropus garrettii* Craib

習性：灌木。花期：6-7月；果期：8-10月。
產地：大棠村有栽培。
分佈：海南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、湖北。緬甸、泰國、新加坡、馬來西亞。
用途：觀賞。

龍脷葉 *Spatulate leaf Sauropus*

**Sauropus spatulifolius* Beille (*Sauropus changianus* S. Y. Hu)

習性：灌木。
產地：元朗、上水、大埔滘、粉嶺、沙田、九龍、大圍、羅湖。栽培。
分佈：福建、廣東、廣西有栽培。原產越南，馬來西亞有引種。
用途：藥用、食用 (葉)、觀賞。

地楊桃屬 *Sebastiania* Spreng.

地楊桃 (色柏木) *Creeping Sebastiania*

Sebastiania chamaelea (L.) Muell. Arg.

習性：多年生草本。花期：幾全年。
產地：大嶼山。生於曠野草地或沙灘。
分佈：廣東、海南、廣西。亞洲熱帶地區。

油桐屬 *Vernicia* Lour.

油桐 (三年桐) *Tong-oil Tree*

**Vernicia fordii* (Hemsl.) Airy Shaw
(*Aleurites fordii* Hemsl.)

習性：喬木。花期：3-4月；果期：8-11月。
產地：香港各地有栽植。
分佈：長江以南。越南。
用途：觀賞、藥用、工業油料植物和行道樹種。

木油桐 (千年桐) *Mo-oil Tree*

**Vernicia montana* Lour. [*Aleurites montana* (Lour.) Wils.]

習性：喬木。花期：4-6月；果期：7-10月。
產地：香港各地有栽植。
分佈：雲南、貴州、廣西、廣東、海南、福建、江西、湖南、河北、浙江、安徽。越南、泰國、緬甸。
用途：工業油料植物。

238. 鼠李科 *Rhamnaceae*

勾兒茶屬 *Berchemia* Necker ex DC.

多花勾兒茶 *Japanese Supple-jack*

Berchemia floribunda (Wall.) Brongn.
(*Berchemia racemosa* Sieb. & Zucc.)

習性：常綠藤本。花期：8-10月；果期：翌年2-3月。
產地：香港島、大帽山、馬鞍山、西貢、大浪西灣、赤徑、橋咀島、大嶼山。生於林緣、灌叢中。
分佈：長江以南各省區以及陝西、山西、甘肅、河南等省。
用途：藥用。

鐵包金 (老鼠耳) *Supple-jack*

Berchemia lineata (L.) DC.

習性：常綠藤本。花期：7-10月；果期：11月。

產地：沙田、上水、大浪西灣、馬灣、大鵬灣平洲。生於灌叢中。

分佈：廣東、廣西、福建、臺灣。

用途：藥用。

馬甲子屬 *Paliurus* Mill.

馬甲子 *Thorny Wingnut*

Paliurus ramosissimus (Lour.) Poir.

習性：落葉灌木。花期：5-8月；果期：9-10月。

產地：香港島、沙田、米埔、赤徑、大嶼山。生於灌叢、林緣。

分佈：長江以南各省。朝鮮、日本、越南。

用途：藥用、觀賞、綠籬。

鼠李屬 *Rhamnus* L.

山綠柴 *Twiggy Buckthorn*

Rhamnus brachypoda C. Y. Wu ex Y. L. Chen (*Rhamnus virgata* auct. non Roxb.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：落葉灌木。花期：4-5月；果期：7-11月。

產地：柏架山、大潭、大帽山、大嶼山、螺洲。生於山坡灌叢中。

分佈：廣東、廣西、貴州、湖南、江西、浙江。

長葉凍綠 *Buckthorn*

Rhamnus crenata Sieb. & Zucc.

習性：落葉灌木。花期：4-5月；果期：8-10月。

產地：摩星嶺、大帽山、烏蛟騰、荔枝窩、鹿頸、大嶼山。生於路邊、溪邊灌叢中。

分佈：長江以南各省以及陝西、河南。朝鮮、日本、中南半島。

用途：藥用。

尼泊爾鼠李

Rhamnus napalensis (Wall.) Laws.

習性：落葉灌木。花期：7-8月；果期：12-翌年2月。

產地：鳳凰山。生於林緣、灌叢中。

分佈：長江以南各省。印度、尼泊爾、緬甸。

雀梅藤屬 *Sageretia* Brongn.

雀梅藤 *Hedge Sageretia*

Sageretia thea (Osbeck) Johnston. [*Sageretia theezans* (L.) Brongn.]

習性：半常綠灌木。花期：7-11月；果期：翌年3-5月。

產地：香港各地。生於灌叢中。

分佈：長江以南各省。日本、朝鮮、越南印度。

用途：葉可作茶。

翼核果屬 *Ventilago* Gaertn.

翼核果 *Smooth-fruited Ventilago*

Ventilago leiocarpa Benth.

習性：常綠藤本。花期：3-5月；果期：4-7月。

產地：香港島、大帽山。生於林緣、灌叢中。

分佈：廣東、廣西、雲南、湖南、福建、臺灣。

用途：根供藥用。

棗屬 *Ziziphus* Mill.

棗 *Jujube*

**Ziziphus jujuba* Mill.

習性：落葉小喬木。花期：5—8月。

產地：栽培。

分佈：華南、西南、華中、華東、華北各地。

用途：果樹。

滇刺棗 *Indian Jujube*

**Ziziphus mauritiana* Lam.

習性：常綠喬木。花期：8-11月；果期：9-12月。

產地：栽培。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、四川。印度、緬甸、中南半島、馬來西亞、澳大利亞、非洲。

240. 葡萄科 *Vitaceae*

蛇葡萄屬 *Ampelopsis* Michaux

廣東蛇葡萄 *Canton Ampelopsis*

Ampelopsis cantoniensis (Hook. & Arn.) Planch.

習性：木質藤本。花期：4-7 月，果期 8-11 月。

產地：香港各地。生於山谷林中或山坡灌叢。

分佈：臺灣、福建、浙江、江西、安徽、湖南、湖北、廣東、廣西、貴州、雲南。印度、老撾、印度尼西亞。

牯嶺蛇葡萄 *Kuling Ampelopsis*

Ampelopsis heterophylla* var. *kulingensis (Rehd.) C. L. Li [*Ampelopsis brevipedunculata* auct. non Kochne.: Check List HK Pl. 1993.]

習性：木質藤本。花期：5-7 月，果期 8-9 月。

產地：香港各地。生溝谷林下或山坡灌叢。

分佈：安徽、江蘇、浙江、江西、廣東、海南、廣西、湖南、湖北、貴州、四川。

烏薺莓屬 *Cayratia* Juss.

角花烏薺莓 *Corniculate Cayratia*

Cayratia corniculata (Benth.) Gagnep. [*Columella corniculata* (Benth.) Merr.]

習性：草質藤本。花期：4-5 月，果期 7-9 月。

產地：香港各地。生於山谷溪邊疏林或山坡灌叢。

分佈：福建、廣東、江西。日本。

烏薺莓

†***Cayratia japonica*** (Thunb.) Gagnep.

習性：草質藤本。

產地：蕉坑、大埔、山寮。

分佈：華東、中南、華南各省。日本。

白粉藤屬 *Cissus* L.

翼莖白粉藤 *Winged Branch Treebine*

Cissus pteroclada Hayata [*Cissus hastata* auct. non (Miq.) Planch.: Check List HK Pl. 1993.]

習性：草質藤本。花期：6-8 月，果期：8-12 月。

產地：子門田。生於山谷疏林或灌叢。

分佈：臺灣、福建、廣東、廣西、海南、雲南。

白粉藤 *Creeping Treebine*

Cissus repens Lam.

習性：草質藤本。花期：7-10 月，果期：11 月至翌年 5 月。

產地：淺水灣、西貢、大圍、鳳園、粉嶺、上水、東涌。生於山谷疏林或山坡灌叢。

分佈：廣東、廣西、貴州、雲南。越南、菲律賓、馬來西亞和澳大利亞。

地錦屬 *Parthenocissus* Planch.

異葉爬山虎 *Diversifolious Creeper*

****Parthenocissus dalzielii*** Gagnep.

習性：木質藤本。花期：5-7 月，果期：7-11 月。

產地：園林栽培，亦常作垂直綠化植物。生山崖陡壁、山坡或山谷中或灌叢岩石縫中。

分佈：臺灣、福建、浙江、江西、安徽、廣東、廣西、湖南、湖北、貴州、雲南、四川。

崖爬藤屬 *Tetrastigma* (Miq.) Planch.

三葉崖爬藤(三葉青) *Hemsley Rockvine*

Tetrastigma hemsleyanum Diels & Gilg.

習性：草質藤本。花期：4-6 月，果期：8-11 月。

產地：扯旗山、摩星嶺、馬鞍山、大帽山、大嶼山。生山坡灌叢、山谷溪邊林下岩石縫中。

分佈：臺灣、福建、浙江、江蘇、江西、廣東、廣西、海南、湖南、湖北、貴州、雲南、四川。

扁擔藤 *Flatstem Rockvine*

Tetrastigma planicaule (Hook.) Gagnep.

習性：木質大藤本。花期：4-6 月，果期：8-12 月。

產地：香港島、大帽山、梧桐寨、馬鞍山、大嶼山。生於山谷林中或山坡岩石縫中。

分佈：福建、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、西藏。老撾、越南、斯里蘭卡、

印度。

葡萄屬 *Vitis* L.

小果葡萄 Littlefruit Grape

†*Vitis balanseana* Planch.

習性：木質藤本。花期：2-8月，果期：6-11月。

產地：錦田、大澳、二澳、坪洲。攀援於溝谷向陽處喬灌木上。

分佈：廣東、海南、廣西。

葛藟葡萄 Oriental Grape

Vitis flexuosa Thunb.

習性：木質藤本。花期：3-5月；果期：7-11月。

產地：灣仔、司徒拔道、飛鵝山、赤徑。生山坡或溝谷田邊、草地、灌叢或林中。

分佈：陝西、甘肅、山東、海南、安徽、江蘇、福建、浙江、江西、廣東、廣西、湖南、湖北、貴州、雲南、四川。

綿毛葡萄 Tomentose Grape

Vitis retordii Rom. du Caill. ex Planch.

習性：木質藤本。花期：5月，果期：6-7月。

產地：香港島、大帽山、梧桐寨、河背、赤徑、塔門、大嶼山等。生山坡、溝谷疏林或灌叢中。

分佈：廣東、海南、廣西、貴州。

小葉葡萄 Small-leaf Grape

†*Vitis sinocinerea* W. T. Wang

習性：木質藤本。花期：4-6月；果期：7-10月。

產地：大鵬灣平洲。生山坡林中或灌叢中。

分佈：臺灣、福建、浙江、江蘇、江西、湖南、湖北、雲南。

狹葉葡萄 Narrowleaf Grape

†*Vitis tsoii* Merr.

習性：木質藤本。花期：4-5月，果期：6-9月。

產地：赤徑。生山坡林中或灌叢中。

分佈：福建、廣東、廣西。

葡萄 Wine Grape

**Vitis vinifera* L.

習性：木質藤本。花期：4-5月，果期：8-9月。

產地：栽培。

分佈：我國各地栽培，原產亞洲西部。

243. 黏木科 Ixonanthaceae

黏木屬 *Ixonanthes* Jack.

黏木 *Ixonanthes*

Ixonanthes reticulata Jack. (*Ixonanthes chinensis* Champ.)

習性：小喬木。花期：夏季。

產地：鶴咀、跑馬地、黃泥涌、香港仔、淺水灣、馬鞍山。生於灌叢或疏林中。

分佈：長江流域以南各地。越南。

246. 金虎尾科

Malpighiaceae

風箏果屬 *Hiptage* Gaertn.

風箏果(風車藤) *Hiptage*

Hiptage benghalensis (L.) Kurz.

習性：攀援灌木或藤本。花期：1-4月；果期：4-5月。

產地：扯旗山、川龍、大帽山、吉澳。生於灌叢或林中。

分佈：臺灣、福建、廣東、海南、廣西、貴州、雲南。

金虎尾屬 *Malpighia* Plum. ex L.

金虎尾 Singapore Holly

**Malpighia coccigera* L.

習性：直立灌木。花期：夏秋。

產地：公園及庭園栽培。

分佈：原產熱帶美洲。

亮葉金虎尾 Barbados Cherry

**Malpighia glabra* L.

習性：灌木或小喬木。花期：夏秋。

產地：公園及庭園栽培。

分佈：原產熱帶美洲。

用途：食用。

金英屬 *Thryallis* L.

金英 Mexico Star Flower

**Thryallis gracilis* Kuntze

習性：灌木。花期：8-9月；果期：10-11月。

產地：公園栽培。

分佈：原產美洲熱帶地區。

三星果屬 *Tristellateia* Thouars

三星果 Australian *Tristellateia*

**Tristellateia australasiae* A. Rich.

習性：木質藤本。花期：8月；果期：10月。

產地：公園栽培。

分佈：臺灣。馬來西亞、澳大利亞、太平洋諸島嶼。

250. 遠志科 *Polygalaceae*

遠志屬 *Polygala* L.

小花遠志 Small-flowered milkwort

Polygala arvensis Willd. (*Polygala telephioides* Willd.)

習性：草本。花果期：7-10月。

產地：香港仔、石澳、果洲群島。生於海岸邊和山坡草地。

分佈：江蘇、安徽、浙江、江西、臺灣、廣東、海南、廣西、雲南。

用途：藥用。

黃花倒水蓮（屈頭雞） *Polygala*

Polygala fallax Hemsl. (*Polygala aureocauda* Dunn)

習性：灌木或小喬木。花期：5-8月；果期：8-10月。

產地：香港島、大帽山、大嶼山。生於山谷林下。

分佈：江西、福建、湖南、廣東、廣西、雲南

華南遠志（金不換） Chinese milkwort

Polygala glomerata Lour. (*Polygala chinensis* L.)

習性：草本。花期：4-10月；果期：5-11月。

產地：香港島、大欖涌、大嶼山。生於山坡草地。

分佈：福建、廣東、海南、廣西、雲南。印

度、越南、菲律賓。

用途：藥用。

香港遠志 Hong Kong milkwort

Polygala hongkongensis Hemsl.

習性：草本或亞灌木。花期：5-6月；果期：6-7月。

產地：香港島、馬鞍山、大帽山。生於林下。

分佈：江蘇、安徽、浙江、江西、福建、湖南、廣西。

用途：藥用。

瓜子金 Mountain *Polygala*

Polygala japonica Houtt.

習性：草本。花期：4-5月；果期：5-8月。

產地：大帽山。生於山坡草地。

分佈：全國各地。朝鮮、日本、俄羅斯遠東地區、越南、菲律賓、新幾內亞。

用途：藥用。

大葉金牛（岩生遠志）

Polygala latouchei Franch.

習性：亞灌木。花期：1-3月。

產地：八仙嶺、沙頭角，生於溪邊。

分佈：湖南、廣東、廣西

用途：藥用。

齒果草屬 *Salomonina* Lour.

齒果草（莎蘿莽） *Salomonina*

Salomonina cantoniensis Lour.

習性：草本。花期：7-8月；果期：8-10月。

產地：香港島、馬鞍山、打鐵崗、烏蛟騰、大嶼山。生於山坡林下。

分佈：華東、華中、華南和西南地區。印度、緬甸、泰國、越南、菲律賓、澳大利亞。

用途：藥用。

寄生鱗葉草

†*Salomonina elongata* (Blume) Kurz ex Koord.

習性：寄生草本。花期：9月。

產地：紫羅蘭山、大帽山。生於濕潤的林下。

分佈：海南、雲南。緬甸、馬來西亞、印度尼西亞。

橢圓葉齒果草 (睫毛齒果草) Ciliate
Salomonina

Salomonina oblongifolia DC. [*Salomonina ciliata* auct. non (L.) DC.: Check List HK Pl. 1993.]

習性：草本。花期：9月。

產地：粉嶺，生於山坡、草地。

分佈：江蘇、江西、福建、臺灣、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南。日本、朝鮮、印度、菲律賓、馬來西亞、澳大利亞。

蟬翼藤屬 *Securidaca* L.

蟬翼藤 (蟬翼木) *Securidaca*

Securidaca inappendiculata Hassk.

習性：攀援灌木。花期：7-8月；果期：10-12月。

產地：香港仔、柏架山、大埔滘、南涌、大嶼山。生於溝谷中。

分佈：廣東、海南、廣西、雲南。印度、緬甸、越南、印度尼西亞、馬來西亞。

用途：纖維、造紙、藥用。

251. 黃葉樹科 Xanthophyllaceae

黃葉樹屬 *Xanthophyllum* Roxb.

黃葉樹

†**Xanthophyllum hainanense** Hu

習性：喬木。花期：3月。

產地：橫山腳下村。生於林中。

分佈：廣東、海南、廣西。

用途：材用。

253. 省沽油科 Staphyleaceae

山香圓屬 *Turpinia* Vent.

銳尖山香圓

Turpinia arguta (Lindl.) Seem.

習性：落葉灌木。

產地：香港各地。生於山谷疏林中。

分佈：廣東、廣西、貴州、四川、湖南、江西、福建。

山香圓

Turpinia montana (Blume) Kurz [*Turpinia cochinchinensis* auct. non (Lour.) Merr.: Check List HK Pl. 1993]

習性：小喬木或灌木。花期：8—10月；果期：8—12月。

產地：香港各地。生於林中。

分佈：華南、西南。中南半島、印度尼西亞。

257. 無患子科 Sapindaceae

倒地鈴屬 *Cardiospermum* L.

倒地鈴 (包袱草) Balloon Vine

Cardiospermum halicacabum L.

習性：草質藤本。花期夏秋，果期秋季至初冬。

產地：香港仔、馬鞍山、大帽山、林村谷、大嶼山。生於田野、灌叢、路邊和林緣。

分佈：熱帶和亞熱帶地區。

用途：全株藥用，有清熱利水、涼血解毒和消腫等功效。

龍眼屬 *Dimocarpus* Lour.

龍眼 Longan

***Dimocarpus longan** Lour.

習性：喬木。花期春夏間，果期秋季。

產地：全港各地均有栽培。

分佈：福建、海南、廣東、廣西、雲南。亞洲東南部。

用途：熱帶水果。木材堅實，用於造船、製作家具。

車桑子屬 *Dodonaea* Miller

車桑子 (坡柳) Clammy Hop Seed

Dodonaea viscosa (L.) Jacq.

習性：灌木或小喬木。花期秋季，果期冬末春初。

產地：汀角路、西貢咸田、大欖涌、白泥、東涌、二浪。生於海邊沙地或曠地。

分佈：華南、西南及華東。全世界熱帶及亞熱帶地區。

假山蘿屬 *Harpullia* Roxb.

假山蘿 (哈莆木)

***Harpullia cupanioides** Roxb.

習性：喬木。花期春夏間，果期秋季。

產地：栽培。
分佈：海南、廣東、雲南。亞洲東南部至伊里安島。
用途：材用。

欒樹屬 *Koelreuteria* Laxm.

複羽葉欒樹 Goldenrain-tree

**Koelreuteria bipinnata* Franch.

習性：喬木。花期 7-9 月，果期 8-10 月。
產地：栽培。
分佈：雲南、貴州、四川、湖北、湖南、廣西、廣東。
用途：觀賞、藥用。

荔枝屬 *Litchi* Sonn.

荔枝 Lychee

**Litchi chinensis* Sonn.

習性：喬木。花期春季，果期夏季。
產地：全港各地有栽培。
分佈：福建、海南、廣東、廣西、雲南、四川。亞洲東南部。
用途：水果、藥用。

無患子屬 *Sapindus* L.

無患子（木患子）Soap Berry

Sapindus saponaria L. (*Sapindus mukorossi* Gaertn.)

習性：喬木。花期春季，果期夏秋。
產地：香港仔、林村、大菴、梧桐寨。
分佈：華東、華南、西南、華中。日本、朝鮮、中南半島、印度。
用途：根和果入藥，有小毒，具有清熱解毒之效能。果皮含皂素，可代肥皂。

259. 槭樹科 *Aceraceae*

槭樹屬 *Acer* L.

三角槭

†**Acer buergerianum* Miq.

習性：落葉喬木。花期 4 月，果期 8 月。
產地：公園或行道旁栽植。
分佈：華南、華東、華中、西南。日本。

雞爪槭

†**Acer palmatum* Thunb.

習性：落葉小喬木。花期 5 月，果期 9 月。

產地：龍仔有栽培。

分佈：貴州、湖北、山東、河南、江蘇、浙江、安徽、江西、湖南。朝鮮、日本。
用途：觀賞。

網脈槭（長葉槭）Long-leaved Maple

Acer reticulatum Champ. [*Acer laevigatum* var. *reticulatum* (Champ.) Rehd.]

習性：常綠小喬木。花期 12 月至翌年 1 月，果期 5—6 月。
產地：深水灣、石澳、大潭、香港仔、薄扶林、扯旗山、火炭、馬鞍山、大帽山。生於疏林中。
分佈：廣東。

濱海槭（華南飛蛾槭）South China Maple

Acer sino-oblongum Metc. (*Acer lanceolatum* Moll.)

習性：常綠小喬木。花期 4 月，果期 9 月。
產地：香港島、大潭、淺水灣、香港仔、高信山、八仙嶺、新娘潭、青衣島。生於疏林中。
分佈：廣東。

嶺南槭 Tutcher's Maple

Acer tutcherii Duthie

習性：落葉喬木。花期 4 月，果期 9 月。
產地：扯旗山、馬鞍山、大東山。生於疏林中。
分佈：廣東、廣西、湖南、江西、福建、浙江。

260. 橄欖科 *Burseraceae*

橄欖屬 *Canarium* L.

橄欖（白欖）Chinese White Olive

**Canarium album* (Lour.) Raeusch.

習性：喬木。花期 4—5 月，果期 10—12 月。
產地：栽培。
分佈：臺灣、福建、海南、廣東、廣西、雲南。越南，日本（長崎、沖繩）及馬來半島有栽培。
用途：行道樹、材用；果供生食，為嶺南佳果之一。

烏欖 Black Olive

**Canarium tramdenum* Dai & Yakovl.
(*Canarium pimela* Koenig)

習性：喬木。花期夏季，果期8月。

產地：栽培。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南南部各地常見栽培。越南、老撾、柬埔寨。

用途：材用；果用於製作涼果或欖角。

261. 漆樹科 Anacardiaceae

南酸棗屬 *Choerospondias* B. L.
Burt & A. W. Hill.

南酸棗 (酸棗) Hog Plum

Choerospondias axillaris (Roxb.) Burt & Hill

習性：落葉喬木。花期夏初，果期秋季。

產地：香港島、城門、大帽山、茅坪、大埔滘、沙螺洞。常生於林中或栽培。

分佈：華南、西南。印度、中南半島。

用途：作行道樹。木材用於製作箱板和木屐等。

人面子屬 *Dracontomelon* Blume

人面子 Yanmin

**Dracontomelon duperreanum* Pierre
[*Dracontomelon dao* auct. non (Blanco)
Merr. & Rolfe: Check List HK Pl.
1993.]

習性：常綠大喬木。

產地：栽培。

分佈：廣西。越南。

用途：果可生食。木材為建築和家具用材。

杧果屬 *Mangifera* L.

杧果 Mango

**Mangifera indica* L.

習性：常綠大喬木。花期春季，果期夏秋。

產地：栽培。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、臺灣、福建有栽培。原產印度、中南半島、馬來半島和印度尼西亞。

用途：水果，行道樹。果核入藥。樹皮和葉可提取黃色染料。木材適於作船舶和車輛的板材。

黃連木屬 *Pistacia* L.

大西洋黃連木 Pistache

†**Pistacia atlantica* Desf.

習性：落葉喬木。

產地：栽培。

分佈：原產加那利群島、地中海地區。

用途：觀賞。

黃連木

†**Pistacia chinensis* Bunge

習性：落葉喬木。

產地：栽培。

分佈：華南、華東、華中、西南、華北。菲律賓。

用途：木材可作家具和造船用材。種子油用於作潤滑劑和制皂。全株可作農藥。

漆樹屬 *Rhus* L.

鹽膚木 Sumac

Rhus chinensis Mill.

習性：灌木或小喬木。花期夏末，果期秋季。

產地：香港各地。生於灌叢或疏林中。

分佈：華南、華東、華中、西南。亞洲東南部至東部。

用途：樹皮和葉上長的蟲瘻稱五倍子，為重要的工業原料，亦可入藥。

白背鹽膚木 (白背漆) Sumac

Rhus hypoleuca Champ. ex Benth.

習性：灌木或小喬木。花期夏季，果期秋季。

產地：香港各地。生於林中。

分佈：廣東、臺灣。

木蠟樹 (野漆樹) Wax Tree

Rhus succedanea L.

習性：灌木或小喬木。花期春季，果期秋季。

產地：香港各地。生於林中或灌叢。

分佈：長江流域以南各省、區。亞洲東南部至東部。

用途：果皮和種子為工業原料。

青香木屬 *Schinus* L.

巴西青香木 Brazilian Pepper-tree,
Christmas-berry Tree

†**Schinus terebinthifolia* Raddi

習性：常綠喬木。

產地：栽培。

分佈：廣州有栽培。原產巴西、巴拉圭。

用途：觀賞。

檳榔青屬 *Spondias* L.

食用檳榔青 Otaheite Apple

†**Spondias dulcis* Soland. ex Park

習性：喬木。果期 10 月至翌年 1 月。

產地：栽培。

分佈：廣東有栽培。原產社會群島。

用途：食用、觀賞，亦作行道樹。

263. 苦木科 *Simaroubaceae*

臭椿屬 *Ailanthus* Desf.

常綠臭椿(福氏臭椿) *Green Ailanthus*

Ailanthus fordii Nootboom

習性：常綠小喬木。花期：10-11 月；果期：12 月至翌年 4 月。

產地：鶴咀、歌賦山、沙田、馬鞍山。生於丘陵或山地雜木林中。

分佈：雲南的西雙版納。

用途：行道樹。

鴉膽子屬 *Brucea* J. F. Mill.

鴉膽子(苦參子) *Java Brucea*

Brucea javanica (L.) Merr.

習性：灌木或小喬木。花期：夏季；果期：8-10 月。

產地：香港各地。生於曠野或山麓灌叢或疏林中。

分佈：臺灣、福建、廣東、海南、廣西、雲南。亞洲東南部至大洋洲。

用途：藥用。

苦樹屬 *Picrasma* Blume

苦樹 *Indian Quassia wood*

Picrasma quassioides (D. Don) Benn.

習性：落葉喬木。花期：4-5 月；果期：6-9 月。

產地：香港島、大嶼山。生於山地雜木林中。

分佈：黃河流域及其以南各省區。印度北部、不丹、尼泊爾、朝鮮、日本。

265. 楝科 *Meliaceae*

米仔蘭屬 *Aglaia* Lour.

米仔蘭 *Chu-lan Tree*

**Aglaia odorata* Lour.

習性：灌木或小喬木。花期：5-12 月；果期：7 月至翌年 3 月。

產地：公園及庭園栽培。

分佈：臺灣、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川。中南半島。

用途：觀賞、窰茶。

小葉米仔蘭

Aglaia odorata var. *microphyllina* C. DC.

習性：常綠灌木。

產地：公園及庭園栽培。

分佈：海南。

麻楝屬 *Chukrasia* A. Juss.

麻楝 *Chittagong Chickrassy*

Chukrasia tabularia A. Juss.

習性：喬木。花期：4-5 月；果期：7 月至翌年 1 月。

產地：公園及行道栽植。

分佈：廣東、廣西、雲南、西藏。尼泊爾、印度、斯里蘭卡、中南半島、馬來半島。

檉木屬 *Dysoxylum* Blume

香港檉木 *Hongkong Dencilwood*

Dysoxylum hongkongense (Tutch.) Merr.

習性：喬木。花期：5-7 月和 10-12 月；果期：11-12 月和 3-6 月。

產地：柏架山、鶴咀、梧桐寨。生於低、中海拔山地密林或疏林中。

分佈：廣東、海南、廣西、雲南。

用途：木材。

非洲楝屬 *Khaya* A. Juss.

非洲楝

†**Khaya senegalensis* (Desr.) A. Juss.

習性：常綠喬木。

產地：近年引種作行道樹。

分佈：熱帶非洲和馬達加斯加。

用途：木材、行道樹。

楝屬 *Melia* L.

楝(苦楝) *Chinaberry*

**Melia azedarach* L.

習性：落葉喬木。花期：4-5 月；果期：10-12 月。

產地：香港島、新界及大嶼山等地。

分佈：黃河以南各省區。

山道楝屬 *Sandoricum* Cav.

山道楝 *Sentul*

**Sandoricum koetjapa* (Burm. f.) Merr.

習性：喬木。花期：5-7 月。

產地：公園栽培。

分佈：原產馬來西亞。

桃花心木屬 *Swietenia* Jacq.

桃花心木 *Cuba Mahogany*

**Swietenia mahagoni* (L.) Jacq.

習性：常綠喬木。花期：5-6 月；果期：10-11 月。

產地：栽培。

分佈：臺灣、福建、廣東、海南、廣西、雲南有栽培。原產南美洲。

用途：木材。

香椿屬 *Toona* Roem.

香椿 *Chinese Mahogany*

Toona sinensis (A. Juss.) Roem.

習性：落葉喬木。花期：6-8 月；果期：10-12 月。

產地：公園栽培。

分佈：華北、華東、華中、華南及西南各省區栽培。

用途：材用、嫩葉可食。

266. 芸香科 *Rutaceae*

山油柑屬 *Acronychia* S. R. & G.
Forst.

山油柑(降真香) *Acronychia*

Acronychia pedunculata (L.) Miq.

習性：喬木。花期：4-8 月；果期：8-12 月。

產地：香港各地常見。生於林緣和疏林下。

分佈：海南、廣東、廣西、福建、臺灣、雲南。

用途：藥用，材用。

木橘屬 *Aegle* Correa

木橘(肖木蘋果) *Beal Fruit*

**Aegle marmelos* (L.) Correa

習性：喬木。果期：10 月。

產地：香港有引種。

分佈：雲南(西雙版納)。印度、緬甸、老撾、越南、柬埔寨、泰國、馬來西亞、印度尼西亞。

用途：藥用。

柑橘屬 *Citrus* L.

來檬 *Lime*

**Citrus aurantiifolia* (Christm.) Swingle

習性：小喬木。果期：10 月。

產地：栽培。

分佈：雲南有引種。原產印度、緬甸。

用途：水果。

黎檬 *Canton lemon*

**Citrus limonia* Osb.

習性：小喬木。花期：4-5 月；果期：9-10 月。

產地：香港有引種栽培。

分佈：廣東、廣西、貴州、湖南、福建、臺灣。

用途：藥用、食用。

柚 *Pummelo ; Pomelo*

**Citrus maxima* (Burm.) Merr.

習性：喬木。花期：4-5 月；果期：9-12 月。

產地：栽培。

分佈：長江以南一帶廣為栽培。東南亞各國有引種。

用途：水果、藥用。

香櫞(枸櫞) *Citron*

**Citrus medica* L.

習性：小喬木。花期：4-5 月；果期：10-11 月。

產地：偶有栽培。

分佈：廣東、廣西、福建、臺灣、雲南等省區有栽培。越南、老撾、緬甸、印度。

用途：藥用。

佛手 Finger Citron

***Citrus medica** var. **sarcodactylis**
(Nooteboom) Swingle

習性：小喬木。花期：4-5 月；果期：10-11 月。

產地：偶有栽培。

分佈：長江以南各地有栽培。

用途：藥用。

葡萄柚 (西柚) Grape Fruit

***Citrus × paradisi** Macfad. (*Citrus maxima* ×
Citrus sinensis)

習性：小喬木。果期：10-11 月。

產地：新界有引種栽培。

分佈：廣東、四川、浙江有引種。

用途：食用。

柑橘 Tangerine

***Citrus reticulata** Blanco

習性：小喬木。花期：4-5 月；果期：10-12 月。

產地：栽培。

分佈：秦嶺以南各省區廣泛栽培或半野生。

用途：水果、藥用。

甜橙 (橙) Sweet Orange

***Citrus sinensis** (Linn) Osb.

習性：喬木。花期：3-5 月；果期：10-12 月。

產地：栽培。

分佈：秦嶺南坡以南各省區廣泛栽培。原產我國南部。

用途：水果。

黃皮屬 *Clausena* Burm. f.

黃皮 Wampi

***Clausena lansium** (Lour.) Skeels

習性：小喬木。花期：4-5 月；果期：7-8 月。

產地：栽培。

分佈：海南、廣東、廣西、福建、臺灣、貴州有栽培。原產我國南部。

用途：水果。

金橘屬 *Fortunella* Swingle

山橘 Mountain Kumquat

Fortunella hindsii (Champ. ex Benth.)
Swingle

習性：灌木。花期：4-5 月；果期：10-12 月。

產地：香港島、鑽石山、西貢、大帽山、馬鞍山、粉嶺、大嶼山。生於次生林或灌叢中。

分佈：廣東、廣西、江西、湖南、福建、安徽。

用途：藥用。

金柑 (圓金橘) Round Kumquat

Fortunella japonica (Thunb.) Swingle

習性：小喬木。花期：4-8 月。

產地：栽培。

分佈：廣東、海南、福建、浙江、臺灣。

金橘 Oval Kumquat

***Fortunella margarita** (Lour.) Swingle

習性：灌木。花期：4-5 月；果期：11 月至翌年 1 月。

產地：栽培。

分佈：華南各地有栽培。

用途：藥用。

山小橘屬 *Glycosmis* Correa

小花山小橘 (山小橘) *Glycosmis*

Glycosmis parviflora (Sims) Kurz

習性：灌木或小喬木。

產地：香港島、城門、西貢、沙田、大埔、粉嶺、大嶼山。生於村邊風水林中。

分佈：海南、廣西、廣東、福建、臺灣、雲南、貴州。

用途：藥用。

密茱萸屬 *Melicope* J. R. & G.
Forst.

密茱萸 (三樞苦) Thin *Evodia*

Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.
Hartley [*Evodia lepta* (Spreng.) Merr.]

習性：灌木或小喬木。

產地：馬鞍山、大帽山、西貢、香港島。生

於次生林中或灌叢中。
分佈：海南、廣西、廣東、江西、福建、臺灣、雲南、貴州。越南、老撾、泰國。
用途：藥用。

九里香屬 *Murraya* Koenig ex L.

九里香 Orange Jasmine

**Murraya paniculata* (L.) Jack. (*Murraya exotica* L.)

習性：小喬木。花期：4-8 月；果期：9-12 月。

產地：栽培或逸為野生。

分佈：海南、廣東、廣西、福建、臺灣。

用途：藥用、作綠籬或盆景材料。

調料九里香 Curry-leaf tree

†**Murraya koenigii* (L.) Spreng.

習性：灌木或小喬木。花期：3-4 月；果期：7-8 月。

產地：嘉道理農場有引種。

分佈：海南、雲南。老撾、緬甸、印度。

芸香屬 *Ruta* L.

芸香 (臭草) Common Rue

Ruta graveolens L.

習性：多年生草本。花期：7-8 月。

產地：栽培。

分佈：長江以南偶見栽培。原產地中海沿岸。

用途：觀賞、藥用。

酒餅筋屬 *Severinia* Ten. ex Endl.

酒餅筋 Boxleaf *Atalantia*

Severinia buxifolia (Poir.) Ten. [*Atalantia buxifolia* (Poir.) Oliv.]

習性：灌木。花期：5-12 月；果期：9-12 月。

產地：西貢、大嶼山、九龍、香港島。生於灌叢中。

分佈：海南、廣東、廣西、福建、臺灣。

用途：藥用。

茵芋屬 *Skimmia* Thunb.

喬木茵芋 Tree *Skimmia*

Skimmia arborescens Anders. ex Gamble

習性：小喬木。花期：4-6 月；果期：7-9 月。

產地：大帽山。生於山谷次生林中。

分佈：廣東、廣西、貴州。緬甸、印度、錫金、不丹、尼泊爾。

四數花屬 *Tetradium* Lour.

棟葉吳茱萸 Melia-leaved *Evodia*

Tetradium glabrifolium (Champ. ex Benth.) Hartley [*Evodia trichotoma* (Lour.) Pierre]

習性：喬木。花期：7-9 月；果期：10-12 月。

產地：香港仔、西貢、新娘潭、大嶼山。

分佈：海南、廣東、廣西、福建、臺灣、雲南。

用途：藥用。

飛龍掌血屬 *Toddalia* A. Juss.

飛龍掌血 (筋鈎) Lopez Root

Toddalia asiatica (L.) Lam.

習性：灌木。花期：夏季；果期：秋冬季。

產地：香港島、筆架山、大帽山、大埔滘、鹿頸、大嶼山。

分佈：秦嶺南坡以南各地。

用途：藥用。

花椒屬 *Zanthoxylum* L.

椿葉花椒 (樗葉花椒) *Ailanthus*-like Pricklyash

Zanthoxylum ailanthoides Sieb. & Zucc.

習性：喬木。花期：8-9 月；果期：10-12 月。

產地：蕉坑、赤徑、大浪、西灣、蘆慈田、大尾篤。生於灌叢和林中。

分佈：長江以南各省區。

筋欖花椒 Prickly Ash

Zanthoxylum avicennae (Lam.) DC.

習性：喬木。花期：6-8 月；果期：10-12 月。

產地：香港各地常見。生於次生林中或灌叢中。

分佈：海南、廣東、廣西、福建、臺灣、雲南。

用途：藥用。

大葉臭花椒 Bigleaf Pricklyash

Zanthoxylum myriacanthum Wall. ex Hook.
f. (*Zanthoxylum rhesoides* Drake)

習性：喬木。花期：6-8月；果期：9-11月。
產地：新娘潭、八仙嶺、南涌、鹿頸。生於
次生林中或路旁。

分佈：海南、廣東、廣西、福建、雲南、貴
州。

用途：藥用。

兩面針 Shinyleaf Pricklyash

Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC

習性：木質藤本。花期：3-5月；果期：9-11
月。

產地：香港各地常見。生於低海拔的次生林
中或灌叢中。

分佈：海南、廣東、廣西、福建、臺灣、雲
南、貴州。

用途：藥用。

異葉花椒 Diversifolious Pricklyash

Zanthoxylum ovalifolium Wight

習性：喬木。花期：4-6月；果期：9-11月。

產地：柏架山。生於次生林中。

分佈：秦嶺以南各省區。

用途：藥用。

花椒籐 Climbing Pricklyash

Zanthoxylum scandens Blume

習性：木質藤本。花期：3-5月；果期：7-9
月。

產地：香港各地常見。生於次生林中或灌叢
中。

分佈：長江以南各省區。東南亞。

268. 酢漿草科 Oxalidaceae

楊桃屬 *Averrhoa* L.

楊桃 *Carambola*

**Averrhoa carambola* L.

習性：常綠小喬木。花期：5—6月。

產地：栽培。

分佈：原產於馬來西亞，現廣佈於熱帶、亞

熱帶地區。

用途：水果。

酢漿草屬 *Oxalis* L.

酢漿草 *Sorrel*

***Oxalis corniculata* L.**

習性：多年生草本。花期：3—10月。

產地：香港各地。生於路邊、荒地中。

分佈：廣佈於亞洲溫帶和熱帶地區。

紅花酢漿草 *Lavender Sorrel*

****Oxalis corymbosa* DC.**

習性：多年生草本。花期：3—12月。

產地：香港各地。生於耕地邊、路邊、荒地
中。

分佈：原產熱帶美洲，現在中國南部逸為野
生。

269. 牻牛兒苗科 Geraniaceae

牻牛兒苗屬 *Erodium* L'Her.

芹葉 (牻牛兒苗) *Red Stem Filaree*

****Erodium cicutarium* (L.) L'Her.**

習性：一年或多年生草本。

產地：栽培。

分佈：江蘇、廣東、內蒙古、西北。原產歐
洲。

用途：飼料。

天竺葵屬 *Pelargonium* L'Her.

香葉天竺葵 (香葉) *Rose Geranium*

****Pelargonium graveolens* L'Her.**

習性：多年生草本。

產地：庭園栽培。

分佈：全國各地有栽培。原產南非。

用途：芳香及觀賞植物。

天竺葵 (洋葵) *Geranium*

****Pelargonium hortorum* Bailey**

習性：多年生草本。

產地：公園及庭園栽培。

分佈：全國各地栽培。原產南非。

用途：觀賞。

271. 旱金蓮科 Tropaeolaceae

旱金蓮屬 *Tropaeolum* L.

旱金蓮 Garden Nasturtium

**Tropaeolum majus* L.

習性：一年生或多年生草本。花期：夏秋季。

產地：栽培。

分佈：原產南美洲。各地有栽培。

用途：觀賞。

272. 鳳仙花科 Balsaminaceae

鳳仙花屬 *Impatiens* L.

鳳仙花 Garden Balsam

**Impatiens balsamina* L.

習性：一年生草本。花期：夏秋季。

產地：公園及庭園栽培。

分佈：我國各地有栽培。廣佈於世界溫帶及熱帶地區。

用途：藥用、觀賞。

華鳳仙 Touch-me-not

Impatiens chinensis L.

習性：一年生草本。花期：夏季。

產地：粉嶺、馬鞍山、川龍、白沙澳、新娘潭、東涌。生於溝邊或沼澤地上。

分佈：海南、廣東、廣西、江西、浙江。緬甸、越南。

香港鳳仙 Hong Kong Balsam

Impatiens hongkongensis Grey-Wilson

習性：多年生草本。

產地：城門、梧桐寨、大埔滘、大帽山。生於溪邊或林下陰濕處。

非洲鳳仙 African Balsam

**Impatiens walleriana* Hook. f.

習性：多年生草本。

產地：栽培或逸為野生。

分佈：原產非洲，現不少熱帶地區有栽培。

用途：觀賞。

273. 五加科 *Araliaceae*

楸木屬 *Aralia* L.

虎刺楸木 Spine *Aralia*

Aralia armada (Wall.) Seem (*Aralia chinensis* auct. non L.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：灌木。花期：9月；果期：11月。

產地：新界、大嶼山。生於林下。

分佈：江西、廣東、海南、廣西、貴州、雲南。緬甸、印度、馬來西亞、錫金、越南。

用途：草藥。

黃毛楸木（黃楸） Yellow hair *Aralia*

Aralia decaisneana Hance (*Aralia dasyphylla* Miq. auct. non L.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：灌木。花期：10月；果期：12月

產地：香港各地。生於向陽山坡。

分佈：安徽、福建、廣東、廣西、貴州、湖南、江西、臺灣、雲南。

樹參屬 *Dendropanax* Dence. & Planch.

樹參 Dentifcrous *Dendropanax*

Dendropanax dentigerus (Harms) Merr.

習性：小喬木。花期：8月；果期：10月。

產地：鳳凰山、大嶼山、大東山。生於灌叢。

分佈：安徽、福建、廣東、廣西、貴州、湖北、湖南、江西、四川、浙江。柬埔寨、老撾、越南。

變葉樹參 Biformleaf *Dendropanax*

Dendropanax proteus (Champ.) Benth.

習性：灌木。花期：8月；果期：9月

產地：香港各地。生於山谷林中。

分佈：福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南。

五加屬 *Eleutherococcus* Maxim.

白 筊（白 筊 花） Three-leaved *Eleutherococcus*

Eleutherococcus trifoliatus (L.) S. Y. Hu [*Acanthopanax trifoliatus* (L.) Merr.]

習性：藤狀灌木。花期：8-11 月；果期：9-12 月

產地：香港各地。生於山谷或林地。

分佈：長江以南各省區、臺灣。印度、日本、菲律賓、越南。

八角金盤屬 *Fatsia* Decne. & Planch.

八角金盤 Japanese *Fatsia*

**Fatsia japonica* (Thunb.) Decne. & Planch.

習性：灌木。花期：11 月。

產地：栽培。

分佈：原產日本。

用途：觀賞。

常春藤屬 *Hedera* L.

洋常春藤 Ivy

**Hedera helix* L.

習性：常綠藤本。

產地：栽培。

分佈：原產歐洲及西亞。

用途：觀賞。

幌傘楓屬 *Heteropanax* Seem.

幌傘楓(火通木)

**Heteropanax fragrans* (Roxb.) Seem.

習性：喬木。花期：10 月。

產地：栽培。

分佈：福建、廣東、海南、廣西、雲南。印度、印度尼西亞、緬甸、越南。

用途：材用、藥用。

南洋參屬 *Polyscias* J. R. & G. Forst.

南洋參 Ming *Aralia*

**Polyscias fruticosa* (L.) Harms

習性：小喬木。花期：8-9 月

產地：栽培。

分佈：海南有栽培。原產馬來西亞、波利尼西亞，現各地常有栽培。

用途：藥用、觀賞。

銀邊南洋參(假沙梨) Wild Coffe

Polyscias guilfoylei (Cogn. & Mard.) Bailey

習性：小喬木。

產地：栽培。

分佈：福建、廣東、海南有栽培。原產太平洋群島。

用途：觀賞。

鵝掌藤屬 *Schefflera* G. R. & Forst.

鵝掌藤 Miniature Umbrella Plant

**Schefflera arboricola* (Hay.) Merr.

習性：藤狀灌木。花期：7-10 月。

產地：栽培。

分佈：海南、臺灣。

用途：藥用。

鵝掌柴(鴨腳木) Ivy Tree

Schefflera heptaphylla (L.) D. G. Frodin

[*Schefflera octophylla* (Lour.) Harms]

習性：喬木。花期：11-12 月。

產地：香港各地。生於林下、坡地。

分佈：福建、貴州、廣東、廣西、江西、湖南、雲南、西藏、浙江。印度、日本、越南。

用途：材用、藥用。

通脫木屬 *Tetrapanax* K. Koch

通脫木

Tetrapanax papyriferus (Hook.) K. Koch

[*Fatsia japonica* auct. non (Thunb.)

Decne & Planch.: Check List HK Pl. 1993.]

習性：灌木。花期：10-12 月；果期：1-2 月。

產地：香港島。生於密林中。

分佈：福建、廣東、廣西、貴州、湖南、湖北、江西、山西、陝西、四川、臺灣、雲南、浙江。

用途：藥用、觀賞。

274 · 傘形科

Umbelliferae(Apiacea e)

芹菜屬 *Apium* L.

芹菜 Celery

**Apium graveolens* L.

習性：一年生草本。花期：3 月。

產地：栽培。
分佈：我國及世界各地均有栽培。
用途：蔬菜。

細葉旱芹 (落葉芹) Thin Leaved Celery
Apium leptophyllum F. Muell

習性：草本。花期：5月。
產地：扯旗山、石澳道。生於雜草地及水溝邊。
分佈：江蘇、福建、臺灣、廣東。美洲、大洋洲、日本、馬來西亞、印度尼西亞。

積雪草屬 Centella L.

積雪草 (崩大碗) Moneywort

Centella asiatica (L.) Urban
習性：匍匐草本。花果期：3-8月。
產地：香港各地。生於陰濕草地或水溝邊。
分佈：陝西、江蘇、安徽、浙江、江西、湖北、湖南、福建、臺灣、廣東、廣西、雲南、四川。馬來西亞、印度尼西亞、大洋洲、日本、澳大利亞及中非、南非。
用途：藥用。

芫荽屬 Coriandrum L.

芫荽 Coriandra

***Coriandrum sativum** L.
習性：一年生草本。花果期：4-11月。
產地：栽培。
分佈：全國大部分地區廣為栽培。原產歐洲地中海地區。
用途：蔬菜和調香料。

胡蘿蔔屬 Daucus L.

胡蘿蔔 (金筍) Carrot

***Daucus carota** var. **sativa** DC.
習性：多年生草本。花期：6月。
產地：栽培。
分佈：全國及世界各地廣泛栽培。原產地中海沿岸及亞洲西部。
用途：蔬菜。

刺芹屬 Eryngium L.

刺芹 (假芫荽)

Eryngium foetidum L.

習性：多年生草本。花果期：4-8月。
產地：元墩下、鹿頸、西貢昂平、大嶼山。生於山地林下陰濕處。
分佈：廣東、廣西、雲南、貴州。南美、亞洲、非洲的熱帶地區。
用途：食用香料及藥用。

茴香屬 Foeniculum Mill.

茴香 Common Fennel

* **Foeniculum vulgare** Mill.
習性：一年生草本。花期：5-6月。
產地：栽培。
分佈：全國各地都有栽培。原產地中海地區。
用途：蔬菜、調味料、藥用(果實)。

珊瑚菜屬 Glehnia Fr. Schmidt ex Miq.

珊瑚菜 (北沙參)

Glehnia littoralis Fr. Schmidt ex Miq.
習性：多年生草本。花果期：4-7月。
產地：浪茄、西貢大浪灣、咸田灣、大灣。生於海邊沙灘。
分佈：遼寧、河北、山東、江蘇、浙江、廣東、福建、臺灣。日本、朝鮮、俄羅斯。
用途：藥用。

天胡荽屬 Hydrocotyle Lam.

天胡荽 Asiatic Pennywort

Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
習性：多年生草本。花果期：5-7月。
產地：香港各地。生於濕潤草地、河溝邊林下。
分佈：陝西、江蘇、安徽、浙江、江西、湖北、湖南、福建、臺灣、四川、雲南、貴州、廣東、廣西。朝鮮、日本、東南亞至印度。
用途：藥用。

破銅錢

†**Hydrocotyle sibthorpioides** var. **batradium** (Hance) Hand.-Mazz. ex Shan
習性：多年生草本。花果期：6-8月。
產地：大埔。生於濕地上。

分佈：安徽、浙江、江西、湖北、湖南、福建、臺灣、四川、廣東、廣西。越南。

腎葉天胡荽 (惠氏天胡荽) Wiford's Pennywort

Hydrocotyle wilfordi Maxim

習性：多年生草本。花果期：9-11月。
產地：城門、林村、大帽山、茅坪，生於陰濕的山谷、溝邊、溪旁。
分佈：浙江、江西、福建、四川、廣東、廣西、雲南。朝鮮、日本、越南。

水芹屬 *Oenanthe* L.

短幅水芹 (少花水芹) Few-flowered Water Celery

Oenanthe benghalensis Benth. & Hook. f

習性：多年生草本。花果期：3-5月。
產地：薄扶林、鹿頸。生於山坡林下溪邊。
分佈：四川、雲南、廣東。日本、印度。

水芹 Water Celery

Oenanthe javanica (Blume) DC.

習性：多年生草本。花期：3-6月。
產地：大潭、梧桐寨。生於淺水低地或溝旁。
分佈：全國各地。印度、緬甸、越南、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓。
用途：蔬菜。

山芹屬 *Osterium* Hoffm.

隔山香 (檸檬香鹼草)

Osterium citriodorum (Hance) Yuan & Shan
[*Angelica citriodora* Hance]

習性：草本。花果期：9-10月。
產地：馬鞍山、大帽山、田夫仔、粉嶺。生於山坡灌叢或林緣。
分佈：浙江、江西、湖南、福建、廣東、廣西。

歐芹屬 *Petroselinum* Hill.

歐芹 (洋芫荽) Parsley

***Petroselinum crispum** (Mill.) Hill

習性：草本。花期：6月。
產地：栽培。
分佈：原產地中海地區。

用途：蔬菜。

前胡屬 *Peucedanum* L.

前胡 (白花前胡)

Peucedanum praeruptorum Dunn
(*Peucedanum medicum* auct. non Dunn.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：多年生草本。花果期：8月。
產地：清水灣。生於山坡草叢或路旁。
分佈：甘肅、河南、貴州、廣西、四川、湖北、湖南、江蘇、安徽、浙江、江西、福建。
用途：藥用。

茴芹屬 *Pimpinella* L.

異葉茴芹

Pimpinella diverifolia DC.

習性：多年生草本。花果期：7-9月。
產地：大嶼山。生於山坡草叢和林下。
分佈：華東、華中、華南、西南至西藏。越南、巴基斯坦、印度、阿富汗、尼泊爾、日本。

變豆菜屬 *Sanicala* L.

薄片變豆菜

Sanicala lamelligera Hance [*Sanicala orthacantha* auct. non S. Moore: Check List HK Pl. 1993.]

習性：多年生草本。
產地：大帽山、大東山。生於山坡林下溝谷。
分佈：安徽、浙江、江西、湖北、臺灣、廣東、廣西、四川、貴州。日本
用途：藥用。

275. 馬錢科

Loganiaceae [incl.
Strychnaceae
(**Spigeliaceae**)]

蓬萊葛屬 *Gardneria*

蓬萊葛 (多花蓬萊葛) Manyflower
Gardneria

Gardneria multiflora Makino (*Gardneria hongkongensis* Hayata)

習性：木質藤本。花期：3-7月；果期：8-11月。

產地：大潭、西灣。生於灌木叢中或疏林下。
分佈：華北、華東、華南及西南。日本。
用途：藥用、觀賞。

鈎吻屬 *Gelsemium* Juss.

鈎吻 (胡蔓藤、斷腸草) Graceful Jesamine
Gelsemium elegans (Gardn. & Champ.)
Benth.

習性：藤本。花期：5-11 月；果期：8-翌年
2 月。

產地：馬鞍山、大埔滘、林村、梧桐寨、河
背、西貢。

分佈：浙江、江西、湖南、福建、臺灣、廣
東、海南、廣西、貴州、雲南。印度、
緬甸、泰國、越南、老撾、印度尼西
亞。

用途：藥用。全株有劇毒。

尖帽草屬 *Mitrasacme* Labill.

姬苗 *Mitrasacme*

Mitrasacme indica Wight (*Mitrasacme*
alsinoides auct. non R. Br: Check List
HK Pl. 1993.)

習性：一年生草本。花期：2-3 月。

產地：大帽山、新界。生於草地。

分佈：海南、臺灣、福建、江蘇、山東。東
亞、東南亞至澳大利亞。

水田白(裸莖姬苗) Dwarf *Mitrasacme*

Mitrasacme pygmaea R. Br. (*Mitrasacme*
polymorpha auct. non R. Br: Check
List HK Pl. 1993.)

習性：一年生草本。花期：5-8 月；果期：
8-12 月。

產地：大埔滘、羅湖、大嶼山、鶴咀、馬鞍
山、歌賦山、龜頭嶺。生於草地。

分佈：華東、華南及西南。東亞、東南亞至
南亞。

用途：藥用。

馬錢屬 *Strychnos* L.

牛眼馬錢 (狹花馬錢) Narrow Flower
Poisonnut

Strychnos angustiflora Benth.

習性：木質藤本。花期：4-6 月；果期：6-12

月。

產地：香港島、沙田、馬鞍山、三樞村、大
環、大嶼山、南丫島、螺洲、青洲。
生山地灌木叢中。

分佈：福建、廣東、海南、廣西、雲南。越
南、泰國、菲律賓。

用途：藥用。莖皮、葉、種子有毒。

華馬錢 *Cathay Poisonnut*

†*Strychnos cathayensis* Merr.

習性：木質藤本。花期：3-6 月；果期：6-12
月。

產地：馬鞍山、鹿頸。生山地灌木叢中。

分佈：臺灣、廣東、海南、廣西、雲南。越
南。

用途：藥用。

傘花馬錢 (繖花馬錢) Umbellaflower
Poisonnut

Strychnos umbellata (Lour.) Merr.

習性：木質藤本。花期：3-6 月；果期：7-10
月。

產地：香港島、沙田、馬鞍山、青山、大嶼
山。生山地灌木叢中。

分佈：臺灣、廣東、海南、廣西、雲南。越
南。

用途：藥用。種子、根、葉有毒。

276. 龍膽科 *Gentianaceae*

藻百年屬 *Exacum* L.

藻百年

Exacum tetragonum Roxb.

習性：一年生草本。花果期：7—9 月。

產地：歌賦山、鳳凰山、塔門。生於路邊、
草地。

分佈：廣東、廣西、貴州、雲南、江西。東
埔寨、印度、老撾、馬來西亞、緬甸、
尼泊爾、新幾內亞、菲律賓、錫金、
越南、澳大利亞。

龍膽屬 *Gentiana* L.

華南龍膽 *Gentian*

Gentiana loureiroi Griseb.

習性：多年生草本。花果期：2—9 月。

產地：石排灣、灣仔峽、大帽山、粉嶺、八仙嶺。生於路邊山坡、林中。

分佈：海南、廣東、廣西、湖南、江西、福建、臺灣、浙江、江蘇。不丹、印度、緬甸、泰國、越南。

雙蝴蝶屬 *Tripterospermum* Blume

香港雙蝴蝶

Tripterospermum nienkui (Marq.) C. J. Wu
(*Crawfordia fasciculata* Wall.)

習性：多年生纏繞藤本。花果期：9月至翌年1月。

產地：大帽山、銀礦灣、大東山。生於林中。

分佈：廣東、廣西、湖南、福建、浙江。

278 · 夾竹桃科

Apocynaceae

天寶花屬 *Adenium* Roem. & Schult.

天寶花 (沙漠玫瑰) Desert Rose

****Adenium obesum*** (Forssk.) Roem. & Schult.

習性：常綠灌木。花期：4-11月。

產地：公園栽培。

分佈：廣東、海南有引種；原產南非，世界熱帶地區常有栽培。

黃蟬屬 *Allamanda* L.

軟枝黃蟬 *Allamanda*

****Allamanda cathartica*** L.

習性：藤狀灌木。花期：3-8月；果期：10-12月。

產地：公園栽培。

分佈：臺灣、福建、廣東、海南、廣西等地栽培。原產巴西，現廣泛栽培於全世界熱帶地區。

用途：觀賞。

黃蟬 (硬枝黃蟬) *Oleander Allamanda*

****Allamanda schottii*** Pohl (*Allamanda neriifolia* Hook.)

習性：直立灌木。花期：5-8月；果期：10-12月。

產地：公園栽培。

分佈：臺灣、福建、廣東、海南、廣西有栽培。原產巴西，現廣泛栽培於全世界熱帶地區。

用途：觀賞。

雞骨常山屬 *Alstonia* R. Br.

糖膠樹 Devil Tree

****Alstonia scholaris*** (L.) R. Br.

習性：喬木。花期：6-11月；果期：10-12月。

產地：荃灣、九龍公園、新界、沙田、大埔、粉嶺、香港仔等有栽培。

分佈：廣西南部及雲南南部有野生；福建、臺灣、廣東、海南、湖南有栽培。印度、斯里蘭卡、尼泊爾、緬甸、泰國、柬埔寨、越南、新幾內亞、澳大利亞。

用途：藥用、食用 (乳汁制糖膠)、觀賞。

鏈珠藤屬 *Alyxia* Bank R. Br.

鏈珠藤 (念珠藤) Bead Vine

Alyxia sinensis Champ. ex Benth.

習性：木質藤本。花期：4-9月；果期：5-11月。

產地：香港各地。生於灌叢或疏林下。

分佈：臺灣、福建、廣東、海南、廣西、貴州、湖南、江西、浙江。

用途：藥用、觀賞 (室內綠化植物)。

鱗藤屬 *Anodendron* A. DC.

鱗藤 (柃葛) Asian Caffe Creeper

Anodendron affine (Hook. & Arn.) Druce

習性：木質藤本。花期：4-11月；果期：6月至翌年2月。

產地：香港島、沙田、大帽山、西貢、大嶼山。生於山地灌叢或疏林下。

分佈：西南、華南至華東、臺灣。越南、日本、印度。

用途：藥用、觀賞 (室內綠化植物)。

假虎刺屬 *Carissa* L.

刺黃果 Karanda

****Carissa carandas*** L.

習性：灌木。花期：3-6月；果期：7-12月。

產地：維多利亞公園。栽培。

分佈：貴州、廣西、廣東、福建、臺灣有栽培。印度、斯里蘭卡、緬甸、馬來西亞、印度尼西亞。
用途：食用(果)、觀賞。

大花假虎刺 Natal Plum

***Carissa macrocarpa** (Ecklon) A. DC.
(*Carissa grandiflora* E. Mey.)

習性：灌木。花期：6-9 月；果期：10-12 月。

產地：公園栽培。

分佈：福建、廣東有栽培。原產南非，現世界各熱帶地區有引種。

用途：食用(果)、觀賞。

長春花屬 *Catharanthus* G. Don

長春花 Rose Periwinkle

***Catharanthus roseus** (L.) G. Don

習性：亞灌木。花期：3-10 月；果期：10-12 月。

產地：庭園及公園栽培。

分佈：西南、中南、華東等地區有栽培。原產非洲東部，現廣泛栽培於世界熱帶及亞熱帶地區。

用途：藥用、觀賞。

海芒果屬 *Cerbera* L.

海芒果 *Cerbera*

***Cerbera manghas* L.**

習性：喬木。花期：3-10 月；果期：7-12 月。

產地：香港各地。生於海邊或近海邊山坡地。

分佈：廣東、海南、廣西、臺灣。亞洲熱帶地區、澳大利亞。

用途：藥用、觀賞。全株有毒！

鹿角藤屬 *Chonemorpha* G. Don

鹿角藤

****Chonemorpha eriostylis*** Pitard

習性：木質大藤本。花期：3-7 月；果期：8-12 月。

產地：栽培。

分佈：廣東、廣西、雲南。越南。

用途：藥用、觀賞。

腰骨藤屬 *Ichnocarpus* R. Br.

腰骨藤 Shrubby *Ichnocarpus*

Ichnocarpus frutescens (L.) W. T. Aiton
(*Ichnocarpus ovatifolius* A. DC.)

習性：木質藤本。花期：5-8 月；果期：8-12 月。

產地：香港仔、聶高信山、鶴咀、青洲、沙田、林村。生於灌叢或疏林中。

分佈：廣東、廣西、海南、雲南、貴州、福建。熱帶亞洲。

用途：藥用、觀賞。

小花藤 Manyflower *Ichnocarpus*

†***Ichnocarpus polyanthus*** (Blume) D. I. Forst.
[*Microchites polyantha* (Blume) Miq.]

習性：木質藤本。花期：5-8 月；果期：8-12 月。

產地：烏蛟騰。生灌叢中。

分佈：廣東、廣西、海南、雲南。印度、尼泊尔、不丹、緬甸、泰國、老撾、越南、馬來西亞、印度尼西亞。

用途：藥用、觀賞。

蕊木屬 *Kopsia* Blume

蕊木 *Kopsia*

Kopsia arborea Blume (*Kopsia lancibracteolata* Merr.)

習性：喬木。花期：4-9 月；果期：7-12 月。

產地：嘉道理農場。生於林中濕地。

分佈：廣東、廣西、海南、雲南。越南、泰國、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓和澳大利亞北部。

用途：藥用、材用、觀賞。

雞蛋花藤屬 *Mandevilla* Lindl.

雞蛋花藤 White *Dipladenia*

Mandevilla boliviensis (Hook. f.) R. E. Woodson

習性：藤本。

產地：公園栽培。

分佈：原產南美洲。

用途：觀賞。

山橙屬 *Melodinus* J. R. & G. Forst.

尖山橙 Fusiform *Melodinus*

Melodinus fusiformis Champ. ex Benth.

習性：木質藤本。花期：4-9月；果期：6-12月。

產地：柏架山、大潭、扯旗山、馬鞍山、黃竹洋、梧桐寨。生於灌叢或疏林下。

分佈：廣東、廣西、貴州。

用途：藥用、觀賞。果有小毒。

山橙 Mountain Orange

Melodinus suaveolens (Hance) Champ. ex Benth. (*Melodinus monogynus* auct. non Roxb.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：木質藤本。花期：5-11月；果期：8-12月。

產地：香港各地。生於疏林下或灌叢中。

分佈：廣東、廣西、海南。越南。

用途：藥用、觀賞。

夾竹桃屬 *Nerium* L.

夾竹桃 Oleander

***Nerium oleander** L. (*Nerium indicum* Mill.)

習性：大灌木。花期：4-9月。

產地：公園栽培。

分佈：全國各地均有栽培或逸為野生。世界各地常見栽培。

用途：藥用、觀賞。全株有毒。

玫瑰樹屬 *Ochrosia* Juss.

古城玫瑰樹

***Ochrosia elliptica** Labill.

習性：喬木。

產地：栽培。

分佈：原產新喀里多尼亞、澳大利亞。

用途：觀賞。

雞蛋花屬 *Plumeria* L.

鈍葉雞蛋花 Obtuseleaf Frangipani

***Plumeria obtusa** L.

習性：喬木。花期：3-9月；果期：6-12月。

產地：公園栽培。

分佈：廣東、廣西、海南、雲南有栽培。原產加勒比島，現世界熱帶及亞熱帶地區有引種。

用途：藥用、觀賞。

雞蛋花 Frangipani

***Plumeria rubra** L. (*Plumeria rubra* cv. *Acutifolia*)

習性：喬木。花期：3-9月；果期：6-12月。

產地：香港各地常見栽培。

分佈：福建、廣東、廣西均有栽培。原產墨西哥和中美洲。現廣植於世界熱帶及亞熱帶地區。

用途：藥用、觀賞。

簾子藤屬 *Pottsia* Hook. & Arn.

大花簾子藤(大花薄槭藤) Large-flowered *Pottsia*

Pottsia grandiflora Markgr.

習性：木質藤本。花期：4-8月；果期：8-12月。

產地：大帽山、粉嶺、沙田。生於山地疏林或灌叢。

分佈：浙江、湖南、福建、廣東、廣西、雲南。

用途：觀賞。

簾子藤 (疏花薄槭藤)

Pottsia laxiflora (Blume) Kuntze

習性：木質藤本。花期：4-8月；果期：8-10月。

產地：香港島、西貢、鶴藪、大嶼山。生於灌叢或疏林下。

分佈：江西、福建、廣東、廣西、海南、湖南、貴州、雲南、浙江。印度、越南、老撾、柬埔寨、馬來西亞、印度尼西亞。

用途：藥用、觀賞。

蘿芙木屬 *Rauvolfia* L.

蘿芙木 Devil-pepper

Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill.

習性：灌木。花期：2-10月；果期：4-12月。

產地：香港仔、扯旗山、歌賦山、灣仔峽。生於丘陵灌叢。

分佈：臺灣、廣東、廣西、海南、貴州、雲南。印度、斯里蘭卡、緬甸、泰國、越南、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓。

用途：藥用、觀賞。

羊角拗屬 *Strophanthus* DC.

羊角拗 Goat Horns

Strophanthus divaricatus (Lour.) Hook. & Arn.

習性：木質藤本。花期：3-7月；果期：7-11月。

產地：香港各地。生於灌叢或疏林下。

分佈：福建、廣東、海南、廣西、貴州、雲南。越南、老撾。

用途：藥用、觀賞。全株有毒。

狗牙花屬 *Tabernaemontana* L.

藥用狗牙花 Medicinal *Tabernaemontana*

****Tabernaemontana bovina*** Lour. (*Ervatamia pallida* Pierre ex Spire)

習性：灌木。花期：5-7月；果期：8-12月。

產地：公園栽培。

分佈：海南、廣西、雲南。越南、泰國。

用途：藥用。

狗牙花 Crepe Gasmine

****Tabernaemontana divaricata*** (L.) R. Br. ex Roem. & Schutt. [*Ervatamia divaricata* (L.) Burk.]

習性：灌木。花期：4-9月；果期：7-11月。

產地：公園栽培。

分佈：雲南南部有野生，福建、臺灣、廣東、海南、廣西有栽培。亞洲熱帶及亞熱帶地區。

用途：藥用、觀賞。全株有毒。

黃花夾竹桃屬 *Thevetia* L.

黃花夾竹桃 Yellow Oleander

****Thevetia peruviana*** (Pers.) Schum.

習性：灌木或小喬木。花期：5-12月；果期：8月至翌年2月。

產地：公園栽培。

分佈：福建、臺灣、廣東、海南、廣東、雲南等地有栽培。原產南美洲及中美洲，現世界廣泛栽植於熱帶及亞熱帶地區。

用途：藥用、觀賞。全株有毒。

紅酒杯花 Orange Luckynut *Thevetia*

†****Thevetia peruviana*** cv. ***Aurantiana***

習性：灌木或小喬木。花期：幾全年。

產地：公園栽培。

分佈：廣東南部有栽培。由美洲培育出。

用途：觀賞。

絡石屬 *Trachelospermum* Lem.

絡石 Star Jasmine

Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.

習性：藤本。花期：3-8月；果期：6-12月。

產地：跑馬地、灣仔峽、大帽山、大埔滘。生於灌叢或疏林下。

分佈：華東、華中、華南至西南以及山西、陝西、西藏。日本、韓國、越南。

用途：藥用、觀賞。全株有毒。

水壺藤屬 *Urceola* Roxb.

杜仲藤 Smallflower *Urceola*

Urceola micrantha (Wall. ex G. Don) A. DC. [*Ecdysanthera utilis* Hayata & Kawakami; *Parabarium micranthum* (Wall. ex G. Don) Pierre]

習性：木質藤本。花期：3-6月；果期：6-12月。

產地：香港島。生於山地疏林下或灌叢。

分佈：臺灣、福建、廣東、廣西、海南、雲南、四川。印度、尼泊爾、泰國、老撾、越南、日本、馬來西亞、印度尼西亞。

用途：藥用、觀賞。

酸葉膠藤 Sour Creeper

Urceola rosea (Hook. & Arn.) D. J. Middleton (*Ecdysanthera rosea* Hook. & Arn.)

習性：木質藤本。花期：4-12月；果期：6-12月。

產地：香港島、大帽山、大嶼山。生於山地疏林下或灌叢。

分佈：臺灣、福建、廣東、海南、廣西、湖南、貴州、雲南、四川。越南、泰國、印度尼西亞。

用途：藥用、觀賞。

倒吊筆屬 *Wrightia* R. Br.

藍樹 *Smooth Wrightia*

Wrightia laevis Hook. f.

習性：喬木。花期：4—8月；果期：7—12月。

產地：大埔元墩下、香港動植物公園栽培。
分佈：廣東、廣西、海南、貴州、雲南。熱帶亞洲、澳大利亞北部。

用途：材用、觀賞、藥用。

279 · 蘿藦科 *Asclepiaceae*

馬利筋屬 *Asclepias* L.

馬利筋（連生桂子花） *Blood-flower*

**Asclepias curassavica* L.

習性：多年生草本。花期：幾全年；果期：8-12月。

產地：大坑道、大帽山、粉嶺、各公園及植物園栽培。

分佈：安徽、江蘇、浙江、江西、湖北、湖南、福建、臺灣、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、青海、西藏等地有栽培。原產熱帶美洲，現廣植於世界熱帶及亞熱帶地區。

用途：藥用、觀賞。

吊燈花屬 *Ceropegia* L.

吊燈花（三刺臘花） *Ceropegia*

Ceropegia trichantha Hemsl.

習性：草質藤本。花期：8-10月。果期：10-12月。

產地：公園栽培。

分佈：廣東、海南。泰國。

白葉藤屬 *Cryptolepis* R. Br.

大花白葉藤 *Largeflower Cryptolepis*

†**Cryptolepis grandiflora* R. Br.

習性：藤本。

產地：公園栽培。

分佈：原產熱帶非洲。

用途：藥用、觀賞。

白葉藤 *Chinese Cryptolepis*

Cryptolepis sinensis (Lour.) Merr.

習性：藤本。花期：4-9月；果期：7-12月。

產地：城門、元朗、大嶼山。生於山地疏林下或灌叢。

分佈：臺灣、廣東、廣西、海南、雲南。印度、越南、柬埔寨、馬來西亞、印度尼西亞。

用途：藥用。

鵝絨藤屬 *Cynanchum* L.

刺瓜 *Swallow Wort*

Cynanchum corymbosum Wight

習性：多年生草質藤本。花期：5-10月；果期：8-12月。

產地：大帽山、馬鞍山。生於山地路旁或灌叢。

分佈：福建、廣東、廣西、湖南、雲南、四川。印度、緬甸、老撾、柬埔寨、越南、馬來西亞。

用途：藥用。

徐長卿（了刁竹） *Paniculate Swallow Wort*

Cynanchum paniculatum (Bunge) Kitagawa

習性：多年生直立草本。花期：5-7月；果期：8-12月。

產地：清水灣、高流灣。生於向陽山坡及草叢中。

分佈：南北均有分佈。日本、朝鮮。

用途：藥用。

海南杯冠藤 *Insular Swallow Wort*

Cynanchum insulanum (Hance) Hemsl.

習性：草質藤本。花期：5-10月；果期：10-12月。

產地：西貢大灣。生於海邊沙灘。

分佈：廣東、廣西、海南。

眼樹蓮屬 *Dischidia* R. Br.

眼樹蓮（瓜子金） *Chinese Dischidia*

Dischidia chinensis Champ. ex Benth.

習性：肉質藤本。花期：4-5月；果期：5-6月。

產地：大埔滘、烏蛟騰、青山、大嶼山。附生於林中樹上或石上。

分佈：廣東、廣西、海南。越南。

用途：藥用、觀賞。

南山藤屬 *Dregea* E. Mey.

南山藤 *Twisting Dregea*

Dregea volubilis (L. f.) Benth. ex Hook. f.

習性：木質大藤本。花期：4-9 月；果期：7-12 月。

產地：香港仔、鳳園、粉嶺、丙崗。生於林中。

分佈：臺灣、廣東、海南、廣西、貴州、雲南。熱帶亞洲。

用途：藥用、觀賞。

釘頭果屬 *Gomphocarpus* R. Br.

汽球花 *Butterfly Flower*

****Gomphocarpus physocarpus*** E. Mey.

[*Asclepias Physocarpus* (E. May) Schltz.]

習性：灌木。

產地：庭園及公園栽培。

分佈：廣東南部、海南有栽培。原產非洲，現世界熱帶地區有引種。

用途：藥用、觀賞。

天星藤屬 *Graphistemma* Champ.
ex Benth.

天星藤 *Painted Graphistemma*

Graphistemma pictum (Benth.) B. D. Jacks.

習性：木質藤本。花期：4-9 月；果期：7-12 月。

產地：香港島、赤徑、大埔滘。生於山地疏林下或灌叢。

分佈：廣東、海南、廣西、越南。

用途：藥用、觀賞。

海島藤屬 *Gymnanthera* R. Br.

海島藤 *Oblong Gymnanthera*

Gymnanthera oblonga (N. L. Burman) P. S.

Green (*Gymnanthera nitida* R. Br.)

習性：木質藤本。花期：7-9 月；果期：9 月至翌年 1 月。

產地：大潭篤、沙田、大網仔、青衣。生於海邊沙地或水溝旁岩石上。

分佈：廣東南部、海南。越南、柬埔寨、泰國、馬來西亞、印度尼西亞、新幾內亞、菲律賓、澳大利亞。

用途：觀賞。

匙羹藤屬 *Gymnema* R. Br.

廣東匙羹藤 *Inspid Gymnema*

Gymnema inodorum (Lour.) Decne.

(*Gymnema tingens* Roxb. ex Spreng.)

習性：木質藤本。花期：3-7 月；果期：6-12 月。

產地：西貢、鳳園。生於山地疏林下或灌叢。

分佈：廣東、廣西、海南、貴州、雲南。印度、尼泊爾、錫金、泰國、越南、菲律賓。

用途：藥用、觀賞。

匙羹藤 *Miracle Fruit*

Gymnema sylvestre (Retz.) Schult.

[*Gymnema alterniflorum* (Lour.) Merr.]

習性：木質藤本。花期：4-11 月；果期：9-12 月。

產地：香港各地。生於林緣和灌叢中。

分佈：浙江、臺灣、福建、廣東、海南、廣西、雲南。印度斯里蘭卡、越南、日本、馬來西亞、印度尼西亞和非洲。

用途：藥用。全株有毒。

球蘭屬 *Hoya* R. Br.

球蘭 *Wax Plant*

Hoya carnosa (L. f.) R. Br.

習性：附生攀援灌木。花期：4-6 月；果期：7-8 月。

產地：香港島、大帽山、馬鞍山、梧桐寨、大嶼山。生於平原或山地附生於樹上或石上。

分佈：臺灣、福建、海南、廣東、廣西、雲南。印度、日本。

用途：藥用、觀賞。

黑鰻藤屬 *Jasminanthes* Blume

黑鰻藤 *Mucronate Jasminanthes*

Jasminanthes mucronata (Blanco) Stevens

& P. T. Li [*Stephanotis mucronata* (Blanco) Merr.]

習性：木質藤本。花期：5-6 月；果期：9-10 月。

產地：跑馬地、大帽山、馬鞍山、大嶼山。

生於山地疏林下或灌叢中。
分佈：臺灣、浙江、福建、湖南、廣東、廣
西、貴州、四川。菲律賓有栽培。
用途：藥用、觀賞。

牛奶菜屬 *Marsdenia* R. Br.

毛喉牛奶菜 *Hairythroat Condorvine*
***Marsdenia lachnostoma* Benth.**
習性：木質藤本。
產地：北角、馬鞍山。生於山地疏林下或灌
叢。
分佈：香港特產。
用途：觀賞。

藍葉藤（芙蓉蘭） *Tinctoral Condorvine*
***Marsdenia tinctoria* R. Br**
習性：木質藤本。花期：3-5 月；果期：8-12
月。
產地：香港仔。生於山地林中或灌木叢中。
分佈：臺灣、廣東、廣西、海南、湖南、貴
州、雲南、四川、西藏。斯里蘭卡、
印度、緬甸、越南、印度尼西亞、菲
律賓。
用途：藥用、觀賞。

石蘿摩屬 *Pentasachme*

石蘿摩 *Caudate Pentasachme*
***Pentasachme caudatum* Wall. ex Wight**
(*Pentasachme championii* Benth.)
習性：多年生直立草本。花期：4-6 月；果
期：8-12 月。
產地：香港各地。生於山地林中或灌木叢
中。
分佈：湖南、廣東、廣西、海南、雲南。越
南。
用途：藥用、觀賞。

夜來香屬 *Telosma* Coville

夜來香 *Night-fragrant Flower*
****Telosma cordata* (Burm. f.) Merr.**
習性：藤本。花期：5-8 月；果期：8-12 月。
產地：田園、庭園及公園栽培。
分佈：原產中國華南地區，現南方各省區常
見栽培。亞洲熱帶、亞熱帶及歐洲和
美洲有引種。

用途：藥用、食用（花）、觀賞。

弓果藤屬 *Toxocarpus* Wight & Arn.

弓果藤 *Wight Toxocarpus*
***Toxocarpus wightianus* Hook. & Arn.**
習性：木質藤本。花期：6-8 月；果期：10
月翌年 2 月。
產地：香港各地。生於山地林中或灌叢。
分佈：廣東、海南、廣西、貴州、雲南。印
度、越南。
用途：藥用。

娃兒藤屬 *Tylophora* R. Br.

娃兒藤 *Ovate Tylophora*
***Tylophora ovata* (Lindl.) Hook. ex Steud.**
習性：木質藤本。花期：4-8 月；果期：8-12
月。
產地：香港各地。生於山地林中或灌叢。
分佈：臺灣、福建、廣東、湖南、廣西、海
南、雲南、貴州、四川。印度、巴基
斯坦、尼泊爾、緬甸、老撾、越南。
用途：藥用、觀賞。

282. 茄科 *Solanaceae*

鴛鴦茉莉屬 *Brunfelsia* L.

大鴛鴦茉莉 *Brazil Raintree*
****Brunfelsia calycina* Benth.**
習性：灌木。花期：春季。
產地：公園栽培。
分佈：美洲、西印度群島。

大葉鴛鴦茉莉
****Brunfelsia macrophylla* Benth.**
習性：灌木。花期：春季。
產地：公園栽培。
分佈：美洲、西印度群島。

辣椒屬 *Capsicum* L.

辣椒(牛角椒、長辣椒) *Bell Pepper*
****Capsicum annuum* L. (*Capsicum frutescens*
L. var. longum Bailey)**
習性：一年生或多年生草本。花果期：夏秋
季。
產地：栽培。

分佈：原產墨西哥。現世界各地廣泛栽培。

朝天椒 Conelike pepper

***Capsicum annuum** var. **conoides** (Mill.)

Irish (*Capsicum frutescens* var. *conoides* Bailey)

習性：一年生或多年生草本。花果期：夏秋季。

產地：栽培。

分佈：原產南美洲。現世界各地廣泛栽培。

簇生椒 Fascicled pepper

***Capsicum annuum** var. **fasciculatum** (Sturt.)

Irish (*Capsicum frutescens* var. *fasciculatum* Bailey)

習性：一年生或多年生草本。花果期：夏秋季。

產地：栽培。

分佈：原產南美洲。現世界各地廣泛栽培。

菜椒(燈籠椒) Sweet Pepper

***Capsicum annuum** var. **grossum** (L.) Sendt.

(*Capsicum frutescens* var. *grossum* Bailey)

習性：一年生或多年生草本。花果期：夏秋季。

產地：栽培。

分佈：原產南美洲。現世界各地廣泛栽培。

夜香樹屬 *Cestrum* L.

夜香樹(丁香花) Night Jessamine

***Cestrum nocturnum** L.

習性：直立或近攀援狀灌木。花期：不定期。

產地：栽培。

分佈：原產南美洲。

用途：觀賞。

曼陀羅屬 *Datura* L.

洋金花(白花曼陀羅) Hindu Datura

Datura metel L.

習性：一年生草本。花果期：3-12月。

產地：石澳、梧桐寨、大浪西灣、鴨脷洲、平洲。生荒野和村旁、路邊。

分佈：臺灣、福建、廣東、廣西、貴州、雲南、江蘇、浙江有栽培。

用途：藥用。

曼陀羅 Jimson weed

***Datura stramonium** L.

習性：草本或亞灌木。花期：6-10月；果期：7-11月。

產地：栽培。

分佈：南北各省區。全世界各大洲。

用途：藥用。

紅絲線屬 *Lycianthes* (Dunal) Hassl.

紅絲線(十萼茄) Twoflower *Lycianthes*

Lycianthes biflora (Lour.) Bitter (*Solanum biflorum* Lour.)

習性：草本或亞灌木。花期：5-8月；果期：7-11月。

產地：扯旗山、薄扶林、飛鵝山、城門、大帽山、橫山腳下村。生於山谷林下、水邊及荒野路旁、濕地。

分佈：臺灣、福建、江西、安徽、廣東、廣西、雲南、四川。印度、馬來西亞、印度尼西亞、日本。

枸杞屬 *Lycium* L.

枸杞 Chinese Wolfberry

***Lycium chinense** Mill.

習性：灌木。花果期：6-11月。

產地：栽培。

分佈：東北、河北、山西、陝西及華中、華東、華南各省區。朝鮮、日本。

用途：藥用、蔬菜。

番茄屬 *Lycopersicon* Mill.

番茄 Tomato

***Lycopersicon esculentum** Mill.

習性：一年生草本。花果期：夏秋季。

產地：栽培。

分佈：原產南美洲。全世界廣泛栽培。

用途：蔬菜。

假酸漿屬 *Nicandra* Adans

假酸漿 Apple of Peru

†***Nicandra physaloides** (L.) Scop.

習性：一年生草本。花果期：夏秋季。

產地：栽培。
分佈：原產秘魯。
用途：觀賞。

煙草屬 *Nicotiana* L.

煙草花 Garden *Nicotiana*

**Nicotiana × sanderae* W. Watson

習性：草本。花果期：夏秋季。

產地：庭園栽培。

分佈：原產南美洲。

用途：觀賞。

煙草 Tobacco

**Nicotiana tabacum* L.

習性：一年生或多年生草本。

產地：栽培。

分佈：原產南美洲。現世界各地廣泛栽培。

用途：農藥。煙草工業原料。

賽亞麻屬 *Nierembergia* Ruiz. & Pav.

杯花 Cup flower

†**Nierembergia hippomanica* var. *violaceae*
Millan

習性：草本。花果期：夏秋季。

產地：栽培。

分佈：原產南美洲、阿根廷。

用途：觀賞。

碧冬茄屬 *Petunia* Juss.

碧冬茄 Garden *Petunia*

**Petunia hybrida* (Hook.) Vilm.

習性：一年生草本。花果期：夏秋季。

產地：公園栽培。

分佈：南美。

用途：觀賞。

酸漿屬 *Physalis* L.

酸漿 Chinese Lantern

**Physalis alkekengi* L.

習性：多年生草本。花期：5-9 月；果期：
6-10 月。

產地：栽培。

分佈：陝西、甘肅、河南、湖北、四川、貴州、雲南。歐亞大陸。

苦蕒(燈籠草) Ground cherry

Physalis angulata L.

習性：一年生草本。花果期：5-12 月。

產地：深水灣、米埔、大埔。生於山谷林下及村邊路旁。

分佈：華東、華南、華中及西南。日本、印度、澳大利亞、美洲。

茄屬 *Solanum* L.

少花龍葵 Shiningfruit Nightshade

Solanum americanum Miller (*Solanum photeinocarpum* Nakamura & Odashima)

習性：草本。花果期：幾全年。

產地：大埔道。生於溪邊、密林陰地或林邊荒地。

分佈：臺灣、廣東、廣西、湖南、江西、雲南。美洲。現在成爲熱帶地區廣佈的雜草。

牛茄子(癩茄) Sodaapple Nightshade

Solanum capsicoides Allioni (*Solanum surattense* auct. non Burm. f.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：亞灌木。花期：夏秋；果期：秋冬。

產地：西貢、茅坪、赤徑、大浪。生於路旁荒地、疏林或灌叢中。

分佈：長江以南各省區及臺灣。全世界熱帶地區廣佈。

用途：藥用。

野茄 Wild Nightshade

Solanum coagulans Forsk.

習性：直立草本至亞灌木。花期：夏季；果期：秋冬季。

產地：大埔、上水。生於灌木叢或緩坡地帶。

分佈：臺灣、廣西、廣東、福建、雲南。

假煙葉樹(土煙葉) Wild Tobacco

Solanum erianthum D. Don (*Solanum verbascifolium* auct. non L.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：灌木或小喬木。花果期：幾全年。

產地：香港島、粉嶺、大埔、荃灣。生於荒

山或村旁荒地灌叢中。
分佈：臺灣、福建、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川。亞洲、大洋洲、熱帶美洲。
用途：藥用。

刺天茄(紫花茄) Indian Nightshade

Solanum indicum L.

習性：多枝灌木。花果期：全年。
產地：大埔、粉嶺。生於乾燥灌叢中或路邊、荒地或疏林下。
分佈：臺灣、廣西、廣東、福建、貴州、雲南、四川。印度、中南半島至菲律賓。
用途：藥用。

毛茄 Hairy Nightshade

Solanum lasiocarpum Dunal. (*Solanum ferox* auct. non L.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：直立草本至亞灌木。花期：夏季；果期：秋冬季。
產地：西貢、茅坪、城門、大埔、沙頭角。
分佈：臺灣、廣西、廣東、雲南。
用途：藥用。

乳茄(五代同堂茄) Nipple Fruit

***Solanum mammosum L.**

習性：直立草本。花期：夏秋；果期：秋末。
產地：栽培。
分佈：原產美洲。
用途：觀賞。

茄(矮瓜) Eggplant

***Solanum melongena L.**

習性：草本至亞灌木。花果期：夏秋季。
產地：栽培。
分佈：亞洲熱帶地區。世界各地廣泛栽培。
用途：蔬菜。

龍葵 Black Nightshade

Solanum nigrum L.

習性：一年生草本。花果期：夏秋季。
產地：香港各地。生於村邊荒地、田邊、路旁。
分佈：全國各地、廣佈歐、亞、美洲的溫帶

至熱帶地區。

用途：藥用。

珊瑚櫻(玉珊瑚) Jerusalem cherry

***Solanum pseudocapsicum L.**

習性：直立分枝小灌木。花期：初夏；果期：秋末。
產地：栽培。
分佈：原產南美。
用途：觀賞。

瑪瑙珠(珊瑚豆) Twoflower Jerusalem Cherry

†*Solanum pseudocapsicum var. diflorum (Vell.) Bitter (*Solanum capsicastrum* Link. ex Schau)

習性：灌木。花期：4-7月；果期：8-12月。
產地：公園或庭園栽培。有時逸為野生。
分佈：原產巴西。

水茄 Tetragonan

Solanum torvum Swartz

習性：灌木。花果期：幾全年。
產地：香港各地。生於路邊及荒地中。
分佈：臺灣、廣東、廣西、福建、雲南。亞洲及美洲熱帶地區。
用途：藥用。

馬鈴薯(洋芋) Potato

***Solanum tuberosum L.**

習性：草本。花期：夏季。
產地：栽培。
分佈：原產熱帶美洲。世界各地廣泛栽培。
用途：食用。

大花茄 Brazilian Potato-tree

***Solanum wrightii Benth.**

習性：灌木。花期：夏秋。
產地：栽培。
分佈：原產南美玻利維亞至巴西。

283. 旋花科 Convolvulaceae

心萼薯屬 Aniseia Choisy

心萼薯 Tow-flowers Aniseia, Hairy

Morning-glory

Aniseia biflora (L.) Choisy

習性：攀援或纏繞草本。

產地：香港各地。生於山坡、山谷、路旁或林下，常見於較乾燥處。

分佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南。越南。

用途：藥用。

狹花心萼薯

†**Aniseia stenantha** (Dunor) Ling.

習性：纏繞草本。

產地：西貢大灣。

分佈：廣東、福建。

銀背藤屬 *Argyreia* Lour.

白鶴藤 *Acute Asiaglory*

Argyreia acuta Lour.

習性：攀援灌木。花期：8-10月；果期：10-翌年1月。

產地：扯旗山。生於疏林下或路邊灌叢，河邊。

分佈：廣東、廣西。印度東部、越南、老撾。

用途：藥用。

頭花銀背藤 *Capitate-flower Asiaglory*

Argyreia capitata (Vahl) Choisy

習性：攀援灌木。花期：9-12月；果期：2月。

產地：青山、石崗、林村。生於溝谷密林、疏林及灌叢中。

分佈：廣東、廣西、貴州、雲南。印度、緬甸、泰國、越南、老撾、柬埔寨、南至馬來半島及印度尼西亞。

用途：藥用。

美麗銀背藤

†***Argyreia nervosa** (Burm. f.) Boj.

習性：藤本。

產地：青洲，香港栽培。

分佈：廣東及沿海島嶼。印度、孟加拉、印度尼西亞、馬來西亞。

用途：觀賞。

銀背藤 *Blunt-leaf Asiaglory*

Argyreia obtusifolia Lour.

習性：攀援灌木。

產地：扯旗山、青山、大嶼山。花期：8-10月；果期：11月至翌年2月。

分佈：廣東。越南、老撾、柬埔寨、泰國、緬甸、馬來半島。

用途：藥用。

打碗花屬 *Calystegia* R. Br.

旋花 *Hedge Calystegia*

†**Calystegia sepium** (L.) R. Br.

習性：多年生草本。花期：6-8月；果期：9月。

產地：新界。生於路旁、溪邊草叢、農田邊或山坡林緣。

分佈：我國大部分地區廣佈。北美洲、歐洲、俄羅斯、印度尼西亞、澳大利亞、新西蘭。

月光花屬 *Calonyction* Choisy

月光花 *Moonflower*

***Calonyction aculeatum** (L.) House

習性：一年生纏繞草本。

產地：栽培。

分佈：陝西、江西、浙江、江蘇、廣東、廣西、四川、雲南。廣佈于全熱帶。

用途：觀賞；食用。

馬蹄金屬 *Dichondra* J. et G. Forst

馬蹄金 *Creeping Dichondra*、*Lawn Leaf*

Dichondra repens Forst.

習性：多年生匍匐草本。

產地：大潭、沙螺洞。生於山坡草地、路旁或溝邊。

分佈：長江以南各省、臺灣。廣佈於兩半球熱帶亞熱帶地區。

用途：藥用。

丁公藤屬 *Erycibe* Roxb.

丁公藤 *Obtuse-leaf Erycibe*

Erycibe obtusifolia Benth.

習性：攀援灌木。

產地：赤柱、歌連臣角、鶴咀、大嶼山、東龍島。生於山谷濕潤密林中或路旁灌叢。

分佈：雲南、廣西。印度、錫金、不丹、緬甸、泰國。

土丁桂屬 *Evolvulus* L.

土丁桂 Alsine-like *Evolvulus*

***Evolvulus alsinoides* (L.) L.**

習性：多年生草本。花果期：四季。
產地：香港仔、尖鼻咀、青山、南丫島、大嶼山。生於山坡、灌叢及路邊。
分佈：長江以南各省。馬達加斯加、印度、中南半島、馬來西亞、菲律賓。
用途：藥用。

豬菜藤屬 *Hewittia* Wight & Arnott

豬菜藤 Sublobate *Hewittia*

***Hewittia sublobata* (L. f.) Kuntze**

習性：纏繞草本。花果期：四季。
產地：城門、大嶼山、長洲、大鴉洲。生於平地沙土或灌叢陽處。
分佈：臺灣、廣東、廣西、雲南。熱帶非洲、熱帶亞洲。

番薯屬 *Ipomoea* L.

蕹菜 Water Spinach, Swamp Morning-glory

****Ipomoea aquatica* Forsk.**

習性：一年生草本。
產地：栽培。
分佈：我國中部及南部各省、北方較少。熱帶亞洲、非洲、大洋洲。
用途：蔬菜。

番薯 Sweet Potato

****Ipomoea batatas* (L.) Lam.**

習性：一年生草本。
產地：栽培。
分佈：我國大多數地區都普遍栽培。
用途：糧食作物。

五爪金龍 Gairo Morning Glory

***Ipomoea cairica* (L.) Sweet**

習性：多年生纏繞草本。
產地：香港各地。生於平地或山地路旁灌叢、生長于向陽處。
分佈：臺灣、福建、廣西、雲南。全世界熱

帶，為常見雜草。

用途：藥用。

七爪龍 Fingerleaf Morning Glory

***Ipomoea digitata* L.**

習性：多年生纏繞藤本。
產地：香港各地。生於海灘邊矮林、山地疏林或溪邊灌叢。
分佈：臺灣、廣東、廣西、雲南。廣佈熱帶。
用途：藥用；雜草。

樹牽牛 Bush Morning-Glory

****Ipomoea fistulosa* Mart. ex Choisy**

習性：披散灌木。
產地：栽培。
分佈：臺灣、廣東、廣西。墨西哥、美國、巴西。
用途：觀賞。

王子薯 Princes Vine

****Ipomoea horsfalliae* Hook.**

習性：藤本。花期：冬季。
產地：栽培。
分佈：原產西印度群島。
用途：觀賞。

藍晨花 Blue Dawn Flower

****Ipomoea learii* Paxt.**

習性：藤本。
產地：栽培。
分佈：原產熱帶美洲。
用途：觀賞。

小心葉薯（紫心牽牛）

***Ipomoea obscura* (L.) Ker-Gawl.**

習性：纏繞草本。
產地：香港各地。生於曠野沙地、海邊、疏林或灌叢。
分佈：臺灣、廣東、雲南、海南。熱帶非洲、馬斯克林、熱帶亞洲、菲律賓、馬來西亞至大洋洲北部、斐濟島。
用途：觀賞。

厚藤（海灘牽牛） Tow-leaves Morning

Glory

Ipomoea pes-caprae (L.) Sweet (*Ipomoea brasiliensis* L.)

習性：多年生草本。

產地：香港各地。生於沙灘上及路旁向陽處。

分佈：浙江、福建、臺灣、廣東、廣西。廣佈於熱帶沿海地區。

用途：飼料、藥用。

帽苞薯藤

Ipomoea pileata Roxb.

習性：一年生纏繞藤本。

產地：大圍、大嶼山、大欖涌。生於林緣、山坡路旁或山坡草地向陽處。

分佈：廣東、廣西、雲南。熱帶東非、馬斯克林群島、印度、斯里蘭卡、中南半島、馬來半島、印度尼西亞、菲律賓、加里曼丹島。

假厚藤 (厚葉牽牛) **Thick- Leaved Morning-glory**

Ipomoea stolonifera (Cyrillo) J. F. Gmel.

習性：多年生蔓生草本。

產地：大浪西灣、咸田灣、大灣、索罟群島、分流。生於沿海沙灘上或沙丘上或水旁陽處。

分佈：臺灣、福建、廣東。分佈於熱帶及亞熱帶沿海地區。

三裂葉薯

Ipomoea triloba L.

習性：草本。

產地：香港各地。生於灌叢草坡或路旁。

分佈：廣東、臺灣。熱帶美洲。

小牽牛屬 **Jacquemontia** Choisy

小牽牛 **Paniculate Jacquemontia**

Jacquemontia paniculata (Burm. f.) Hall. f.

習性：纏繞草本。

產地：香港各地。

分佈：廣東、廣西、雲南、臺灣。熱帶東非、馬達加斯加、中南半島、馬來西亞、熱帶大洋洲。

魚黃草屬 **Merremia** Dennst

多裂魚黃草

†**Merremia dissecta** (Jacq.) Hall. f.

習性：纏繞草本。

產地：司徒拔道、大坑。

分佈：廣東沿海島嶼。美洲、非洲、印度、東南亞、澳大利亞。

魚黃草 **Ivy-like Merremia**

Merremia hederacea (Burm. f.) Hall. f. (*Merremia convolvulacea* Dennst)

習性：纏繞草本。

產地：華富村、西貢、沙田、大埔、打鼓嶺、深井。生於灌叢或路旁草叢。

分佈：臺灣、廣東、廣西、江西、雲南。熱帶非洲、馬斯克林群島、印度、斯里蘭卡、緬甸、泰國、越南、馬來西亞、加羅林群島、昆士蘭。

用途：藥用。

毛山豬菜 **Hairy Merremia**

†**Merremia hirta** (L.) Merr.

習性：纏繞草本。

產地：大埔。生於曠野草地或林緣。

分佈：臺灣、廣東、廣西、雲南。印度、錫金、泰國、馬來西亞、熱帶大洋洲。

指葉山豬菜

Merremia quinata (R. Br.) Oostr. (*Ipomoea quinata* R. Br.)

習性：纏繞草本。

產地：深水灣。生於山坡陽處。

分佈：廣東、廣西、雲南、海南。亞洲東南部、澳大利亞北部。

北魚黃草

Merremia sibirica (L.) Hall. f.

習性：纏繞草本。

產地：梧桐河。生於路旁、田邊、山地草叢或山坡灌叢。

分佈：亞洲及熱帶大洋洲。

尖萼魚黃草 **Narrow-leaved Merremia**

†**Merremia tridentata** subsp. **hastata** (Desr.)

Oostr. [*Merremia hastata* (Desr.) Hall. f.]

習性：攀援草本。

產地：赤柱、大埔、藍地、貝澳、蒲台島。生於曠野沙地、路旁或疏林中。

分佈：臺灣、廣東、廣西、雲南。熱帶東非、印度、錫金、馬來半島、熱帶大洋洲。

木玫瑰 Wooden Rose

***Merremia tuberosa** (L.) Rendle (*Ipomoea tuberosa* L., non Lour.)

習性：灌木。

產地：栽培。

分佈：原產熱帶非洲，現世界熱帶地區有栽培。

用途：觀賞。

山豬菜 Umbellate *Merremia*

†**Merremia umbellata** subsp. **orientalis** (Hall. f.) Oostr.

習性：纏繞藤本。

產地：香港各地。生於路旁、山谷疏林或雜草疏叢中。

分佈：廣東、海南、廣西、雲南。熱帶東非、塞舌爾群島、印度、斯里蘭卡、泰國、老撾、越南、柬埔寨、馬來西亞、澳大利亞。

用途：藥用。

盒果藤屬 *Operculina* S.Manso

盒果藤 Foully *Operculina*

Operculina turpethum (L.) S. Manso

習性：多年生纏繞草本。花果期：四季。

產地：鳳園、鹿頸、大鵬灣半洲。生於溪邊、山谷路旁，灌叢陽處或村莊附近。

分佈：廣東、廣西、雲南、臺灣。熱帶東非、馬斯克林群島、塞舌爾群島、熱帶亞洲、熱帶大洋洲、波利尼西亞、大小安的列斯群島。

用途：藥用。

牽牛屬 *Pharbitis* Choisy

變色牽牛 Indian *Pharbitis*

***Pharbitis indica** (Burm.) R. C. Fang [*Ipomoea indica* (Burm.) Merr.]

習性：一年生纏繞藤本。

產地：香港島、南丫島。生於海灘邊，濕潤密林或草叢中。

分佈：臺灣、海南東沙群島。原產南美洲、泛熱帶分佈。

用途：觀賞。

牽牛 Imperial Japanese Morningglory

***Pharbitis nil** (L.) Choisy (*Pharbitis hederacea* Franch.)

習性：一年生纏繞草本。

產地：香港各地。生於山坡灌叢、乾燥河谷路旁、園邊宅旁、山地路邊。

分佈：除西北和東北的一些省外、大部分地區都有分佈。原產熱帶美洲、現廣植於熱帶和亞熱帶地區。

用途：觀賞；藥用。

圓葉牽牛 Common Morning-Glory

***Pharbitis purpurea** (L.) Voigt [*Ipomoea purpurea* (L.) Lam.; *Ipomoea purpurea* (L.) Roth.]

習性：一年生纏繞草本。

產地：大埔；栽培。

分佈：廣佈我國。熱帶美洲、廣至於世界各地。

用途：觀賞。

蔦蘿屬 *Quamoclit* Mill.

橙紅蔦蘿 Star *Ipomoea*

***Quamoclit coccinea** Moench.

習性：一年生草本。

產地：栽培。

分佈：我國各地栽培、雲南。原產南美洲。

蔦蘿松 Cypress-vine (Star Glory)

***Quamoclit pennata** (Lam.) Boj.

習性：一年生纏繞藤本。

產地：栽培。

分佈：我國廣泛栽培(陝西、河北、河南、山東、江蘇、安徽、江西、福建、廣東、廣西、四川、貴州、雲南)。原產熱帶美洲、遍佈全球熱帶及溫帶。

用途：觀賞。

284. 菟絲子科 Cuscutaceae

菟絲子屬 *Cuscuta* L.

南方菟絲子 European Dodder

†*Cuscuta australis* R. Br.

習性：一年生寄生草本。

產地：香港各地。寄生于田邊，路旁的豆科、菊科、馬鞭草科等草本或小灌木上。

分佈：吉林、遼寧、河北、山東、甘肅、寧夏、新疆、山西、安徽、江蘇、浙江、福建、江西、湖南、湖北、四川、雲南、廣東、臺灣。自亞洲中南、東部、向南經馬來西亞、印度尼西亞至大洋洲。

用途：藥用。

菟絲子 Chinese Dodder

Cuscuta chinensis Lam.

習性：一年生寄生草本。

產地：沙田、小瀝源。生於田邊、山坡陽處、路邊灌叢或海邊沙丘，通常寄生於豆科、菊科等多種植物上。

分佈：全國各地。伊朗、阿富汗向東至日本、朝鮮、南至斯里蘭卡、馬達加斯加、澳大利亞。

用途：藥用。

金燈藤 Japanese Dodder

Cuscuta japonica Choisy

習性：一年生草本。

產地：鶴咀、赤柱、扯旗山、西高山。寄生於草本或灌木上。

分佈：分佈於我國南北各省。越南、朝鮮、日本。

用途：藥用。

大花菟絲子 Yunnan Dodder

†*Cuscuta reflexa* Roxb.

習性：寄生草本。

產地：香港仔。寄生于路旁或山谷灌木叢中。

分佈：湖南、四川、雲南、西藏。阿富汗、巴基斯坦、印度、泰國、斯里蘭卡、馬來西亞。

用途：藥用。

286. 苧菜科 Menyanthaceae

苧菜屬 *Nymphoides* Séguier

水皮蓮 Crested Floating Heart

Nymphoides cristatum (Roxb.) Kuntze

習性：水生草本。花果期：9月。

產地：沙田、粉嶺。生於淺水塘中。

分佈：福建、廣東、海南、湖北、湖南、江蘇、四川、臺灣。印度東部。

苧菜 Floating Heart

**Nymphoides peltatum* (Gmel.) Kuntze

習性：水生草本。花果期：4—10月。

產地：栽培。

分佈：除海南、青海及西藏外全國各地均有分佈。日本、朝鮮、內蒙古、俄羅斯、亞洲中部及西南部、歐洲。

用途：觀賞。

287. 花苧科 Polemoniaceae

科巴藤屬 *Cobaea* Cav.

科巴藤（新擬） Climbing Cobaea

**Cobaea scandens* Cav.

習性：藤本。花期：3月。

產地：栽培。

分佈：原產墨西哥。

用途：觀賞。

290. 紫草科 Boraginaceae

玻璃苣屬 *Borago* L.

玻璃苣（琉璃苣） Common Borage

**Borago officinalis* L.

習性：草本。花期：6月。

產地：栽培。

分佈：中國北部有栽培。原產歐洲和亞洲北部。

用途：觀賞。

斑種草屬 *Bothriospermum* Bunge

柔弱斑種草 Tender *Bothriospermum*

Bothriospermum tenellum (Hornem.) Fisch. & Mey.

習性：草本。花果期：2-10月。

產地：南灣、粉嶺、上水、烏蛟騰。生於路邊、草地。

分佈：西南、華南、華東、東北及陝西、河南、臺灣。俄羅斯、朝鮮、日本、巴基斯坦、印度、越南。

基及樹屬 *Carmona* Cav.

基及樹 (福建茶) *Small-leaf Carmona*

**Carmona microphylla* (Lam.) G. Don

習性：灌木。花期：7月。

產地：栽培作綠籬或盆景。

分佈：海南、廣東、臺灣。亞洲南部和東部、新幾內亞和所羅門群島。

用途：觀賞。

破布木屬 *Cordia* L.

破布木 *Dichotomous Cordia*

Cordia dichotoma Forst. f.

習性：喬木。花期：2-6月；果期：6-8月。

產地：赤柱、花園道、荔枝角、大埔、林村、馬鞍山、大帽山、西貢大浪、沙頭角、大嶼山。生於林中或栽培。

分佈：西藏、雲南、貴州、廣西、海南、廣東、福建、臺灣。印度、越南、澳大利亞、新喀里多尼亞。

用途：油料、藥用、材用。

厚殼樹屬 *Ehretia* L.

長花厚殼樹 *Longflorwer Ehretia*

Ehretia longiflora Champ. ex Benth.

習性：喬木。花果期：3-9月。

產地：香港島、馬鞍山、梧桐寨、新娘潭、青山、大嶼山。生於林中或栽培。

分佈：廣西、海南、廣東、福建、臺灣。越南。

厚殼樹 *Heliotrope Ehretia*

Ehretia thyrsoflora (Sieb. & Zucc.) Nakai
(*Ehretia acuminata* auct. non R. Br.:
Check List HK Pl. 1993.)

習性：喬木。花果期：5-9月。

產地：深水灣、大圍、沙田、錦田。生於林中或栽培。

分佈：中國西南部、南部、東部、及湖北、

河南。日本、越南。

用途：材用、藥用、染料、觀賞。

天芥菜屬 *Heliotropium* L.

大尾搖 *Indian Heliotrope*

Heliotropium indicum L.

習性：草本。花果期：4-10月。

產地：荔枝窩、蝴蝶灣、大嶼山、長洲。生於草地。

分佈：雲南、海南、廣東、福建、臺灣。世界熱帶及亞熱帶地區。

用途：藥用。

紫丹屬 *Tournefortia* L.

紫丹 *Mountainy Tournefortia*

†*Tournefortia montana* Lour.

習性：攀援灌木。花期：春夏季。

產地：青山。生於灌叢。

分佈：雲南、海南、廣東。越南。

291. 馬鞭草科 *Verbenaceae*

海欖雌屬 *Avicennia* L.

海欖雌 (白骨壤) *Black Mangrove*

Avicennia marina (Forssk.) Vierh.

習性：灌木。

產地：爛泥灣、大埔、南涌、鹿頸、米埔、上下白泥、企嶺下、榕樹澳、赤徑、大嶼山等地。生於海邊灘塗。

分佈：廣東、海南、福建、臺灣。亞洲東南部、非洲東部及澳大利亞北部。

紫珠屬 *Callicarpa* L.

短柄紫珠 (短序紫珠)

Callicarpa brevipes (Benth) Hance
(*Callicarpa longifolia* auct. non Lam.:
Check List HK. Pl. 1993.)

習性：灌木。

產地：香港各地。生於山坡。

分佈：廣東、海南、廣西、湖南、浙江南部。越南。

華紫珠 *Beauty Berry*

Callicarpa cathayana H. T. Chang

習性：灌木。

產地：大埔、粉嶺、大帽山。生於山坡及山

谷。
分佈：廣東、廣西、雲南、湖北、安徽、江西、福建、浙江、江蘇。

白棠子樹 Purple Beauty-berry

Callicarpa dichotoma (Lour.) K. Koch

習性：灌木。

產地：新界。生於林下。

分佈：廣東、廣西、貴州、湖南、湖北、安徽、福建、臺灣、江西、浙江、江蘇、山東、河南、河北。日本、朝鮮、越南。

杜虹花

Callicarpa formosana Rolfe (*Callicarpa pedunculata* R. Br.)

習性：灌木。

產地：深水灣、西貢、大埔滘、大帽山、梧桐寨、大嶼山。生於林下、山坡或山澗兩邊。

分佈：廣東、海南、廣西、雲南、江西、浙江、福建、臺灣。日本、菲律賓。

全緣葉紫珠

Callicarpa integerrima Champ.

習性：灌木。

產地：寶雲道、嶂上、鹿頸、南涌、東涌。生於山坡或山谷。

分佈：廣東、廣西、江西、福建、浙江。

枇杷葉紫珠

†**Callicarpa kochiana** Makino (*Callicarpa loureirii* Hook. & Arn.)

習性：灌木。

產地：香港各地。生於林緣、山谷林中。

分佈：福建、廣東、湖南、江西、河南、浙江、臺灣。日本、越南。

長苞紫珠

Callicarpa longibracteata H. T. Chang

習性：灌木。

產地：鹿頸。生於林中。

分佈：香港特有。

尖尾楓

Callicarpa longissima (Hemsl.) Merr.

[*Callicarpa longifolia* var. *lanceolaria* auct. non (Roxb.) C. B. Clarke: Check List HK Pl. 1993.]

習性：灌木。

產地：大埔滘、下坑、鳳園、鹿頸及大嶼山大澳。生於林下，山坡或曠地。

分佈：海南、廣東、廣西、四川、江西、福建、臺灣。日本、越南。

大葉紫珠 Large-leaved Beauty-berry

Callicarpa macrophylla Vahl

習性：灌木。

產地：南涌、鹿頸、交椅洲、大鴉洲。生於混交林下。

分佈：廣東、廣西、貴州、雲南。不丹、印度、緬甸、尼泊爾、斯里蘭卡、泰國、越南。

裸花紫珠

Callicarpa nudiflora Hook. & Arn.

習性：灌木。

產地：香港各地。生於林下。

分佈：廣東、廣西、海南。孟加拉、印度、馬來西亞、緬甸、新加坡、斯里蘭卡、越南。

紅紫珠 Red Beauty-berry

Callicarpa rubella Lindl.

習性：灌木。

產地：大潭、飛鵝山、大帽山、大嶼山。生於灌叢、山坡、山谷。

分佈：海南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、湖南、安徽、江西、浙江。印度尼西亞、馬來西亞、緬甸、泰國、越南。

薈屬 *Caryopteris* Bunge

蘭香草 (薈) Common Bluebeard

Caryopteris incana (Thunb.) Miq.

習性：多年生草本。

產地：香港島、南丫島、大鴉洲、大嶼山。生於山坡、路旁、曠野。

分佈：廣東、廣西、湖南、福建、江西、浙

江、安徽、江蘇。日本及朝鮮。

Citharexylum L.

Citharexylum caudatum L.

習性：灌木。

產地：栽培。

分佈：原產熱帶美洲。

大青屬 Clerodendrum L.

灰毛大青（獅子球）

Clerodendrum canescens Wall. ex Walp.
(*Clerodendrum viscosum* Vent.)

習性：灌木。

產地：香港島、城門、烏蛟騰、大嶼山。生於山坡疏林中。

分佈：廣東、廣西、貴州、雲南、四川、湖南、江西、浙江、福建、臺灣。印度、越南。

重瓣臭茉莉（臭茉莉、臭牡丹） Fragrant Gloryberry

Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabb.
[*Clerodendrum fragrans* (Vent.) Willd.]

習性：灌木。

產地：西貢、大環、碗窯、逢吉鄉、大嶼山等地。

分佈：廣東、廣西、雲南、福建、臺灣有栽培。亞洲熱帶及亞熱帶地區廣泛栽培。

用途：觀賞。

大青 Mayflower Gloryberry

Clerodendrum cyrtophyllum Turcz.

習性：灌木。

產地：香港各地。生於林緣、曠地。

分佈：海南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、河南、湖北、安徽、湖南、江西、浙江、福建、臺灣。朝鮮、馬來西亞、越南。

白花燈籠（鬼燈籠） Gloryberry

Clerodendrum fortunatum L.

習性：灌木。

產地：香港各地。生於曠地、灌叢。

分佈：廣東、廣西、福建、江西。菲律賓、越南。

苦郎樹（苦楮、假茉莉）

Clerodendrum inerme Gaertn.

習性：灌木。

產地：香港各地。生於海邊。

分佈：廣東、廣西、福建、臺灣。亞洲東南部、澳大利亞、太平洋島嶼。

檳桐 Pagoda Flower

***Clerodendrum japonicum** (Thunb.) Sweet
[*Clerodendrum kaempferii* (Jacq.) Sieb.]

習性：灌木。

產地：栽培。

分佈：廣東、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、湖南、江西、福建、臺灣、浙江、江蘇。孟加拉、不丹、印度、印度尼西亞、老撾、馬來西亞、越南。

尖齒臭茉莉

†**Clerodendrum lindleyi** Decaisne ex Planchon

習性：灌木。

產地：新界。生於林下。

分佈：廣東、廣西、貴州、雲南、四川、湖南、江西、福建、浙江、江蘇。

†***Clerodendrum macrosiphon** Hook. f.

習性：灌木。

產地：栽培。

分佈：原產熱帶非洲。

楊梅葉大青

***Clerodendrum myricoides** (Hochst.) R. Br.
ex Volke

習性：灌木。

產地：栽培。

分佈：原產熱帶非洲。

爪哇檳桐 Java Glorybower

***Clerodendrum speciosissimum** Van Geert

習性：灌木。

產地：栽培。
分佈：原產爪哇，世界熱帶地區廣泛栽培。
用途：觀賞。

紅龍吐珠（龍吐珠藤）

***Clerodendrum splendens** G. Don

習性：灌木。
產地：栽培。
分佈：原產西非。
用途：觀賞。

龍吐珠 Bleeding Heart Vine

***Clerodendrum thomsonae** Balf.

習性：灌木。
產地：栽培。
分佈：原產熱帶西非。
用途：觀賞。

垂茉莉（黑葉龍吐珠）

***Clerodendrum wallichii** Merr.
(*Clerodendrum nutans* Wall.)

習性：灌木。
產地：栽培。
分佈：廣西、雲南、西藏。孟加拉、印度、緬甸、越南。
用途：觀賞。

假連翹屬 *Duranta* L.

假連翹 Golden Dewdrops

***Duranta erecta** L. (*Duranta repens* L.)

習性：攀援灌木。
產地：栽培。常種植作綠籬。
分佈：福建、廣東、廣西、海南、湖南、江西、臺灣、浙江等地。原產美洲。

石梓屬 *Gmelina* L.

雲南石梓（印度石梓）

***Gmelina arborea** Roxb.

習性：喬木。
產地：石澳、城門。
分佈：雲南。孟加拉、不丹、印度、印度尼西亞、老撾、馬來西亞、緬甸、尼泊爾、菲律賓、斯里蘭卡、泰國、越南。
用途：行道樹。

石梓（華石梓）

Gmelina chinensis Benth.

習性：喬木。
產地：大嶼山東涌、羌山、大澳。生於林中。
分佈：福建、廣東、廣西、貴州。

刺石梓 Bristly Bushbeech, Hedgehog

†***Gmelina hystrix** Schult. ex Kurz

習性：攀援灌木。
產地：栽培。
分佈：原產菲律賓。
用途：綠籬。

冬紅屬 *Holmskioldia* Retz..

冬紅花 Chinese Hatplant, Mandarin's Hat

***Holmskioldia sanguinea** Retz..

習性：灌木。
產地：各公園常見栽培。
分佈：原產喜馬拉雅地區。
用途：觀賞。

馬纓丹屬 *Lantana* L.

馬纓丹（如意草） *Lantana*

***Lantana camara** L.

習性：灌木。
產地：全港各地。生於灌叢、曠地。
分佈：原產美洲。華南各地常見，已歸化。

雪白馬纓丹

***Lantana camara** cv. **Snow White**

習性：灌木。
產地：栽培。
分佈：園藝品種，現栽培於世界各地。

小葉馬纓丹（埔地臭金鳳） *Trailing Lantana*

***Lantana montevidensis** (Spreng.) Briq.

習性：灌木。
產地：栽培。
分佈：原產烏拉圭。

三葉臭金鳳 *Three-leaved Lantana*

***Lantana trifolia** L.

習性：灌木。
產地：栽培。
分佈：原產熱帶美洲。

藍花藤屬 *Petrea* L.

藍花藤 (錫葉藤) *Queens Wreath*

**Petrea volubilis* L.

習性：藤本。

產地：栽培。

分佈：原產中美洲。

過江藤屬 *Phyla* Lour.

過江藤

Phyla nodiflora (L.) Greene [*Lippia nodiflora* (L.) Michaux]

習性：藤本。

產地：石澳、大浪灣、奇力山、大帽山、大嶼山。生於溪流兩岸、草地。為常見雜草。

分佈：福建、廣東、貴州、海南、湖北、湖南、江蘇、江西、四川、臺灣、西藏、雲南。廣佈於全世界熱帶亞熱帶地區。

豆腐柴屬 *Premna* L.

傘序臭黃荊 (美娘子)

Premna serratifolia L. (*Premna integrifolia* var. *obtusifolia* Pei)

習性：灌木或喬木。

產地：香港島、清水灣、沙田、企嶺下、青山、馬鞍山、大鵬灣平洲。生於林下、曠地、山坡。

分佈：廣東、廣西、臺灣。亞洲南部和東南部、澳大利亞及太平洋島嶼。

假馬鞭屬 *Stachytarpheta* Vahl

假馬鞭 (假敗醬) *Jamaica Vervain*

**Stachytarpheta jamaicensis* (L.) Vahl

習性：亞灌木或多年生草本。

產地：香港島、馬鞍山、沙田、城門。生於山谷陰蔽草地。

分佈：在福建、廣東、廣西、海南、臺灣、雲南等地已成為歸化種。原產熱帶美洲，現已在舊大陸熱帶地區成為歸化種。

柚木屬 *Tectona* L. f.

柚木 *Teak*

†**Tectona grandis* L. f.

習性：喬木。

產地：栽培。

分佈：廣東、廣西、雲南、福建、臺灣 (栽培或歸化)。原產印度、緬甸、馬來西亞及印度尼西亞。

用途：木材。

馬鞭草屬 *Verbena* L.

**Verbena bonariensis* L.

習性：一年生或多年生草本。

產地：香港島、沙田、大埔。

分佈：原產南美洲。

馬鞭草 *European Verbena*

Verbena officinalis L.

習性：一年生或多年生草本。

產地：鹿頸、大嶼山。生於草地、山坡。

分佈：華南、西南、華東、西北各地。為世界性熱帶及溫帶雜草。

鋪地馬鞭草 *Garden Verbena*

**Verbena* × *hybrida* Voss

習性：一年生草本。

產地：栽培。

分佈：園藝品種，世界各地均有栽培。

**Verbena rigida* Spreng.

習性：多年生草本。

產地：栽培。

分佈：原產巴西南部 and 阿根廷。

†**Verbena tenuisecta* Briq.

習性：多年生草本。

產地：栽培。

分佈：原產南美洲。

牡荊屬 *Vitex* L.

紫花牡荊 *Lilac Chaste-tree*

**Vitex angus-castus* L.

習性：灌木或小喬木。

產地：栽培。

分佈：原產歐洲南部。

白牡荊 *White Chaste-tree*

**Vitex agnus-castus* cv. *Alba* (*Vitex*

angus-castus var. *alba* West)

習性：灌木。

產地：栽培。

分佈：園藝品種，世界各地均有栽培。

黃荊 Yellow Bramble

Vitex negundo L.

習性：灌木或小喬木。

產地：香港各地。生於山坡灌叢。

分佈：華南、西南、西北、華東各地。日本、非洲東部、亞洲東南部、太平洋島嶼。

牡荊

†**Vitex negundo** var. **cannabifolia** (Sieb. & Zucc.) Hand.-Mazz.

習性：灌木或小喬木。

產地：黃泥涌峽、鳳園、羅湖、大嶼山。生於山坡灌叢。

分佈：廣東、廣西、貴州、河北、河南、湖南、四川。印度、尼泊爾、亞洲東南部。

山牡荊 Wild Vitex

Vitex quinata (Lour.) Williams

習性：小喬木。

產地：香港各地。生於山坡林中。

分佈：廣東、廣西、湖南、江西、浙江、福建、臺灣。印度、日本、馬來西亞、菲律賓。

單葉蔓荊（白背蔓荊）

Vitex rotundifolia L. f. (*Vitex trifolia* var. *unifoliata* Schauer)

習性：匍匐灌木。

產地：香港各地。生於海邊沙灘。

分佈：廣東、臺灣、福建、江西、安徽、浙江、江蘇、山東、河北。日本、亞洲東南部、太平洋島嶼。

蔓荊

Vitex trifolia L.

習性：灌木或小喬木。

產地：粉嶺、青山、蓮塘尾、大嶼山。生於

曠地或河岸。

分佈：廣東、廣西、雲南、福建、臺灣。亞洲東南部、澳大利亞、太平洋島嶼。

越南牡荊（小花牡荊）

***Vitex tripinnata** (Lour.) Merrill (*Vitex parviflora* Juss.)

習性：灌木或喬木。

產地：栽培。

分佈：海南。柬埔寨、越南。

292. 唇形科 Labiatae

筋骨草屬 *Ajuga* L.

金瘡小草（筋骨草）

Ajuga decumbens Thunb.

習性：一年生或二年生草本。花期：3—7月；果期：5—11月

產地：全港各地。生於路邊、陰濕山坡、溝邊。

分佈：華南、西南、華東各地。日本、朝鮮。

用途：藥用。

紫背金盤（夏枯草）

Ajuga nipponensis Makino (*Ajuga genevensis* L.)

習性：一年生或二年生草本。花期：4—6月，果期：5—7月。

產地：城門、黃竹坑、屏山、跑馬地。生於田邊、濕處、林中。

分佈：海南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、河北、湖南、江西、江蘇、浙江、福建。日本、朝鮮。

用途：藥用。

紫色匍匐筋骨草 Carpet Bugleweed

†***Ajuga reptans** var. **purpurea** Hort.

習性：草本。

產地：栽培。

分佈：原產歐洲。

用途：觀賞。

廣防風屬 *Anisomeles* R. Br.

廣防風（防風草）Mint

Anisomeles indica (L.) Kuntze

習性：直立草本。花期：8—9月；果期：9—11月。

產地：香港島、九華徑、大埔、田夫仔。青山、大嶼山等。生於曠野、村邊、路旁、林緣。

分佈：華東、華南、西南。亞洲東南部。

用途：藥用。

腎茶屬 *Clerodendranthus* Kudo

腎茶（貓鬚草）

**Clerodendranthus spicatus* (Thunb.) C. Y.

Wu ex H. W. Li

習性：多年生草本。花果期：5—8月。

產地：栽培。

分佈：臺灣、福建、海南、廣西、雲南。印度、印度尼西亞、馬來西亞、緬甸、菲律賓、澳大利亞。

用途：藥用。

風輪菜屬 *Clinopodium* L.

細風輪菜

Clinopodium gracile (Benth.) Matsumura

習性：多年生纖弱草本。花期：6—8月；果期：8—10月。

產地：香港島、大帽山。生於溪邊、灌叢、空曠草地。

分佈：華南、西南、華東、華中各省區。亞洲東南部。

用途：藥用。

鞘蕊花屬 *Coleus* Lour.

芳香鞘蕊花

**Coleus aromaticus* Benth.

習性：草本。

產地：栽培。

分佈：印度至馬來半島有栽培。原產地不詳。

用途：觀賞。

五彩蘇（洋紫蘇） *Coleus*

**Coleus scutellarioides* (L.) Benth.

習性：直立草本。花期：6月。

產地：栽培。

分佈：福建、廣東、廣西、臺灣。亞洲東南部。

用途：觀賞。

小五彩蘇（小洋紫蘇） *Small Coleus*

**Coleus scutellarioides* var. *crispipilus* (Merrill) H. Keng (*Coleus pumilus* Blanco)

習性：直立小草本。花期：6月。

產地：香港各公園有栽培。

分佈：福建、廣東、廣西、臺灣。菲律賓。

用途：觀賞。

水蠟燭屬 *Dysophylla* Blume

水虎尾（邊氏水珍珠菜）

Dysophylla stellata (Loureiro) Benth. (*Dysophylla benthamiana* Hance)

習性：一年生草本。花果期：幾全年。

產地：沙頭角。生於稻田、溪邊濕地。

分佈：華南、西南、華東各省區。亞洲東南部、日本及澳大利亞。

香薷屬 *Elsholtzia* Willd.

紫花香薷

Elsholtzia argyi H. Léveillé [*Elsholtzia ciliata* auct. non (Thunb.) Hyland.: Check List HK Pl. 1993.]

習性：草本。花果期：9—11月。

產地：扯旗山、大帽山。生於林下、灌叢。

分佈：廣東、廣西、貴州、四川、湖北、湖南、安徽、江西、福建、浙江、江蘇。日本、越南（栽培）。

活血丹屬 *Glechoma* L.

活血丹

Glechoma longituba (Nakai) Kuprian.

習性：多年生草本。花期：4—5月；果期：5—6月。

產地：荔枝莊、蛤塘。生於疏林下、溪邊、村邊和路旁。

分佈：除青海、甘肅、新疆、西藏和海南外，全國各地均有分佈。朝鮮、俄羅斯。

用途：藥用。

錐花屬 *Gomphostemma* Wall. ex Benth.

中華錐花

Gomphostemma chinense Oliver

習性：多年生草本。花期：7—8月；果期：10—12月。

產地：大老山、西貢昂平。生於林下濕地。

分佈：廣東、廣西、江西、福建。

用途：藥用。

四輪香屬 *Hanceola* Kudo

四輪香

†**Hanceola sinensis* (Hemsl.) Kudo

習性：多年生草本。花期：7—8月；果期：9月。

產地：栽培。

分佈：廣西、貴州、湖南、四川、雲南。

山香屬 *Hyptis* Jacq.

吊球草

†*Hyptis rhomboidea* Mart. & Gal.

習性：一年生草本。

產地：林村谷、梧桐寨、橫臺山。生於山坡、林緣、曠野、村邊。

分佈：海南、廣東、廣西、臺灣。原產熱帶美洲，現為世界性熱帶雜草。

山香 *Hyptis*

Hyptis suaveolens (L.) Poiteau

習性：一年生草本。花果期：幾全年。

產地：深水灣、大欖涌、青山、河背。生於村邊、曠野和路旁。

分佈：海南、廣東、廣西、福建、臺灣。原產熱帶美洲，現為世界性熱帶雜草。

用途：藥用。

香茶菜屬 *Isodon* (Schrad. ex Benth.) Spach

香茶菜

Isodon amethystoides (Benth.) H. Hara (*Plectranthus amethystoides* Benth.)

習性：多年生草本。花期：6—10月；果期：9—11月。

產地：大帽山、粉嶺。生於林中或潮濕草地上。

分佈：廣東、廣西、貴州、湖北、安徽、江西、福建、浙江、臺灣。

用途：藥用。

細錐香茶菜

Isodon coesta (Buch. ex Ham. & D. Don)

Kudo

習性：多年生草本。花果期：10月至翌年2月。

產地：大帽山。生於灌叢、林緣和溪邊。

分佈：廣東、廣西、湖南、貴州、雲南、四川和西藏。尼泊爾、印度、緬甸、老撾和越南。

線紋香茶菜

Isodon lophanthoides (Buch.-Ham. ex D. Don) H. Hara (*Plectranthus striatus* Benth.)

習性：多年生草本。花果期：8—12月。

產地：亞媽笏，上苗田，大嶼山。生於林中、灌叢或溪邊。

分佈：廣東、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、湖北、湖南、江西、福建、浙江、印度、緬甸、尼泊爾、泰國、越南。

用途：藥用。

牛尾草

Isodon ternifolius (D. Don) Kudo (*Plectranthus ternifolius* D. Don)

習性：多年生草本。花期：9月至翌年2月；果期：12月至翌年5月。

產地：大帽山。生於山坡草地或灌叢。

分佈：廣東、廣西、貴州、雲南。孟加拉、印度、緬甸、尼泊爾、越南。

用途：藥用。

薰衣草屬 *Lavandula* L.

薰衣草 True Lavender

**Lavandula angustifolia* Miller

習性：亞灌木。花期：6月。

產地：栽培。

分佈：全國各地均有栽培。歐洲、非洲。

用途：藥用、觀賞。

益母草屬 *Leonurus* L.

益母草 (紅花艾) Mother-wort

Leonurus japonicus Houttuyn [*Leonurus artemisia* (Lour.) S. Y. Hu]

習性：一或二年生草本。花期：6—9月；果

期：9—10月。
產地：大埔滘、大埔、元朗、大嶼山。生於村邊、路旁、曠野。
分佈：全國各地。柬埔寨、老撾、越南、泰國、緬甸、馬來西亞、日本、朝鮮、非洲、美洲。
用途：藥用。

繡球防風屬 *Leucas* R. Br.

線葉白絨草

Leucas lavandulifolia Smith

習性：直立草本。花期：10—12月；果期：12月至翌年1月。
產地：柴灣。生於路邊、灌叢、林緣。
分佈：廣東、雲南。印度、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、泰國；非洲。

疏毛白絨草（柔毛繡球防風）

Leucas mollissima var. *chinensis* Benth. (*Leucas flaccida* R. Br.)

習性：直立草本。花果期：12月。
產地：上水、螺洲、大嶼山貝澳、長洲、蒲台、石澳、掃桿埔、嘉道理農場。生於山坡、丘陵。
分佈：海南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、湖北、湖南、福建。日本。
用途：藥用。

皺面草（錫蘭繡球防風） Ceylon *Leucas*

Leucas zeylanica (L.) R. Br.

習性：直立草本。花果期：幾全年。
產地：香港各地。常生於海濱荒地。
分佈：海南、廣東、廣西。印度、斯里蘭卡、緬甸、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓。
用途：藥用。

歐夏至草屬 *Marrubium* L.

歐夏至草 Common Hoarhound

**Marrubium vulgare* L.

習性：多年生草本。花期：6—8月；果期：7—9月。
產地：栽培。
分佈：新疆。阿富汗、印度、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、巴基斯坦、俄羅斯、

塔吉克斯坦、土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦、亞洲東南部、歐洲。

用途：藥用。

薄荷屬 *Mentha* L.

薄荷 Peppermint

**Mentha canadensis* L. (*Mentha haplocalyx* Briq.)

習性：多年生草本。花期：7—9月；果期：10月。
產地：新界有栽培。
分佈：全國各地。亞洲東南部、俄羅斯遠東地區、北美洲。
用途：香料。

涼粉草屬 *Mesona* Blume

涼粉草（仙草） Chinese *Mesona*

Mesona chinensis Benth.

習性：草本。花果期：6—10月。
產地：石澳、大潭、城門、大帽山。生於疏林下。
分佈：海南、廣東、廣西、江西、浙江、臺灣。
用途：全草用於製作涼粉。

石薺屬 *Mosla* (Benth.)

Buch.-Ham. ex Maxim.

小魚仙草

Mosla dianthera (Buch.-Ham. ex Roxb.) Maxim.

習性：一年生草本。花果期：5—11月。
產地：大埔滘。生於路旁、荒地上。
分佈：華南、華東、西南、華中各省區。不丹、印度、日本、馬來西亞、緬甸、尼泊爾、巴基斯坦、越南。
用途：藥用。

石薺

†*Mosla scabra* (Thunberg) C. Y. Wu & H. W. Li

習性：一年生草本。花期：5—11月；果期：9—12月。
產地：嶂上。
分佈：甘肅、廣東、廣西、臺灣、福建、江西、浙江、江蘇、安徽、湖南、湖北、

四川、陝西、河南、遼寧。日本、越南。
用途：藥用。

羅勒屬 *Ocimum* L.

羅勒（熏尊、九層塔）

Ocimum basilicum L.

習性：一年生草本。花期：7—9月；果期：9—12月。

產地：新界。生於曠野、路旁和村邊。

分佈：全國大部分省區均有分佈。亞洲、非洲。

用途：香料。

聖羅勒

†*Ocimum tenuiflorum* L. (*Ocimum sanctum* L.)

習性：亞灌木。花期：2—6月；果期：3—8月。

產地：鹿頸。生於乾燥草地上。

分佈：海南、四川、臺灣。亞洲東南部、非洲、澳大利亞。

用途：食物配料。

牛至屬 *Origanum* L.

†**Origanum majorana* L. (*Majorana hortensis* Moench)

習性：一年生或多年生草本。

產地：栽培。

分佈：原產非洲北部和亞洲西南部。

用途：調味。

假糙蘇屬 *Paraphlomis* (Prain) Prain

小葉假糙蘇（假糙蘇）

Paraphlomis javanica var. *coronata* (Vaniot) C. Y. Wu & H. W. Li [*Paraphlomis javanica* (Blume) Prain]

習性：草本。花期：6—8月；果期：8—12月。

產地：柏架山、西貢昂平、大帽山、梧桐寨。生於林下。

分佈：海南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、湖南、江西、臺灣。

用途：藥用。

紫蘇屬 *Perilla* L.

紫蘇 *Perilla*

**Perilla frutescens* (L.) Britton

習性：一年生草本。花期：8—11月；果期：8—12月。

產地：栽培。

分佈：全國各地均有栽培。亞洲東南部。

用途：藥用。

野生紫蘇

†*Perilla frutescens* var. *purpurascens* (Hayata) H. W. Li

習性：一年生草本。花期：8—11月；果期：8—12月。

產地：野生或栽培。生於曠野、村邊。

分佈：全國大部分省區均有野生或栽培。日本。

刺蕊草屬 *Pogostemon* Desf.

水珍珠菜（毛水珍珠菜）

Pogostemon auricularius (L.) Hassk. [*Dysophylla auricularia* (L.) Blume]

習性：一年生草本。花果期：4—11月。

產地：大潭、茅坪、白沙澳、大埔、城門、大帽山、下坑、鹿頸。生於溪邊、林下濕地。

分佈：廣東、廣西、雲南、江西、福建、臺灣。柬埔寨、老撾、越南、泰國、緬甸、印度、斯里蘭卡、馬來西亞、菲律賓、印度尼西亞。

短穗刺蕊糙（杉氏刺蕊草）*Pogostemon*

Pogostemon championii Prain

習性：直立亞灌木。

產地：大帽山、大埔鳳園、下坑。

分佈：廣東。

鼠尾草屬 *Salvia* L.

華鼠尾草

†*Salvia chinensis* Benth.

習性：一年生草本。花期：8—10月。

產地：香港仔、奇力山、馬鞍山、大東山。生於林下、林緣或草叢中。

分佈：廣東、廣西、四川、湖南、江西、福

建、臺灣、浙江、江西、安徽、江蘇、山東。
用途：藥用。

朱唇

†**Salvia coccinea* Buc'hoz ex Etlinger
習性：多年生草本。花期：4—6月。
產地：栽培。
分佈：原產美洲，世界各地均有栽培。
用途：觀賞。

粉萼鼠尾草（藍絲線）Blue Sage

**Salvia farinacea* Benth.
習性：多年生草本。
產地：栽培。
分佈：原產美國。
用途：觀賞。

鼠尾草 Japanese Sage

Salvia japonica Thunb.
習性：一年生草本。花期：6—9月。
產地：大帽山、大嶼山、馬鞍山等地。生於林邊、路旁。
分佈：廣東、廣西、臺灣、福建、江西、浙江、江蘇、安徽、湖北。日本。

白鼠尾草 White Sage

**Salvia leucantha* Cav.
習性：灌木。
產地：香港有栽培。
分佈：原產墨西哥。

撒爾維亞 Sage

**Salvia officinalis* L.
習性：多年生草本。花期：4—6月。
產地：栽培。
分佈：原產歐洲。
用途：藥用、觀賞。

荔枝草（雪見草）Salvia

Salvia plebeia R. Br.
習性：一年生或二年生草本。花期：4—5月；果期：6—7月。
產地：梅子林、粉嶺。生於村邊、田野和林

緣。

分佈：除新疆、青海、甘肅、西藏外，各省區均有分佈。亞洲東南部、澳大利亞。
用途：藥用。

一串紅（西洋紅）Scarlet Sage

**Salvia splendens* Ker-Gawl.
習性：亞灌木狀草本。花期：3—10月。
產地：庭園及公園栽培。
分佈：原產巴西，全世界熱帶和溫帶地區均有栽培。
用途：觀賞。

Satureja L.

Winter Savory

**Satureja montana* L.
習性：多年生草本。
產地：栽培。
分佈：原產地中海地區。
用途：觀賞。

黃芩屬 *Scutellaria* L.

半枝蓮

Scutellaria barbata D. Don
習性：草本。花果期：4—9月。
產地：城門、大埔、鳳坑。生於田埂、草地、溪邊。
分佈：華南、西南、華東、華中、西北、華北各地。
用途：藥用。

藍花黃芩

Scutellaria formosana N. E. Br.
習性：多年生草本。花期：8—9月；果期：10—11月。
產地：深井、黃龍坑、大東山。生於林下。
分佈：海南、廣東、江西、福建、雲南。

韓信草（耳挖草）Skullcap

Scutellaria indica L.
習性：多年生草本。花期：6月；果期：8—9月。
產地：香港各地。生於路邊、草地或林緣。
分佈：河南、陝西及長江流域及其以南各省

區。亞洲東南部、日本、朝鮮。
用途：藥用。

偏花黃芩 Taylor's Skullcap

Scutellaria tayloriana Dunn

習性：多年生草本。花期：3—5月。
產地：大帽山、大東山。生於林下或灌叢。
分佈：廣東、廣西、貴州、湖南。
用途：藥用。

水蘇屬 *Stachys* L.

地蠶 (野芝麻)

***Stachys geobombycis** C. Y. Wu (*Lamium chinense* Benth.)

習性：多年生草本。花期：4—5月。
產地：紅梅谷。生於山地田邊、潮濕荒地。
分佈：廣東、廣西、湖南、江西、福建。
用途：藥用。

香科科屬 *Teucrium* L.

鐵軸草 (牛尾草) Germander

Teucrium quadrifarinum Buch.-Ham. ex D. Don

習性：亞灌木。花期：7—9月。
產地：薄扶林、扯旗山、聶高信山、金馬倫山、香港仔、淺水灣、深水灣。
分佈：廣東、廣西、貴州、雲南、湖南、江西、福建等省區。亞洲東南部。
用途：藥用。

血見愁 (山藿香) Sticky Germander

Teucrium viscidum Blume (*Teucrium japonicum* Willd.)

習性：多年生草本。花期：6—11月。
產地：香港各地。生於林下濕地。
分佈：長江以南各省區。亞洲東南部。
用途：藥用。

百里香屬 *Thymus* L.

百里香 Common Thyme

***Thymus vulgaris** L.

習性：灌木。
產地：栽培。
分佈：原產地中海地區。
用途：觀賞。

294. 水馬齒科

Callitrichaceae

水馬齒屬 *Callitriche* L.

水馬齒 Water starwort

Callitriche stagnalis Scop.

習性：草本。花果期：6-9月。
產地：林村。生於水溝邊、沼澤地。
分佈：雲南、西藏。全球熱帶地區。

296. 車前草科

Plataginaceae

車前草屬 *Plantago* L.

長葉車前 Long-leaved Plantain

Plantago lanceolata L.

習性：多年生草本。花期：夏秋季。
產地：扯旗山、黃泥涌峽。生於路邊、荒地中。
分佈：華南、華東、東北；歐洲。

車前草 Plantain

Plantago major L.

習性：多年生草本。花期：夏-秋季。
產地：薄扶林、元墩下、大埔、上水、元朗、烏蛟騰、西貢、大嶼山。生於路邊、荒地中，亦有田園栽培。
分佈：廣佈歐、亞兩洲。
用途：藥用。

297. 醉魚草科 Buddlejaceae

醉魚草屬 *Buddleja* L.

白背楓 (駁骨丹) Bai bei feng

Buddleja asiatica Lour.

習性：灌木。花期：2-10月；果期：3-12月。
產地：灣仔峽、白加道、寶雲道、大嶼山、東涌、飛鵝山、長洲、嘉道理農場。生於山地疏林下或灌木叢中。
分佈：臺灣、福建、廣東、海南、廣西、湖南、湖北、江西、山西、四川、貴州、雲南、西藏。亞洲熱帶地區。
用途：藥用、觀賞。

大葉醉魚草 Orange-eye, Butterfly-bush

***Buddleja davidii** Franch.

習性：灌木。花期：5-10 月；果期：9-12 月。

產地：動植物公園。栽培。

分佈：江蘇、浙江、湖北、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、甘肅、陝西、西藏。日本、馬來西亞、印度尼西亞、美國及非洲有栽培。

用途：觀賞、藥用。

醉魚草 (百寶花) *Zui yu cao*

Buddleja lindleyana Fort.

習性：灌木。花期：4-10 月；果期：8 月至翌年 4 月。

產地：灣仔峽。生於山地疏林下或路旁灌叢中。

分佈：江西、福建、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、湖南、湖北、江蘇、安徽、浙江。馬來西亞、日本；美洲及非洲有栽培。

用途：藥用、觀賞。全株有毒。

漿果醉魚草 (醉魚藤) *Smoke Bush*

***Buddleja madagascariensis** Lam.

習性：匍匐狀灌木。花期：4-6 月；果期：8-11 月。

產地：公園栽培。

分佈：福建、廣東、廣西有引種。原產馬達加斯加，現亞洲熱帶及亞熱帶地區有栽培。

用途：藥用、觀賞。

密蒙花 *Mi meng hua*

***Buddleja officinalis** Maxim.

習性：灌木。花期：3-6 月；果期：5-9 月。

產地：庭園或公園栽培。

分佈：山西、陝西、甘肅、江蘇、安徽、福建、河南、湖北、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、西藏。不丹、緬甸、越南。

用途：藥用、觀賞。

298. 木犀科 *Oleaceae*

流蘇樹屬 *Chionanthus* L.

流蘇樹 *Tassel Tree*

Chionanthus retusus Lindl. & Paxt.

習性：落葉灌木或喬木。花期：3-6 月；果期：6-11 月。

產地：大嶼山。

分佈：甘肅、陝西、山西、河北、河南、四川、廣東、福建和臺灣。日本和朝鮮。

白臘樹屬 *Fraxinus* L.

中國白蠟 *Chinese Ash*

***Fraxinus chinensis** Roxb.

習性：常綠灌木。花期：4-5 月；果期：7-9 月。

產地：南灣路、青山公路。栽培。

分佈：中國南北廣泛分佈。越南、朝鮮。

用途：觀賞、藥用。

光臘樹 *Formosa Ash*

Fraxinus griffithii C.B. Clarke (*Fraxinus formosana* Hayata)

習性：半落葉喬木。花期：5-7 月；果期：7-11 月。

產地：大東山、羌山、鳳凰山。生於林中。

分佈：臺灣、福建、湖北、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南和四川。印度、孟加拉、日本、菲律賓、印度尼西亞。

苦檻木 *Chinense Ash*

Fraxinus insularis Hemsl. (*Fraxinus retusa* Champ. ex Benth.)

習性：落葉大喬木。花期：4-5 月；果期：7-9 月。

產地：跑馬地、黃竹坑、深水灣、奇力山、馬鞍山。生於林中，也有栽培。

分佈：長江以南各省區。日本也有分佈。

素馨屬 *Jasminum* L.

扭肚藤 *Mock Jasmine*

Jasminum elongatum (Bergius) Willd.

(*Jasminum amplexicaule* Buch.-Ham.)

習性：攀援灌木。花期：4-12 月；果期：8 月至翌年 3 月。

產地：香港島。生於林緣和灌叢中。
分佈：海南、廣東、廣西和雲南、越南、緬甸至喜馬拉雅地區一帶。
用途：庭園觀賞、藥用。

清香藤 Hong Kong Jasmine

Jasminum lanceolarium Roxb.

習性：大型攀援灌木。花期：4-10月；果期：6月至翌年3月。

產地：香港各地。生於林緣和灌叢中。
分佈：長江流域以南各省區以及臺灣、陝西、甘肅。

用途：藥用、芳香油。

雲南黃素馨 Yellow Jasmine

***Jasminum mesnyi** Hance

習性：常綠直立亞灌木。花期：11月至翌年8月；果期：3-5月。

產地：香港園林中常見栽培。

分佈：中國廣泛栽培。

用途：庭園觀賞。

毛茉莉 Hairy Jasmine

***Jasminum multiflorum** (Burm. f.) Andr.

習性：攀援灌木。花期：10月至翌年4月。

產地：栽培。

分佈：全世界廣泛栽培。原產東南亞和印度。

用途：庭園觀賞。

***青藤仔** Veined Jasmine

Jasminum nervosum Lour.

習性：攀援灌木。花期：3-7月；果期：4-10月。

產地：扯旗山、炮臺里、香港動植物公園等。

分佈：臺灣、廣東、海南、廣西、貴州、雲南和西藏。印度、不丹、緬甸、越南、老撾和柬埔寨。

茉莉花 Arabian Jasmine

***Jasminum sambac** (L.) Ait.

習性：直立或攀援灌木。5-8月；果期：7-9月。

產地：香港園林中常見栽培。

分佈：全世界廣泛栽培。原產印度。

用途：庭園觀賞、芳香油、窰茶、藥用。

華素馨

Jasminum sinense Hemsl.

習性：攀援灌木。

產地：鶴咀、大帽山。

分佈：華南、華東、西南、華中。

女貞屬 Ligustrum L.

臺灣女貞 Formosa Privet

Ligustrum amamianum Koidz. (*Ligustrum japonicum* Thunb.)

習性：灌木或小喬木。花期：5月；果期：11-12月。

產地：鶴咀、扯旗山、大帽山和大嶼山。

分佈：臺灣、日本。

女貞 Glossy Privet

***Ligustrum lucidum** Aiton

習性：灌木或喬木。花期：5-7月；果期：7月至翌年5月。

產地：公園和屋村附近。栽培。

分佈：長江以南各省區，西至陝西和甘肅、朝鮮。

用途：綠籬或放養白蠟蟲、藥用。

斑葉女貞

Ligustrum punctifolium M. C. Chang
(*Ligustrum strongylophyllum* auct. non Hemsl.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：灌木。花期：6-8月；果期：8-10月。

產地：深涌、三桠村、三桠涌。

分佈：陝西、甘肅、湖北和四川。

山指甲 Chinese Privet

Ligustrum sinense Lour.

習性：落葉灌木或喬木。3-6月；果期：9-12月。

產地：香港庭園、公園或街道常栽培。

分佈：江蘇、浙江、安徽、江西、福建、臺灣、湖北、湖南、廣東、廣西、貴州、四川、雲南。越南。

用途：綠籬、藥用、果可釀酒、種子可榨油制皂。

李欖屬 *Linociera* Sw.

枝花李欖 Black-bark *Linociera*

†*Linociera ramiflora* (Roxb.) Wall. ex G. Don (*Chionanthus ramiflorus* Roxb.)

習性：灌木或喬木。花期：12 月至翌年 6 月；果期：5 月至翌年 3 月。

產地：馬鞍山、烏蛟騰。

分佈：雲南、貴州、廣東、海南、廣西和臺灣。東南亞和澳大利亞。

用途：芳香油、材用。

木犀欖屬 *Olea* L.

異株樺欖 Dioecious Olive

†*Olea dioica* Roxb.

習性：灌木或小喬木。花期：3-7 月；果期：5-12 月。

產地：大帽山、梧桐寨、蚌蛇尖、上禾坑。

分佈：廣東、廣西、貴州和雲南。印度、緬甸、越南。

用途：材用、藥用。

木犀屬 *Osmanthus* Lour.

桂花 (木犀) Kwai-Fah

**Osmanthus fragrans* (Thunb.) Lour.

習性：常綠喬木或灌木。花期：9-10 月；果期：翌年 3 月。

產地：庭園及公園栽培。

分佈：原產中國西南部。

用途：庭園綠化、花可窰茶和浸酒，芳香油、藥用。

厚邊木犀 (月桂) *Marginate Osmanthus*

Osmanthus marginatus (Champ. ex Benth.) Hemsl.

習性：常綠灌木或喬木。花期：5-6 月；果期：11-12 月。

產地：香港島、沙田、北潭涌、浪茄和大嶼山。

分佈：廣東、廣西、貴州、雲南、四川、安徽、浙江、江西、湖南和臺灣。日本。

用途：庭園綠化。

牛矢果 Taiwan *Osmanthus*

Osmanthus matsumuranus Hayata

習性：常綠灌木或喬木。花期：5-6 月；果期：11-12 月。

產地：城門、蠔涌、大圍、大埔滘、元墩下、大嶼山。生於林中。

分佈：廣東、廣西、雲南、貴州、江西、浙江、安徽、臺灣。印度、緬甸、中南半島和日本。

用途：藥用。

小葉月桂 Small *Osmanthus*

†*Osmanthus minor* P. S. Green

習性：常綠灌木或喬木。花期：5-6 月；果期：11-12 月。

產地：大帽山和竹角。生於林中。

分佈：廣東、廣西、江西、福建、浙江。

299. 玄參科

Scrophulariaceae

毛麝香屬 *Adenosma* R. Br.

毛麝香 *Adenosma*

Adenosma glutinosum (L.) Druce

習性：草本。花果期：7-10 月。

產地：香港各地。生於灌叢中、路旁或草地上。

分佈：海南、廣東、廣西、江西、福建、雲南。南亞、東南亞及大洋洲。

用途：藥用、觀賞。

球花毛麝香 Headed-flowered *Adenosma*

Adenosma indianum (Lour.) Merr.

習性：草本。花果期：9-11 月。

產地：粉嶺。生於草地上。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南。南亞、東南亞。

用途：藥用。

金魚草屬 *Antirrhinum* L.

金魚草 Snapdragon

**Antirrhinum majus* L.

習性：一年生草本。花期：夏秋季。

產地：栽培。

分佈：原產地中海沿岸，現世界各地廣泛栽培。

用途：觀賞。

假馬齒莧屬 *Bacopa* Aubl.

假馬齒莧 Water Hyssop

Bacopa monnieri (L.) Wettst.

習性：草本。花期：5-10 月。

產地：大浪灣、沙田、船灣、荔枝窩、鹿頸、吉澳島。生於濕地上。

分佈：海南、廣東、福建、臺灣、雲南。全球熱帶地區。

用途：藥用。

田玄參 Creeping Waterhyssop

†***Bacopa repens*** (Sw.) Wettst.

習性：草本。花期：7-8 月。

產地：大網仔、蕉坑、坪洲。生於水旁或濕地上。

分佈：海南、廣東、福建。

黑草屬 *Buchnera* L.

黑草（鬼羽箭） Blue Hearts

Buchnera cruciata Hamilt.

習性：草本。花果期：4 月至翌年 1 月。

產地：打鼓嶺。生於山坡、曠野。

分佈：海南、廣東、廣西、福建、江西、湖南、湖北、雲南、貴州。南亞、東南亞。

用途：藥用。

胡麻草屬 *Centranthera* R.Br

胡麻草 Cochinchina *Centranthera*

Centranthera cochinchinensis (Lour.) Merr.

習性：草本。花果期：6-10 月。

產地：灣仔、紫羅蘭山、馬鞍山、榕樹澳。生於草地上。

分佈：長江以南各省區。熱帶亞洲、大洋洲。

矮胡麻草 Dwarf *Centranthera*

Centranthera tranquebarica (Spreng.) Merr.

[*Centranthera lepida* auct. non (Roxb.)
Hand.-Mazz.: Check List HK Pl.
1993.]

習性：草本。花果期：7-10 月。

產地：粉嶺。生於草地或路旁。

分佈：海南、廣東。熱帶亞洲。

虻眼屬 *Dopatrium* Buch.-Ham. ex
Benth.

虻眼 Rushlike *Dopatrium*

Dopatrium juncum (Roxb.) Buch.-Ham. ex
Benth.

習性：草本。花期：8-11 月。

產地：香港。生於潮濕處。

分佈：海南、廣東、廣西、江西、江蘇、河南、陝西、雲南、臺灣。日本、印度、東南亞、大洋洲。

石龍尾屬 *Limnophila* R. Br.

紫蘇草 Sparrow Herb

Limnophila aromatica (Lam.) Merr.

習性：草本。花果期：3-9 月。

產地：香港仔、大坳門、西貢西灣、大嶼山。生於濕地上。

分佈：海南、廣東、江西、福建、臺灣。日本、熱帶亞洲、澳大利亞。

用途：藥用。

中華石龍尾（毛石龍尾） Chinese
Marshweed

Limnophila chinensis (Osb.) Merr.

習性：草本。花果期：10 月至翌年 5 月。

產地：城門、大帽山、大灣（西貢）。生於濕地上。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南。熱帶亞洲、澳大利亞。

異葉石龍尾 Diversileaf Marshweed

Limnophila heterophylla (Roxb.) Benth.

習性：草本。花期：7 月。

產地：黃泥涌、粉嶺。生於池塘中。

分佈：廣東、江西、臺灣。熱帶亞洲。

大葉石龍尾 Big-leaved Marshweed

Limnophila rugosa (Roth) Merr.

習性：草本。花果期：8-11 月。

產地：香港仔、大嶼山。生於草地上或山谷水旁。

分佈：海南、廣東、湖南、福建、臺灣、雲南。日本、熱帶亞洲。

用途：藥用。

石龍尾 Sessile Marshweed

†*Limnophila sessiliflora* (Vahl) Blume

習性：草本。花果期：7月至翌年11月。

產地：粉嶺。生於池塘或濕地上。

分佈：海南、廣東、廣西、福建、江西、湖南、安徽、河南、遼寧、雲南、貴州、四川、江蘇、浙江。朝鮮、日本、印度、尼泊爾、不丹、越南、馬來西亞、印度尼西亞。

母草屬 *Lindernia* All.

長蒴母草（長果母草） Longcapsuled Falsepimpernel

Lindernia anagallis (Burm. f.) Pennell

習性：草本。花期：4-9月；果期：6-11月。

產地：香港仔、大圍、川龍、大埔、粉嶺、西貢。生於林邊、溪旁及田野的潮濕處。

分佈：海南、廣東、廣西、江西、湖南、雲南、四川、貴州、福建、臺灣。

用途：藥用。

狹葉母草 Narrowleaf Falsepimpernel

Lindernia angustifolia (Benth.) Wettst.
(*Lindernia micrantha* D. Don)

習性：草本。花期：5-10月；果期：7-11月。

產地：城門、船灣、東涌。生於田野及河旁潮濕處。

分佈：海南、廣東、廣西、福建、江西、湖南、湖北、安徽、河南、貴州。日本、越南、朝鮮、老撾、柬埔寨、印度尼西亞、緬甸、印度、尼泊爾、斯里蘭卡。

泥花草 Creeping Falsepimpernel

Lindernia antipoda (L.) Alston

習性：草本。花果期：春季至秋季。

產地：城門、沙田、粉嶺、大欖涌、大嶼山。生於林緣、溪邊及田野潮濕處。

分佈：海南、廣東、廣西、江西、湖南、湖北、安徽、雲南、四川、貴州、江蘇、浙江、福建、臺灣。

用途：藥用。

刺齒泥花草 Ciliate Falsepimpernel

Lindernia ciliata (Colsm.) Pennell

習性：草本。花果期：夏季至冬季。

產地：香港仔、粉嶺。生於林緣、路旁潮濕處。

分佈：海南、廣東、廣西、福建、臺灣、雲南、西藏。熱帶亞洲及澳大利亞。

用途：藥用。

母草 Brittle Falsepimpernel

Lindernia crustacea (L.) F. Muell

習性：草本。花果期：全年。

產地：香港島、葵涌、城門、蕉坑、打鼓嶺、坪洲、大嶼山、大鵬灣半洲。

分佈：長江以南各省區、河南。熱帶和亞熱帶地區廣佈。

用途：藥用。

尖果母草 Sharp-fruit Falsepimpernel

Lindernia hyssopioides (L.) Haines

習性：草本。花期：5-10月；果期：8-11月。

產地：香港。生於潮濕處。

分佈：海南、廣東、雲南。印度至印度尼西亞。

梭萼母草 Oblong Falsepimpernel

†*Lindernia oblonga* (Benth.) Merr. & Chun

習性：草本。花期：5-7月；果期：8-10月。

產地：鶴咀、西貢西灣、浪茄、螺洲、南丫島。

分佈：海南、越南、老撾、柬埔寨。

陌上菜 Procumbent Falsepimpernel

Lindernia procumbens (Krock.) Philcox

習性：草本。花期：7-10月；果期：9-11月。

產地：川龍、白坭、上水。生於溪邊潮濕處。分佈：幾遍全國。歐洲南部至日本，南至馬來西亞。

細莖母草 Slenderstem Falsepimpernel

Lindernia pusilla (Willd.) Boldingh

習性：草本。花期：5-9月；果期：9-11月。

產地：香港仔、沙田、城門、鳳園、梅子林、蠔涌、大澳。生於林緣或溪澗旁潮濕

處。
分佈：海南、廣東、廣西、雲南、臺灣。印度、馬來西亞、非洲。

旱田草 Dry Falsepimpernel

Lindernia ruellioides (Colsm.) Pennell

習性：草本。花期：6-9月；果期：7-10月。
產地：鳳園、梧桐寨。生於溪澗邊潮濕處。
分佈：海南、廣東、廣西、江西、湖南、湖北、福建、雲南、臺灣、四川、貴州、西藏。印度至印度尼西亞、菲律賓。
用途：藥用。

通泉草屬 Mazus Lour.

通泉草 Japanese Mazus

Mazus pumilus (Burm. f) Van Steenis [*Mazus japonicus* (Thunb.) Kuntze]

習性：草本。生於曠地或林緣。
產地：大圍、大欖涌、大嶼山。生於路邊和草地中。
分佈：幾遍全國。俄羅斯、朝鮮、日本、越南、菲律賓。
用途：藥用。

小果草屬 Microcarpaea R. Br.

小果草 (微果草) Small Microchloa

Microcarpaea minima (Koen.) Merr.

習性：草本。花期：7-10月。
產地：沙田、蕉坑、烏蛟騰、粉嶺。生於濕地上。
分佈：廣東、浙江、臺灣。印度、馬來西亞、印度尼西亞、澳大利亞。

泡桐屬 Paulownia Sieb. & Zucc

白花泡桐 (泡桐) Foxglove Tree

***Paulownia fortunei** (Seem.) Hemsl.

習性：喬木。花期：3-4月；果期：7-8月。
產地：栽培。
分佈：長江以南各省區。越南、老撾。
用途：園林綠化樹種。

苦玄參屬 Picria Lour.

苦玄參 Common Pocrina

†**Picria fel-terrae** Lour.

習性：草本。花期：夏、秋季。

產地：鳳園。

分佈：廣東、廣西、雲南、貴州。印度至菲律賓。

爆仗竹屬 Russelia Jacq.

爆仗竹 (吉祥草) Coral-plat

***Russelia equisetiformis** Schltr. & Cham.

習性：草本。花期：夏季。
產地：公園及庭園有引種栽培。
分佈：華南各地常見栽培。原產中美洲。
用途：觀賞。

毛爆仗花 Antiqua Sage

***Russelia sarmentosa** Jacq.

習性：草本。
產地：公園有引種栽培。
分佈：廣州有引種。原產熱帶美洲。

野甘草屬 Scoparia L.

野甘草 Sweet Broomwort

***Scoparia dulcis** L.

習性：草本。花果期：春、夏季。
產地：香港各地。生於曠野、路旁。
分佈：海南、廣東、廣西、福建、雲南。原產熱帶美洲。
用途：藥用。

陰行草屬 Siphonostegia Benth.

陰行草 Chinese Siphonostegia

Siphonostegia chinensis Benth.

習性：草本。花果期：6-9月。
產地：香港島、南丫島。生於草地、路旁。
分佈：遍佈全國。俄羅斯、朝鮮、日本。
用途：藥用。

腺毛陰行草 Glandularhair Siphonostegia

Siphonostegia laeta S. Moore.

習性：草本。花期：7-9月。
產地：深水灣、金夫人馳馬徑。生於曠地或林緣。
分佈：廣東、江西、湖南、安徽。

短冠草屬 Sopubia Buch.-Ham.

毛果短冠草 (短冠草) Hairfruit Sopubia

Sopubia lasiocarpa P. C. Tsoong (*Sopubia*)

stricta auct. non G. Don: Check List
HK Pl. 1993.)

習性：草本。花期：秋季。
產地：粉嶺。生於曠野。
分佈：華南、西南。

獨腳金屬 *Striga* Lour.

獨腳金 Asiatic *Striga*

***Striga asiatica* (L.) Kuntze (*Striga lutea*
Lour.)**

習性：半寄生草本。花期：秋季。
產地：黃泥涌峽、馬鞍山、大尾篤、西貢西
灣、南丫島、大東山。生於草地上。
分佈：海南、廣東、廣西、江西、湖南、福
建、臺灣、雲南、貴州。
用途：藥用。

大獨腳金 Large Asiatic *Striga*

***Striga masuria* Benth.**

習性：多年生草本。花期：夏秋。
產地：深水灣。生於草地上。
分佈：四川、雲南、貴州、廣西、廣東湖南、
福建、臺灣、江蘇。印度、緬甸至菲
律賓。

蝴蝶草屬 *Torenia* L.

毛葉蝴蝶草 Bentham *Torenia*

***Torenia benthamiana* Hance (*Torenia hirsuta*
auct. non. Lam.: Check List HK Pl.
1993.)**

習性：草本。花果期：8月至翌年5月。
產地：深水灣、大埔、鳳園、粉嶺、大澳。
生於荒地、路旁或溪旁潮濕處。
分佈：海南、廣東、廣西、福建、臺灣。

二花蝴蝶草 Twoflower *Torenia*

†***Torenia biniflora* Chin & Hong**

習性：草本。花期：7-10月。
產地：大帽山、馬鞍山、柏架山。生於山頂
次生林中。
分佈：廣東、廣西。

單色蝴蝶草 (單色翼萼) Concolorous
Torenia

***Torenia concolor* Lindl.**

習性：草本。花果期：5-11月。

產地：香港島、城門、大帽山、大埔滘。生
於草地或林緣。

分佈：廣東、廣西、貴州、臺灣。

黃花蝴蝶草 (黃花翼萼) Yellowflower
Torenia

***Torenia flava* Buch.-Ham. ex Benth.**

習性：草本。花果期：6-11月。
產地：大帽山。生於草地上。
分佈：海南、廣東、廣西、臺灣。南亞至東
南亞。

紫斑蝴蝶草 (紫斑翼萼) Ford *Torenia*

***Torenia fordii* Hook. f.**

習性：草本。花果期：7-10月。
產地：梧桐寨、城門。生於路邊、林緣。
分佈：廣東、江西、湖南、福建。

藍豬耳 Blue *Torenia*

****Torenia fournieri* Linden ex Fourn.**

習性：草本。花果期：6-12月。
產地：香港有引種栽培或逸為野生。
分佈：華南各地常見栽培或逸為野生。原產
越南。

光葉蝴蝶草 Glabrous *Torenia*

***Torenia glabra* Osbeck**

習性：草本。花果期：5月至翌年1月。
產地：梅子林。
分佈：海南、廣東、廣西、福建、江西、湖
南、湖北、雲南、四川、貴州、西藏、
浙江。

婆婆納屬 *Veronica* L.

阿拉伯婆婆納 Iran Speedwell

****Veronica persica* Poir. (*Veronica tournefortii*
C. C. Gmel; *Veronica didyma* auct. non
Tenore: Check List HK. Pl. 1993.)**

習性：草本。花期：2-5月。
產地：大帽山、大嶼山。生於草地上。
分佈：華南、華中、西南、華東。原產亞洲
西部及歐洲。

水苦蕒 Speedwell

Veronica undulata Wall.

習性：草本。花期：2-5 月。

產地：沙田。生於村邊或田野潮濕處。

分佈：幾遍全國。朝鮮、日本、尼泊爾、印度、巴基斯坦。

用途：藥用。

301. 苦檻藍科 Myoporaceae

苦檻藍屬 *Myoporum* Banks & Sol.
ex Forst. f.

苦檻藍 *Myoporum*

Myoporum bontioides (Sieb. & Zucc.) A.
Gray

習性：常綠灌木。花期：冬季。

產地：大埔、涌背、上禾輦。生於海濱。

分佈：海南、廣東、廣西、福建、臺灣。日本。

用途：藥用。

302. 列當科 Orobanchaceae

野菰屬 *Aeginetia* L.

野菰 Indian *Aeginetia*

Aeginetia indica L.

習性：寄生草本。花期：4-8 月；果期：8-10 月。

產地：香港島、大帽山、大埔。生於草地上。

分佈：海南、廣東、廣西、江西、湖南、福建、臺灣、浙江、安徽、江蘇、四川、雲南、貴州。

用途：藥用。

303. 苦苣苔科 Gesneriaceae

戲法草屬 *Achimenes* Pers.

戲法草 Big-flowered *Achimenes*

***Achimenes grandiflora** DC.

習性：草本。

產地：公園栽培。

分佈：原產墨西哥。

用途：觀賞。

芒毛苣苔屬 *Aeschynanthus* Jack

芒毛苣苔 Acuminate Basket Vine

Aeschynanthus acuminatus Wall. ex A. DC.
(*Aeschynanthus chinensis* Garden. & Champ.)

習性：小灌木。花期：10-12 月。

產地：香港島、城門、大帽山、梧桐寨、八仙嶺、大嶼山。附生於溪邊石上或樹上。

分佈：廣東、海南、廣西、臺灣、雲南、四川、西藏。印度、錫金、不丹、泰國、老撾及越南。

用途：藥用。

旋蒴苣苔屬 *Boea* Comm. ex Lam.

旋蒴苣苔 *Hygrometrica* Boea

Boea hygrometrica (Bunge) R. Br.

習性：多年生草本。花期：7-8 月；果期：9 月。

產地：烏蛟騰。

分佈：廣東、海南、廣西、湖南、湖北、浙江、福建、四川、陝西、山西、山東、河北、遼寧。

短筒苣苔屬 *Boeica* Clarke

紫花短筒苣苔 (佳氏苣苔) *Guile's Boeica*

Boeica guileana B. I. Burt

習性：多年生草本。花期：7 月。

產地：馬鞍山、八仙嶺、南涌、鹿頸。生於林下蔭濕處。

分佈：廣東。

唇柱苣苔屬 *Chirita* Buch.-Ham. ex D. Don

唇柱苣苔 Chinese *Chirita*

Chirita sinensis Lindl. (*Chirita sinensis*
var. *angustifolia* Dunn)

習性：多年生草本。

產地：香港島、城門、大帽山、馬鞍山、梧桐寨、大嶼山。生於林下蔭濕處。

分佈：廣東。

雙片苣苔屬 *Didymostigma* W. T. Wang

雙片苣苔 Obtuse *Didymostigma*

Didymostigma obtusum (Clarke) W. T. Wang

[*Didymocarpus obtusus* (C. B. Clarke)

S. Y. Hu; *Chirita obtusa* C. B. Clarke]

習性：一年生草本。花期：6—10月。

產地：大帽山、甲龍林道、梧桐寨、大埔滘、河背林道。

分佈：廣東、福建。

馬鈴苣苔屬 *Oreocharis* Benth.

大葉石上蓮 (石蓮) Bentham *Oreocharis*

Oreocharis benthamii Clarke

習性：多年生草本。花期：8月；果期：10月。

產地：香港島、西貢、大帽山、大嶼山。附在岩石上。

分佈：廣東、廣西、湖南及江西。

用途：藥用。

線柱苣苔屬 *Rhynchothecum*

Blume

冠萼線柱苣苔 Taiwan *Rhynchothecum*

Rhynchothecum formosanum Hatusima

[*Rhynchothecum ellipticum* auct. non

(Wall. ex D. F. N. Dietr.) A. DC.:

Check List HK Pl. 1993.]

習性：亞灌木。花期：7月。

產地：大帽山、鳳園、大埔滘、鳳凰山、大東山。生於林中或溝邊陰濕處。

分佈：海南、廣東、廣西、臺灣、雲南。

非洲堇屬 *Saintpaulia* H. Wendl.

非洲紫羅蘭 African Violet

****Saintpaulia ionantha*** H. Wendl.

習性：草本。

產地：公園、庭園及家居室內栽培觀賞。

分佈：原產非洲，現各地引種作觀賞。

用途：觀賞。

大岩桐屬 *Sinningia* Nees

大岩桐 *Gloxinia*

****Sinningia speciosa*** Benth. & Hook.

習性：草本。

產地：公園、花園、庭園及家居室內栽培觀賞。

分佈：原產巴西。現廣植於熱帶及亞熱帶地

區。

用途：觀賞。

304. 爵床科 *Acanthaceae*

老鼠勒屬 *Acanthus* L.

老鼠勒 Spiny Bears Breech

Acanthus ilicifolius L.

習性：灌木。花期夏秋。

產地：石澳、沙田、西貢、南生圍、米埔、大欖涌、大嶼山等地。生於海濱紅樹林中。

分佈：福建、海南、廣東、廣西。亞洲東南部及澳大利亞。

用途：藥用。

穿心蓮屬 *Andrographis* Wall. ex Nees

穿心蓮 (鬚藥草) Kariyat

Andrographis paniculata (Burm. f.) Nees

習性：一年生草本。花期夏秋。

產地：紅梅谷、青山、萬屋邊、東涌。

分佈：長江以南各省區均有分佈。亞洲東南部。

用途：藥用。

假杜鵑屬 *Barleria* L.

假杜鵑 (鴨仔花) Philippine Violet

****Barleria cristata*** L.

習性：亞灌木。花期11—12月。

產地：栽培。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、福建、臺灣等省區。亞洲東南部。

用途：觀賞、藥用。

有刺鴨咀花 Hop-headed barleria

****Barleria lupulina*** Lindl.

習性：灌木。

產地：栽培。

分佈：熱帶地區。

用途：觀賞。

蝦衣草屬 *Calliaspidia* Brem.

蝦衣草 (麒麟吐珠、鴨咀花) Shrimp Plant

****Calliaspidia guttata*** (T. S. Brandegee)

Bremek. [*Drejerella guttata* (T. S.

Brandege) Bremek.]

習性：灌木。

產地：栽培。

分佈：華南各地常見栽培。原產熱帶美洲。

鐘花草屬 *Codonacanthus* Nees

鍾花草（鐘刺草）

Codonacanthus pauciflorus (Nees) Nees

習性：草本。

產地：香港島、飛鵝山、大帽山、大嶼山。
生於林下或山谷濕地。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、福建、臺灣。亞洲東南部。

狗肝菜屬 *Dicliptera* Juss.

狗肝菜

Dicliptera chinensis (L.) Nees

習性：草本。花期冬季。

產地：深水灣、沙田、大埔。生於路旁、溪邊或疏林下。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、福建、臺灣。越南。

用途：藥用。

可愛花屬 *Eranthemum* L.

安氏可愛花 *Anderson's Eranthemum*

**Eranthemum andersonii* Mast.

習性：灌木。

產地：栽培。

分佈：原產馬來西亞。

用途：觀賞。

可愛花（藍花仔） *Blue Eranthemum*

**Eranthemum nervosum* R. Br.

習性：灌木。花期春季。

產地：栽培。

分佈：華南及西南。亞洲東南部。

用途：觀賞。

網紋草屬 *Fittonia* Coem.

白脈網紋草（白脈費道花） *Snail Plant*

**Fittonia verschaffeltii* var. *argyroneura*
Nichols.

習性：草本。

產地：栽培。

分佈：原產秘魯，現世界熱帶地區廣為栽培。

用途：觀賞。

紅脈網紋草（紅脈費道花） *Snail Plant*

**Fittonia verschaffeltii* var. *pearcei* Nichols.

習性：草本。

產地：香港有栽培。

分佈：原產秘魯，現世界熱帶地區廣為栽培。

用途：觀賞。

水蓑衣屬 *Hygrophila* R. Br.

線葉水蓑衣

Hygrophila lancea (Thunb.) Miq.

習性：草本。

產地：筆架山。

分佈：日本。

毛水蓑衣

†*Hygrophila phlomoides* Nees

習性：草本。花期 10 月。

產地：川龍、大埔、鳳園、粉嶺、西貢、咸田灣。

分佈：海南。

†*Hygrophila quadrivalvis* Nees

習性：草本。

產地：掃桿埔、沙角尾、石壁。

分佈：馬來西亞。

水蓑衣

Hygrophila salicifolia (Vahl) Nees

習性：一年生或二年生草本。花期秋季。

產地：香港島、新界。生於溪邊、路旁陰濕地。

分佈：長江以南各省區。亞洲東南部。

用途：藥用。

槍刀藥屬 *Hypoestes* Sol. ex R. Br.

槍刀藥（紅絲線）

Hypoestes purpurea (L.) R. Br.

習性：草本。花期 10—11 月。

產地：薄扶林、大潭、城門、大嶼山。生於灌叢中。

分佈：海南、廣東、臺灣。亞洲東南部。
用途：藥用。

斑葉槍刀藥 Freckleface

†**Hypoestes sanguinolenta* Hook.

習性：草本。

產地：栽培。

分佈：原產馬達加斯加，世界熱帶地區廣為栽培。

用途：觀賞。

爵床屬 *Justicia* L.

鴨嘴花 Malabar Nut

**Justicia adhodata* L. [*Adhodata vasica* (L.) Nees]

習性：灌木。

產地：栽培。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、福建、臺灣、江蘇等省區有栽培。原產印度，現廣植於世界各熱帶地區。

用途：觀賞、藥用。

珊瑚花 Flamingo Plant

**Justicia carnea* Lindl. [*Jacobinia carnea* (Lindl.) Nichols.]

習性：灌木。

產地：栽培。

分佈：原產巴西，現世界熱帶地區廣泛栽培。

用途：觀賞。

杜根藤 (杉氏爵床)

Justicia championii T. Anders. ex Benth.

習性：匍匐草本。

產地：歌賦山、香港仔、薄扶林、扯旗山。

分佈：香港特有。

小駝骨 (駝骨丹、小還魂) White *Justicia*

Justicia gendarussa Burm. f.

習性：灌木。花期春季。

產地：荃灣、城門、大埔、橋咀等。

分佈：華南、西南。亞洲東南部。

用途：藥用。

Justicia glauca Roth.

習性：草本。

產地：梧桐寨、青山等地。

分佈：熱帶亞洲。

爵床 (鼠尾紅) Purple *Justicia*

Justicia procumbens L.

習性：一年生草本。

產地：香港各地常見。生於曠野、路旁。

分佈：華南、西南。亞洲東南部至澳大利亞。

用途：藥用。

黑葉小駝骨 (黑葉爵床)

Justicia ventricosa Wall.

習性：灌木。花期冬季。

產地：西貢、竹角。生於疏林下或灌叢中。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南。亞洲東南部。

用途：藥用。

鱗花草屬 *Lepidagathis* Willd.

鱗花草

Lepidagathis incurva D. Don

習性：草本。花期早春。

產地：香港各地。生於林下。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南。亞洲東南部。

用途：藥用。

紅樓花屬 *Odontonema* Nees

紅樓花

**Odontonema strictum* Kuntze

習性：半灌木。

產地：栽培。

分佈：原產中美洲。

用途：觀賞。

金苞花屬 *Pachystachys* Nees

金苞花 (黃鴨咀花) Lollypops

**Pachystachys lutea* Nees

習性：半灌木。

產地：香港有栽培。

分佈：原產秘魯。

用途：觀賞。

鈎粉草屬 *Pseuderanthemum* Radlk.

斑葉美擬花

Pseuderanthemum atropurpureum cv.

Variegatum

習性：灌木。

產地：栽培。

分佈：原產波利尼西亞。

用途：觀賞。

扭序花屬 *Rhinacanthus* Nees

扭序花（仙鶴草）

**Rhinacanthus communis* Nees

習性：灌木狀草本。

產地：栽培。

分佈：原產熱帶亞洲。

用途：藥用。

蘆莉草屬 *Ruellia* L.

蘭花草

†**Ruellia brittoniana* Leonard

習性：草本。

產地：公園有栽培，有時逸為野生。

分佈：華南各省區。原產墨西哥。

用途：觀賞。

孩兒草屬 *Rungia* Nees

中華孩兒草（孩兒草）

Rungia chinensis Benth.

習性：草本。

產地：柏架山。生於草地上。

分佈：廣東、江西、安徽、江西、福建、浙江。

黃脈爵床屬 *Sanchezia* Ruiz. & Pav.

黃脈爵床

**Sanchezia nobilis* Hook.

習性：亞灌木。

產地：香港有栽培。

分佈：華南有栽培。原產厄瓜多爾，世界熱帶地區廣為栽培。

用途：觀賞。

叉柱花屬 *Staurogyne* Wall.

糙葉叉柱花

†*Staurogyne concinnula* (Hance) Kuntze

習性：一年生或二年生草本。花期：3-4月。

產地：鶴藪。

分佈：海南、廣東、福建、臺灣。

馬藍屬 *Strobilanthes* Blume

山一籠雞

Strobilanthes apricus (Hance) T. Andr.

(*Gutzlaffia aprica* Hance)

習性：亞灌木。

產地：大潭、爛泥灣、黃泥涌、薄扶林等地。

分佈：廣東、廣西、四川、雲南、江西。

馬藍

Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze

習性：草本。花期11月。

產地：柏架山、西貢、城門、火炭、觀音山村、梧桐寨、蛤塘等地。生於林下、山谷和溪邊濕地。

分佈：華南、西南、華東各省區。亞洲東南部。

用途：藥用、染料。

疏花馬藍（金雞蠟）

Strobilanthes divaricatus (Nees) T. Anders.

[*Sanchezia divaricatus* (Nees) T. Anders.]

習性：草本。

產地：城門、大帽山、梧桐寨。

分佈：福建、廣東、廣西、雲南。亞洲東南部。

腺毛馬藍（球花馬藍）

Strobilanthes penstmonoides (Nees) T.

Anders. (*Goldfussia penstmonoides* Nees)

習性：草本。

產地：大腦、蠔涌。生於山谷濕地、林下。

分佈：廣東、廣西、貴州、雲南、四川、湖北、福建等省區。亞洲東南部。

四子馬藍

Strobilanthes tetraspermus (Champ. ex

Benth.) Druce [*Sanchezia tetrasperma* (Champ. ex Benth.) Druce]

習性：匍匐草本。花期秋季。

產地：香港島、梧桐寨、鳳凰山。
分佈：海南、廣東、廣西、四川、湖北、湖南、江西、福建。越南。

老鴉嘴屬 *Thunbergia* Retz..

翼葉老鴉嘴 Black-eyed Susan

**Thunbergia alata* Bojer ex Sims

習性：草質藤本。

產地：栽培或逸為野生。

分佈：華南、西南有栽培。原產熱帶非洲。

用途：觀賞。

硬枝老鴉嘴 Bush *Thunbergia*

**Thunbergia erecta* (Benth.) T. Anders.

習性：灌木。

產地：公園栽培。

分佈：海南、廣東有栽培。原產熱帶非洲。

用途：觀賞。

碗花草 (老鴉嘴) *White Thunbergia*

**Thunbergia fragrans* Roxb.

習性：木質藤本。

產地：栽培。

分佈：原產印度、斯里蘭卡，現世界熱帶廣為栽培。

用途：觀賞。

大花老鴉嘴 Large-flowered *Thunbergia*

Thunbergia grandiflora Roxb.

習性：草質藤本。花期秋季。

產地：香港各地。

分佈：華南、西南。亞洲東南部。

用途：觀賞。

桂葉老鴉嘴

**Thunbergia laurifolia* Lindl.

習性：木質藤本。

產地：栽培。

分佈：廣東、福建有栽培。原產印度。

用途：觀賞。

黃花老鴉嘴 (新擬)

†**Thunbergia mysorensis* T. Anders.

習性：藤本。

產地：栽培。

分佈：原產印度南部，世界熱帶地區廣泛栽培。

用途：觀賞。

305. 胡麻科 *Pedaliaceae*

胡麻屬 *Sesamum* L.

芝麻 (胡麻) *Sesame*

**Sesamum indicum* L. (*Sesamum orientale* L.)

習性：草本。花期：7-10月。

產地：沙田、城門、大埔、屯門有栽培。

分佈：中國各地栽培。原產印度或非洲；世界各地廣泛栽培。

用途：油料、藥用、食用。

306. 紫葳科 *Bignoniaceae*

凌霄屬 *Campsis* Lour.

凌霄 Chinese Trumpet-creeper

**Campsis grandiflora* (Thunb.) Schum.

習性：藤本。花期：5-8月。

產地：栽培。

分佈：長江以南各省區，以及河南、山東、河北、陝西；栽培或野生。日本。

用途：藥用或觀賞。

梓屬 *Catalpa* Scop.

黃金樹 (西美梓) *Western Catalpa*

**Catalpa speciosa* (Warder ex Barney) Engelm.

習性：喬木。花期：5-6月；果期：8-9月。

產地：栽培。

分佈：全國各地有栽培。原產美國。

用途：園林綠化樹種。

連理藤屬 *Clytostoma* Miers.

連理藤 Trumpetvine

**Clytostoma callistegioides* (Cham.) Baill.

習性：藤本。花期：夏季。

產地：栽培。

分佈：我國南方有引種。原產熱帶美洲。

用途：觀賞。

葫蘆樹屬 *Crescentia* L.

十字架樹 *Jicaro*

***Crescentia alata** H. B. & K.

習性：小喬木。花期：夏、秋季。

產地：栽培。

分佈：華南、西南等地有栽培。熱帶亞洲廣泛栽培。原產墨西哥至哥斯達黎加。

用途：觀賞及藥用。

貓尾木屬 Dolichandrone (Fenzl)
Seem.

貓尾木 Cat-tail Tree

***Dolichandrone cauda-felina** (Hance) Benth.
& Hook. f. (*Markhamia stipulata* var.
rerrii Sprague)

習性：喬木。花期：10-11 月；果期：4-6 月。

產地：栽培。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南。栽培或野生。泰國、老撾、越南。

用途：園林綠化樹種。

藍花楹屬 Jacaranda Juss.

藍花楹 Jacaranda

***Jacaranda mimosifolia** D. Don.

習性：喬木。

產地：栽培。

分佈：海南、廣東、廣西、福建、雲南有栽培。原產巴西。

用途：觀賞。

貓爪藤屬 Macfadyena A. DC.

貓爪藤 Cat-claw Vine

***Macfadyena unguis-cati** (L.) A. H. Gentry
[*Doxantha unguis-cati* (L.) Miers]

習性：藤本。花期：7-11 月；果期：翌年 5 月。

產地：栽培。

分佈：原產熱帶美洲。

木蝴蝶屬 Oroxylum Vent.

木蝴蝶（千層紙） Tree of Damocles

Oroxylum indicum Vent.

習性：喬木。

產地：西貢、大環、大埔滘、林村。栽培或野生於村邊林中。

分佈：海南、廣東、廣西、福建、臺灣、雲南、貴州。

用途：藥用、園林綠化。

非洲凌霄屬 Pandorea Sprague

非洲凌霄 Port St. Johns Creeper

***Pandorea ricasoliana** (Tanfani) Baill. ex K.
Schum.

習性：藤本。花期：8-9 月。

產地：栽培。

分佈：華南有引種。原產非洲。

用途：觀賞。

炮仗藤屬 Pyrostegia Presl.

炮仗花 Fire-cracker Vine

***Pyrostegia venusta** (Ker-Gawl.) Miers
[*Pyrostegia ignea* (Vell.) Presl]

習性：藤本。花期：1-6 月。

產地：栽培。

分佈：華南及西南各地有引種。原產巴西。

用途：觀賞。

菜豆樹屬 Radermachera Zoll. &
Mor.

菜豆樹 Asia Belltree

***Radermachera sinica** (Hance) Hemsl.

習性：喬木。花期：5-9 月；果期：10-12 月。

產地：栽培。

分佈：廣東、廣西、臺灣、雲南、貴州。不丹。

用途：藥用及綠化。

火焰樹屬 Spathodea Beauv.

火焰樹 African Tulip Tree

***Spathodea campanulata** Beauv.

習性：喬木。花期：4-5 月。

產地：栽培。

分佈：華南各地有引種。原產非洲。

用途：園林綠化樹種。

黃鐘木屬 Tabebuia Gomes ex DC.

黃鐘木（風鈴木） Yellow Pui

***Tabebuia chrysantha** (Jacq.) Nichols.
[*Tabebuia chrysotricha* (Mart ex DC.)
Standl.]

習性：小喬木。花期：春季。

產地：栽培。
分佈：華南各地有引種。原產熱帶美洲。
用途：觀賞。

異葉黃鐘木 Heterophyllous Yellow Pui

**Tabebuia heterophylla* (DC.) Britton

習性：喬木。花期：春、夏季。

產地：栽培。

分佈：原產美洲。

用途：觀賞。

黃鐘花屬 *Tecoma* A. L. Juss.

硬骨凌霄 Cape-Honeysuckle

**Tecoma capensis* (Thunb.) Lindl.

[*Tecomaria capensis* (Thunb.) Spach]

習性：灌木。花期：9-11月。

產地：公園及行道旁有栽種。

分佈：華南各地有栽培。原產非洲南部。

用途：觀賞。

黃鐘花 Trumpet-flower

**Tecoma stans* (L.) A. L. Juss. ex Kunth

習性：灌木。花期：秋季。

產地：栽培。

分佈：華南各地有引種。原產美洲。

用途：觀賞。

308. 狸藻科

Lentibulariaceae

狸藻屬 *Utricularia* L.

黃花狸藻 Floating Bladderwort

Utricularia aurea Lour.

習性：水生小草本。花期：6-11月；果期：7-12月。

產地：香港島、新田、河背、西貢、大嶼山。生於水稻田、池塘邊淺水中。

分佈：華南、華東、日本、印度、中南半島、馬來西亞、澳大利亞。

挖耳草 Small Yellow Bladderwort

Utricularia bifida L.

習性：陸生小草本。花期：6-12月；果期：7月至翌年1月。

產地：香港島、大帽山、大網仔、西貢、羅

湖、大嶼山。生於沼澤濕地。

分佈：華南、華中、華東。日本、印度、中南半島、馬來西亞、澳大利亞。

短梗挖耳草 Blue Bladderwort

Utricularia caerulea L.

習性：陸生小草本。花期：6月至翌年春；果期：7月至翌年春。

產地：香港島、馬鞍山、河背、屏風山、大嶼山。生於沼澤濕地。

分佈：西南、華南、華東。朝鮮、日本、印度、中南半島、馬來西亞、澳大利亞。

少花狸藻

Utricularia exoleta R. Br.

習性：陸生小草本。花期：6-11月；果期：7-12月。

產地：跑馬地曾有記錄。

分佈：華南、華東、華中、西南各省區。日本、東南亞至大洋洲和熱帶非洲均有分佈。

圓葉挖耳草

Utricularia striatula Sm.

習性：陸生小草本。花期：6-10月；果期：7-11月。

產地：跑馬地、大潭、扯旗山、大嶼山。生於沼澤濕地。

分佈：華南、西南、華東。印度、中南半島、馬來西亞、熱帶非洲。

濕地挖耳草

†*Utricularia uliginosa* Vahl

習性：陸生小草本。花期：7-10月；果期：8-11月。

產地：鶴咀、新娘潭、屏風山、大嶼山、東涌。生於沼澤濕地。

分佈：海南、廣東、臺灣。日本、印度、中南半島、馬來西亞、澳大利亞。

311. 桔梗科

Campanulaceae

黨參屬 *Codonopsis* Wall.

金錢豹(土黨參) *Java Campanumoea*

†**Codonopsis javanica** (Blume) Hook. f.
(*Codonopsis pilosula* auct. non Franch.:
Check List HK Pl. 1993.)

習性：纏繞草質藤木。花期：5-11 月。
產地：大帽山、甲龍、青山。山坡灌叢濕潤處。
分佈：廣東、廣西、貴州、雲南、四川、湖南、湖北、江西、福建、浙江、安徽、臺灣。錫金、不丹至亞洲東南部。
用途：藥用。

羊乳 Lance Asiabell

†**Codonopsis lanceolata** (Sieb. & Zucc.)
Trautv.

習性：纏繞藤本。花期：8-9 月。
產地：馬鞍山。
分佈：華南、華北至東北。亞洲東部。
用途：藥用。

同瓣草屬 **Laurentia** Mich. ex
Adans.

同瓣草 Longflower **Laurentia**

***Laurentia longiflora** (L.) Endl.

習性：多年生草本。花期：5-9 月。
產地：大坑、薄扶林、扯旗山、深水灣。生於荒地或栽培。
分佈：原產美洲。

半邊蓮屬 **Lobelia** L.

半邊蓮 Chinese **Lobelia**

Lobelia chinensis Lour.

習性：多年生草本。花果期：5-10 月。
產地：沙田、大帽山、粉嶺、梧桐寨、蕉坑、烏蛟騰、大嶼山。生於潮濕地上。
分佈：華南、華中至華東。亞洲東部至東南部。
用途：藥用。

疏毛半邊蓮

Lobelia zeylanica L.

習性：一年生草本。花、果期：幾全年。
產地：大帽山、梧桐寨。生於溪邊。
分佈：海南、廣東、廣西、雲南、福建、浙江、臺灣。東亞至東南亞。

桔梗屬 **Platycodon** A. DC.

桔梗 Balloon Flower

Platycodon grandiflorus (Jacq.) A. DC.

習性：多年生草本。花期：7-9 月。
產地：香港島、青山、浪茄。生於山坡陽處草叢中。
分佈：除西北外，幾乎遍佈全國。俄羅斯、朝鮮、日本。
用途：藥用。

銅錘玉帶屬 **Pratia** Gaudich.

銅錘玉帶草 Common **Pratia**

Pratia nummularia (Lam.) A. Br. & Aschers.

習性：多年生草本。幾乎全年有花果。
產地：大帽山、大埔、打鐵崗、林村谷、大東山。生於低地潮濕處。
分佈：華南、華東、西南及西藏。亞洲南部至新幾內亞。
用途：藥用。

尖瓣花屬 **Sphenoclea** Gaertn.

尖瓣花 Ceylon **Sphenoclea**

Sphenoclea zeylanica Gaertn.

習性：一年生草本。
產地：屯門、大嶼山。生於濕地上。
分佈：海南、廣東、廣西、雲南、臺灣。東半球熱帶；熱帶美洲有引種。

藍花參屬 **Wahlenbergia** Schrad.
ex Roth

藍花參（娃兒草） **Marginate Rockbell**

Wahlenbergia marginata (Thunb.) A. DC.

習性：多年生草本。花期：2-5 月。
產地：粉嶺、大嶼山。生於曠野草地上或溪邊淺草叢中。
分佈：華南、西南、華中至華東。亞洲熱帶及亞熱帶廣佈。

312. 花柱草科 **Stylidiaceae**

花柱草屬 **Stylidium** Sw. ex Willd.

狹葉花柱草（小滴絲草科） **Small Stylidium**

Stylidium tenellum Swartz

習性：草本。花期：6—10 月。
產地：香港有分佈，地點不詳。

分佈：福建、廣東、雲南。亞洲東南部。

花柱草（滴絲草）*Stylidium*

Stylidium uliginosum Swartz

習性：草本。花期：冬季。

產地：大帽山。生於溪邊濕地上。

分佈：海南、廣東。印度、斯里蘭卡、澳大利亞北部。

315. 草海桐科 Goodeniaceae

離根香屬 *Calogyne* Brown

火花離根香

†*Calogyne pilosa* subsp. *chinensis* (Benth.) H. S. Kiu

習性：矮小草本。花期：夏末秋初。

產地：粉嶺。

分佈：海南、廣東。

用途：藥用。

草海桐屬 *Scaevola* L.

海南草海桐 Hainan Naupaka

Scaevola hainanensis Hance

習性：矮小灌木。花期：夏末秋初。

產地：鶴咀、樟樹灘、橋咀洲、窩西洲。生於海灘沙地。

分佈：海南、廣東、廣西、臺灣。越南。

草海桐 Beach Naupaka

Scaevola sericea Vahl

習性：灌木。花期：秋季。

產地：香港各地。生於海邊沙地。

分佈：海南、廣東、廣西、福建、臺灣。澳大利亞、菲律賓、馬來西亞、印度尼西亞、日本。

316. 茜草科 Rubiaceae

水團花屬 *Adina* Salisb.

水團花 Pilular *Adina*

Adina pilulifera (Lam.) Franch. ex Drake

習性：灌木或喬木。花期：6-9 月；果期：7-12 月。

產地：香港各地。生於山谷、水邊。

分佈：海南、廣東、廣西、湖南、江西、福建、浙江、江蘇、陝西。日本、越南。

用途：藥用。

茜樹屬 *Aidia* Lour.

香楠（山黃皮） Mountain Wanpi

Aidia canthioides (Champ. ex Benth.) Masamune (*Randia canthioides* Champ. ex Benth.)

習性：灌木或喬木。花期：4-9 月；果期：5-12 月。

產地：香港島、大埔、馬鞍山、花山、烏蛟騰、南丫島、大嶼山。生於林中。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、福建、臺灣。日本（琉球群島）、越南。

茜樹（越南香楠、亨氏香楠） Cochinchina *Randia*

Aidia cochinchinensis Lour. [*Randia cochinchinensis* (Lour.) Merr.; *Randia henryi* Pritz.]

習性：灌木或喬木。花期：3-6 月；果期：5 月至翌年 2 月。

產地：跑馬地、馬鞍山、烏蛟騰、沙頭角、大嶼山。生於灌叢或林中。

分佈：華南、華東及中南各省區。亞洲南部和東南部至大洋洲。

多毛茜草樹 Hairy *Randia*

†*Aidia pycnantha* (Drake) Tirvenz.

習性：灌木或喬木。花期：2-11 月；果期：4-12 月。

產地：香港各地。生於灌叢或林中。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、福建。越南。

白香楠屬 *Alleizettella* Pitard.

白果香楠（白果山黃皮） White-fruited *Randia*

Alleizettella leucocarpa (Champ. ex Benth.) Tirvenz. (*Randia leucocarpa* Champ. ex Benth.)

習性：灌木。花期：4-6 月；果期：4 月至翌年 2 月。

產地：香港島、馬鞍山、大帽山、城門、南丫島、大嶼山。生於灌叢或林中。

分佈：海南、廣東、廣西、福建。越南。

毛茶屬 *Antirhea* Comm. ex Juss.

毛茶 Chinese *Antirhea*

Antirhea chinensis (Champ. ex Benth.)
Forbes & Hemsley

習性：灌木或喬木。花期：5-6 月；果期：
10-11 月。

產地：香港各地。生於灌叢或林中。

分佈：海南、廣東南部。

豐花草屬 *Borreria* G. Mey.

糙葉豐花草 (多節波利亞草) Scabrousleaf
Borreria

Borreria articularis (L. f.) F. N. Williams

習性：草本。花果期：4-10 月。

產地：香港各地。生於曠地或草地。

分佈：海南、廣東、臺灣。印度、斯里蘭卡、
尼泊爾、馬來西亞、菲律賓。

闊葉豐花草 Wideleaf *Borreria*

†*Borreria latifolia* (Aubl.) K. Schum.

習性：草本。花果期：5-10 月。

產地：蝴蝶穀、城門、大帽山、大埔。生於
曠地或草地。

分佈：海南、廣東、廣西。原產南美洲。

用途：飼料。

二萼豐花草 Repent *Borreria*

Borreria repens DC.

習性：草本。花果期：4-9 月。

產地：城門、大埔滘、沙螺洞。生於曠地或
草地。

分佈：海南。印度尼西亞、毛里求斯。

豐花草 *Stricta* *Borreria*

Borreria stricta (L. f.) G. Mey.

習性：草本。花果期：4-10 月。

產地：赤柱、荃灣、蒲台島、大鵬灣平洲。
生於曠地或草地。

分佈：海南、廣東、廣西、貴州、雲南、四
川、臺灣。亞洲和非洲的熱帶地區。

用途：藥用

魚骨木屬 *Canthium* Lam.

魚骨木 (鐵矢米) *Butulang* *Canthium*

Canthium dicoccum (Gaertn.) Teysmann &
Binnedijk

習性：灌木或喬木。花果期：5-12 月。

產地：香港各地。生於林中。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南。印度、斯
里蘭卡、尼泊爾、老撾、越南、柬埔
寨、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓、
澳大利亞。

用途：材用。

豬肚木 (小葉鐵矢米) *Bristly* *Canthium*

Canthium horridum Blume (*Canthium*
parvifolium auct. non Roxb.: Check
List HK Pl. 1993.)

習性：灌木。花期：4-6 月；果期：7-11 月。

產地：大帽山。生於灌叢。

分佈：雲南、廣西、海南、廣東。印度至亞
洲東南部。

用途：材用、食用、藥用。

山石榴屬 *Catunaregam* Wolf

山石榴 (山蒲桃) *Spiny* *Randia*

Catunaregam spinosa (Thunb.) Tirvenz.
[*Randia spinosa* (Thunb.) Blume]

習性：灌木或喬木。花期：3-6 月；果期：5
至翌年 1 月。

產地：灣仔峽、大埔、荔枝窩、沙頭角、大
嶼山。生於林中或灌叢，或栽培。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、臺灣。非
洲南部及亞洲熱帶地區。

用途：材用、藥用、綠籬。

風箱樹屬 *Cephalanthus* L.

風箱樹 *Buttonbush*

Cephalanthus tetrandrus (Roxb.) Ridsd. &
Bank f. (*Cephalanthus occidentalis*
auct. non L.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：灌木或喬木。花期：春末夏初。

產地：新圍。生於水旁或灌叢。

分佈：中國西南部至東南部。印度至亞洲東
南部。

用途：藥用、材用。

咖啡屬 *Coffea* L.

小粒咖啡 *Arabian* *Coffee*

†**Coffea arabica* L.

習性：灌木或喬木。花期：3-4 月；果期：10 月。

產地：栽培。

分佈：雲南、四川、貴州、廣西、海南、廣東、福建、臺灣有栽培。世界熱帶地區栽培。原產熱帶非洲。

用途：飲料。

流蘇子屬 *Coptosapelta* Korth.

流蘇子 *Diffusa* *Coptosapelta*

Coptosapelta diffusa (Champ. ex Benth.) Van Steenis [*Thysanospermum diffusum* Champ. ex Benth.]

習性：藤本或攀援灌木。花期：5-7 月；果期：5-12 月。

產地：奇力山、馬鞍山、大澳、大東山。生於灌叢或林中。

分佈：華南、華東和湖北等省區。日本（琉球群島）。

用途：藥用。

狗骨柴屬 *Diplospora* DC.

狗骨柴（三萼木） *Common* *Tricalysia*

Diplospora dubia (Lindl.) Masamune [*Tricalysia dubia* (Lindl.) Ohwi]

習性：灌木或喬木。花期：3-12 月；果期：5 月至翌年 2 月。

產地：香港各地。生於灌叢或林中。

分佈：華南、華東和臺灣。日本、越南。

用途：材用、藥用。

拉拉藤屬 *Galium* L.

拉拉藤 *Spinyfruit* *Catchweed* *Bedstraw*

Galium aparine var. *echinospermum* (Wallr.) Cuf.

習性：草本。花果期：春至秋季。

產地：粉嶺。生於草地。

分佈：除海南及南海諸島外，全國各地均有。世界廣佈雜草。

用途：藥用。

梔子屬 *Gardenia* Ellis

梔子（蟬水橫枝） *Cape* *Jasmine*

Gardenia jasminoides Ellis

習性：灌木。花期：3-8 月；果期：5-12 月。

產地：香港各地。生於曠野、山坡、灌叢或林中；野生或栽培。

分佈：長江以南和山東、河北、陝西、甘肅等省區；野生或栽培。日本、朝鮮、印度、尼泊爾、巴基斯坦、老撾、越南、柬埔寨、太平洋島嶼、美洲北部。

用途：觀賞、藥用、染料、香料。

白蟾 *Fortune* *Cape* *Jasmine*

†**Gardenia jasminoides* var. *fortuniana* (Lindl.) Hara

習性：灌木。花期：春夏。

產地：公園及庭園栽培。

分佈：中國中部以南各省區栽培；原產中國和日本。

用途：觀賞。

狹葉梔子 *Narrowleaf* *Gardenia*

†**Gardenia stenophylla* Merr.

習性：灌木。花期：4-8 月；果期：5 月至翌年 1 月。

產地：庭園栽培。

分佈：海南、廣東、廣西、浙江、安徽。越南。

用途：觀賞、藥用。

南非梔子 *Africa* *Gardenia*

**Gardenia thunbergia* L. f.

習性：灌木。花期：6-7 月。

產地：公園栽培。

分佈：原產非洲南部。

用途：觀賞。

愛地草屬 *Geophila* D. Don

愛地草 *Herbaceous* *Geophila*

Geophila herbacea (Jacq.) K. Schum.

[*Geophila repens* auct. non (L.) Johnst.:Check List HK Pl. 1993.]

習性：匍匐草本。花期：6-8 月；果期：9-11 月。

產地：大老山、大菴。生於林下。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、臺灣。全世界熱帶和亞熱帶地區。

用途：藥用。

長隔木屬 *Hamelia* Jacq.

長隔木 (希美利) Scarlet Bush

**Hamelia patens* Jacq.

習性：灌木。花期：5-8 月。

產地：公園栽培。

分佈：海南、廣東、雲南、福建有栽培。原產美洲的熱帶和亞熱帶地區。

用途：觀賞。

耳草屬 *Hedyotis* L.

金草 (方骨草) *Acutangula Hedyotis*

Hedyotis acutangula Champ. ex Benth.

習性：草本。花期：4-9 月。

產地：香港各地。生於山坡、灌叢或林中。

分佈：海南、廣東。越南。

用途：藥用。

廣花耳草 Ampleflower *Hedyotis*

†*Hedyotis ampliflora* Hance

習性：草本。花期：夏秋。

產地：大埔。生於灌叢。

分佈：海南。

用途：藥用。

耳草 Auricled *Hedyotis*

Hedyotis auricularia L.

習性：草本。花期：春夏。

產地：葵涌、城門。生於草地或灌叢。

分佈：中國南部和西南部。印度、斯里蘭卡、尼泊爾、緬甸、越南、馬來西亞、菲律賓、澳大利亞。

用途：藥用。

雙花耳草 Twoflower *Hedyotis*

Hedyotis biflora (L.) Lam.

習性：草本。花期：4-10 月。

產地：薄扶林、黃泥涌峽、黃竹坑、大坳門、城門。生於曠野或草地。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、江蘇、臺灣。日本、印度、尼泊爾、越南、馬來西亞、印度尼西亞、波利尼西亞。

大苞耳草 Largebract *Hedyotis*

Hedyotis bracteosa Hance

習性：草本。花果期：4-12 月。

產地：烏蛟騰、新娘潭、照鏡潭、八仙嶺。生於林中。

分佈：廣東。

大眾耳草 Common *Hedyotis*

†*Hedyotis communis* Ko

習性：草本或灌木。花果期：春夏。

產地：香港仔、茅坪。生於林中。

分佈：海南、湖南。

擬金草 (紅花耳草) Consanguineous *Hedyotis*

Hedyotis consanguinea Hance

習性：草本。花期：2-9 月。

產地：大嶼山。生於林下、草地。

分佈：廣東、廣西、江西、福建。

用途：藥用。

傘房花耳草 Corymbose *Hedyotis*

Hedyotis corymbosa (L.) Lam.

習性：草本。花果期：4-11 月。

產地：香港各地。生於曠地、草地。

分佈：中國西南至東南部。亞洲熱帶地區、非洲和美洲。

用途：藥用。

脈耳草

†*Hedyotis costata* (Roxb.) Kurz

習性：草本。花果期：7—11 月。

產地：東涌、大蠔、貝澳。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南。熱帶亞洲。

白花蛇舌草 Diffuse *Hedyotis*

Hedyotis diffusa Willd.

習性：草本。花期：3-9 月。

產地：柏架山、歌賦山、西貢、大環、大埔、鳳園、粉嶺。生於田邊、曠地。

分佈：中國西南至東南部。亞洲的熱帶和亞熱帶地區。

用途：藥用。

鼎湖耳草 Effusive *Hedyotis*

†*Hedyotis effusa* Hance

習性：草本。花期：春夏；果期：秋冬。
產地：東涌、大澳。生於林下。
分佈：廣西、廣東。
用途：藥用。

牛白藤

Hedyotis hedyotidea (DC.) Merr.

習性：藤本灌木。花果期：幾全年。
產地：香港各地。生於山坡、林中或灌叢。
分佈：廣東、廣西、雲南。越南。
用途：藥用。

粵港耳草

Hedyotis loganioides Benth.

習性：亞灌木。花果期：3-12月。
產地：香港島、清水灣、大帽山、烏蛟騰、南涌、八仙嶺、馬鞍山、大嶼山。生於林中。
分佈：廣東。

疏花耳草 Mathew's Hedyotis

Hedyotis mathewii Dunn (*Hedyotis assimiles* auct. non Tutch.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：草本。花期：5-11月。
產地：大東山。生於林下或灌叢。
分佈：廣西、廣東。

松葉耳草

Hedyotis piniflora Wall. ex G. Don

習性：草本。花期：5-12月。
產地：香港仔、飛鵝山、大嶼山、蒲台島。生於曠地或草地。
分佈：海南、廣東、廣西、雲南。印度、尼泊爾、泰國、老撾、越南、柬埔寨、馬來西亞。
用途：藥用。

纖花耳草 Tender-flowered Hedyotis

Hedyotis tenelliflora Blume

習性：草本。花期：4-11月。
產地：香港島、平山仔、梧桐寨、蒲台島。生於田野或草地。
分佈：中國西南部至東南部。印度、越南、

馬來西亞至柬埔寨。

用途：藥用。

長節耳草 Smallhooked Hedyotis

Hedyotis uncinella Hook. & Arn.

習性：草本。花期：5-10月。
產地：香港島、大坳門、城門、馬鞍山、茅坪。生於山邊、草地。
分佈：海南、廣東、廣西、貴州、雲南、湖南、福建、臺灣。印度、越南。
用途：藥用。

香港耳草 (華氏耳草)

Hedyotis vachellii Benth.

習性：草本。花期：3-12月。
產地：粉嶺、大嶼山。生於山谷。
分佈：中國南部。

粗葉耳草 (輪葉耳草)

Hedyotis verticillata (L.) Lam.

習性：草本。花期：3-11月。
產地：香港島、大埔、鳳園、打鼓嶺、大嶼山、坪洲。生於山谷、路邊。
分佈：海南、廣東、廣西、貴州雲南、浙江。日本(琉球群島)、印度、尼泊爾、泰國、老撾、越南、柬埔寨、馬來西亞、印度尼西亞、密克羅尼西亞。
用途：藥用。

陽春耳草

†**Hedyotis yangchunensis** Ko & Zhang

習性：草本。花期：4-11月。
產地：城門、大帽山、梧桐寨、大埔滘、屏風山、鹿湖。生於山谷、灌叢或林中。
分佈：廣東(陽春)。

龍船花屬 *Ixora* L.

龍船花(山丹) Chinese *Ixora*

Ixora chinensis Lam. [*Tsiangia hongkongensis* (Seem.) But, Hsue & P. T. Li; *Gaertnera hongkongensis* Seem.]

習性：灌木。花期：2-11月。
產地：道風山、文錦渡、下白泥。生於山坡、

灌叢；野生或栽培。
分佈：廣東、廣西、福建、臺灣。印度、馬來西亞、印度尼西亞。
用途：藥用、觀賞。

紅仙丹花 (橙紅龍船花) Dwarf *Ixora*

**Ixora coccinea* L.

習性：灌木。花期：7-9 月。
產地：栽培。
分佈：廣東、雲南有栽培。印度至馬來西亞。
用途：觀賞。

黃龍船花 (黃花龍船花) Yellow *Ixora*

**Ixora coccinea* f. *lutea* (Hutch.) F. R. Fosberg & H. H. Sacht

習性：灌木。花期：7-9 月。
產地：栽培。
分佈：廣州栽培。
用途：觀賞。

薄葉龍船花 Thinleaf *Ixora*

†**Ixora finlaysoniana* Wall. ex G. Don

習性：灌木。花期：4-10 月。
產地：栽培。
分佈：海南、廣東。亞洲東南部。
用途：觀賞。

波葉山丹 Wave-leaved *Ixora*

**Ixora undulata* Roxb. ex Roth

習性：灌木。花期：4-6 月；果期：7-8 月。
產地：栽培或逸為野生，偶見於路旁。
分佈：尼泊爾、錫金、不丹、印度。
用途：觀賞。

紅芽大戟屬 *Knoxia* L.

紅芽大戟 (諾斯氏草) Corymbose *Knoxia*

Knoxia corymbosa Willd.

習性：草本。花期：夏秋；果期：10-11 月。
產地：奇力山、爛泥灣、城門、大埔、蒲台島、大鵬灣坪洲。生於林下或草地、灌叢。
分佈：海南、廣東、廣西、雲南、臺灣。尼泊爾、錫金、印度、亞洲東南部至大洋洲。
用途：藥用。

粗葉木屬 *Lasianthus* Jack.

粗葉木 Chinese *Lasianthus*

Lasianthus chinensis (Champ.) Benth.

習性：灌木。花期：4-12 月；果期：5-12 月。

產地：香港島、大帽山、馬鞍山、西貢、大嶼山。生於林中或灌叢。

分佈：海南、廣東、廣西、福建、臺灣。越南、馬來西亞。

用途：藥用。

廣東粗葉木 Curtis *Lasianthus*

Lasianthus curtisii King & Gamble
(*Lasianthus henryi* auct. non Hutch.:
Check List HK Pl. 1993.)

習性：灌木或喬木。花期：春夏季。
產地：烏蛟騰、大埔滘、大埔。生於林中。
分佈：海南、廣東、廣西。

羅浮粗葉木 Ford *Lasianthus*

Lasianthus fordii Hance (*Lasianthus henryi*
auct. non Hutch.: Check List HK Pl.
1993.)

習性：灌木或喬木。花期：春夏。
產地：城門、燕岩、黃竹洋、烏蛟騰。生於溪邊、林中。
分佈：廣東、廣西。

臺灣粗葉木 Formosan *Lasianthus*

†*Lasianthus formosensis* Matsum.

習性：灌木。花果期：4-11 月。
產地：香港。生於林中。
分佈：廣西、廣東、臺灣。日本。

雞屎樹 (毛雞屎樹) Bluefruited *Lasianthus*

Lasianthus hirsutus (Roxb.) Merr.
(*Lasianthus cyanocarpus* auct. non
Jack: Check List HK Pl. 1993.)

習性：灌木。花果期：春至秋季。
產地：聶高信山、跑馬地、黃竹洋。生於林中或灌叢。
分佈：海南、廣東。越南、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓。

斜脈粗葉木

†*Lasianthus obliquinervis* Merr.

習性：灌木。花期：5-8月。

產地：大潭、烏蛟騰、雞公嶺。生於林中。

分佈：雲南、廣西、海南、廣東。

鐘萼粗葉木 *Bellcalyx Lasianthus*

Lasianthus trichophlebus Hemsl.

習性：灌木。花期：夏秋。

產地：歌賦山。生於林中。

分佈：海南、廣東、臺灣。

斜基粗葉木 (小葉雞屎樹) *Small-leaved Lasianthus*

Lasianthus wallichii (Wight & Arn.) Wight

習性：灌木。花果期：3-12月。

產地：扯旗山、西貢、黃竹洋、城門、元墩下、梧桐寨。生於林中或灌叢。

分佈：雲南、廣西、海南、廣東、福建、臺灣。印度、尼泊爾、緬甸、越南、馬來西亞。

用途：藥用。

蓋裂果屬 *Mitracarpus* Zucc. ex J. A. Schultes & J. H. Schultes

蓋裂果

†*Mitracarpus villosus* (Sw.) DC.

習性：草本。花期：4—6月。

產地：深水灣、沙田、沙角尾、葵涌。

分佈：海南。印度、熱帶南美洲、熱帶東非和西非。

巴戟天屬 *Morinda* L.

大果巴戟 (柔毛雞眼藤) *Cochinchina Indianmulberry*

Morinda cochinchinensis DC. (*Morinda villosa* auct. non Hook. f.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：攀援灌木。花果期：5-9月。

產地：馬鞍山、海下、荔枝窩。生於林中。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南。越南。

用途：藥用。

雞眼藤 *Littleleaf Indianmulberry*

†*Morinda parvifolia* Bartl. ex DC.

習性：攀援灌木。花期：4-7月；果期：7-8月。

產地：香港各地。生於林中或灌叢。

分佈：中國南部至東南部。越南、菲律賓。

用途：藥用。

羊角藤 *Common Indianmulberry*

Morinda umbellata L.

習性：攀援灌木。花果期：5-11月。

產地：大潭、馬鞍山、大埔滘、西灣、大嶼山。生於灌叢。

分佈：中國西南部至東南部。印度經馬來西亞至菲律賓。

用途：藥用。

玉葉金花屬 *Mussaenda* L.

楠藤 (野白紙扇) *Erose Mussaenda*

Mussaenda erosa Champ.

習性：攀援灌木。花期：4-7月；果期：4-12月。

產地：香港島、馬鞍山、大埔、梧桐寨、平山仔、粉嶺、八仙嶺、大嶼山。生於林中或灌叢。

分佈：海南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川。日本 (琉球群島)。

用途：藥用。

紅葉金花 *Redleaved Mussaenda*

**Mussaenda erythophylla* Schum. & Thonn.

習性：灌木。花期：夏季。

產地：栽培。

分佈：原產非洲。

用途：觀賞。

廣東玉葉金花 *Kwengtung Mussaenda*

†*Mussaenda kwangtungensis* Li

習性：攀援灌木。花期：春夏。

產地：大嶼山、馬鞍山。生於林中。

分佈：廣東。

玉葉金花 *Buddha's Lamp*

Mussaenda pubescens Ait f.

習性：攀援灌木。花期：4-7月。

產地：香港各地。生於路旁、灌叢。

分佈：長江以南各省區。

用途：藥用。

烏檀屬 *Nauclea* L.

烏檀 Medicinal Fatheadtree

†*Nauclea officinalis* (Pierre ex Pitard) Merr. & Chun

習性：喬木。果期：夏季。

產地：沙頭角。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南。越南、柬埔寨、老撾、泰國、馬來西亞、印度尼西亞。

用途：藥用、材用。

東方烏檀 Pincushion Tree

**Nauclea orientalis* (L.) L.

習性：喬木。花期：2-6月。

產地：栽培於庭園或作行道樹。

分佈：斯里蘭卡、緬甸、泰國、馬來西亞、新幾內亞、澳大利亞。

新耳草屬 *Neanotis* W. H. Lewis

卷毛新耳草（黃細心假耳草） *Boerbaavia Neanotis*

Neanotis boerhaavoides (Hance) W. H. Lewis (*Anotis boerhaavioides* Maxim.)

習性：草本。花期：秋冬。

產地：元朗。生於草地。

分佈：廣東、福建、江西。

落葉新耳草 *Hirsute Neanotis*

†*Neanotis hirsuta* (L. f.) W. H. Lewis

習性：草本。花果期：7-10月。

產地：梧桐寨、大帽山。生於林下。

分佈：雲南、江西、浙江、江蘇。日本、印度、印度尼西亞。

新耳草 *Thwaites Neanotis*

†*Neanotis thwaitesiana* (Hance) W. H. Lewis

習性：草本。花期：春夏。

產地：二澳。生於草地。

分佈：廣東。

蛇根草屬 *Ophiorrhiza* L.

廣州蛇根草 *Canton Ophiorrhiza*

Ophiorrhiza cantoniensis Hance

習性：草本或亞灌木。花期：冬春；果期：春夏。

產地：香港島、大帽山、大嶼山。生於林下、溪邊。

分佈：海南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川。

日本蛇根草 *Japanese Ophiorrhiza*

Ophiorrhiza japonica Blume

習性：草本。花期：冬春；果期：春夏。

產地：香港島、大帽山、大嶼山。生於林下。

分佈：華南、華東、西南和湖北、陝西等省區。日本、越南。

短小蛇根草 *Dwarf Ophiorrhiza*

Ophiorrhiza pumila Champ. ex Benth.

習性：草本。花期：3-7月。

產地：香港島、城門、大帽山、梧桐寨、大嶼山。生於林下、溪邊。

分佈：海南、廣東、廣西、江西、福建、臺灣。越南。

用途：藥用。

雞爪筋屬 *Oxyceros* Lour.

雞爪筋 *Chinese Randia*

Oxyceros sinensis Lour. [*Randia sinensis* (Lour.) Schult.]

習性：灌木或喬木。花期：3-12月；果期：5月至翌年2月。

產地：香港島、大嶼山、南丫島、蒲台島、大鵬灣平洲。生於曠野、林中或灌叢。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、福建、臺灣。

用途：綠籬。

雞矢藤屬 *Paederia* L.

雞矢藤 *Chinese Feverine*

Paederia scandens (Lour.) Merr.

習性：藤本。花期：夏秋季；果期：10-12月。

產地：香港各地。生於灌叢。

分佈：長江流域及其以南各省區。日本、印度至印度尼西亞。

用途：藥用、纖維。

毛雞矢藤 (毛葉雞矢藤) Tomentose
Feverine

Paederia scandens var. **tomentosa** (Blume)
Hand.-Mazz.

習性：藤本。花期：夏秋；果期：10-12月。
產地：摩星嶺、大埔滘、大帽山、大嶼山。
生於灌叢。
分佈：長江流域及其以南各省區。日本、印度至印度尼西亞。
用途：藥用、纖維。

大沙葉屬 *Pavetta* L.

香港大沙葉 (茜木) Hongkong *Pavetta*
Pavetta hongkongensis Bremek.

習性：灌木或喬木。花期：3-8月；果期：6-12月。
產地：香港各地。生於灌叢或林中。
分佈：海南、廣東、廣西、雲南。菲律賓。
用途：藥用。

五星花屬 *Pentas* Benth.

五星花 *Pentas*

****Pentas lanceolata*** (Forsk.) K. Schum.

習性：亞灌木。花期：3-8月。
產地：栽培。
分佈：中國南部栽培。原產非洲熱帶和阿拉伯地區。
用途：觀賞。

九節屬 *Psychotria* L.

九節 (山大刀) Red *Psychotria*

Psychotria asiatica L. [*Psychotria rubra* auct. non (Lour.) Poir.: Check List HK Pl. 1993.]

習性：灌木或喬木。花果期：全年。
產地：香港各地。生於曠地、灌叢或林中。
分佈：海南、廣東。
用途：藥用。

蔓九節 Creeping *Psychotria*

Psychotria serpens L.

習性：藤本。花期：4-7月；果期：全年。
產地：香港各地。生於林中或灌叢。
分佈：海南、廣東、廣西、福建、浙江、臺

灣。朝鮮、日本、泰國、老撾、越南、柬埔寨。

用途：藥用。

假九節 (小葉九節) Tutcher *Psychotria*

Psychotria tutcherii Dunn

習性：灌木。花期：4-7月；果期：6-12月。
產地：聶高信山、奇力山、馬鞍山。生於灌叢或林中。
分佈：海南、廣東、廣西、雲南、福建。越南。

墨苜蓿屬 *Richardia* L.

墨苜蓿 (李察草) Mexican Clover

****Richardia scabra*** L. (*Richardia brasiliensis* auct. non Gomez: Check List HK Pl. 1993.)

習性：草本。花期：2-7月。
產地：荔枝角、沙田、深井、大欖涌、大帽山、大埔、鹿頸。生於草地、路邊、荒地。
分佈：海南、廣東。原產熱帶美洲。

郎德木屬 *Rondeletia* L.

郎德木 Fragrant *Rondeletia*

****Rondeletia odorata*** Jacq.

習性：灌木。花期：7-12月。
產地：公園栽培。
分佈：原產古巴、巴拿馬、墨西哥。
用途：觀賞。

羅德曼屬 *Rothmannia* Thunb.

羅德曼 Globose *Rothmannia*

****Rothmannia globosa*** (Hochst.) Keay
(*Gardenia globosa* Hochst.)

習性：灌木。花期：3月。
產地：公園栽培。
分佈：原產非洲。
用途：觀賞。

長花羅德曼 Longflower *Rothmannia*

†****Rothmannia longiflora*** Salisb.

習性：灌木。花期：3-6月。
產地：公園栽培。
分佈：原產非洲。

用途：觀賞。

茜草屬 *Rubia* L.

多花茜草 Wallich Madder

†*Rubia wallichiana* Decne. (*Rubia cordifolia* auct. non L.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：草本。花果期：秋冬。

產地：大帽山、大東山。生於灌叢。

分佈：中國西南部、南部經中部至東部。亞洲熱帶地區，南至澳大利亞。

用途：藥用。

白馬骨屬 *Serissa* Comm. ex Juss.

六月雪 Snow of June

†**Serissa japonica* (Thunb.) Thunb.

習性：灌木。花期：3-10月。

產地：公園及庭園栽培。生於灌叢；野生或栽培。

分佈：廣東、廣西。日本、尼泊爾、老撾、越南、柬埔寨；常栽培。

用途：觀賞、綠籬、藥用。

白馬骨（滿天星） *Serissa*

**Serissa serissoides* (DC.) Druce

習性：灌木。花期：夏秋季。

產地：公園及庭園栽培。

分佈：中國西南部、南部、中部至東南部。日本（琉球群島）；常栽培。

用途：藥用、觀賞、綠籬。

烏口樹屬 *Tarenna* Gaertn.

假桂烏口樹（達侖木） Tapered *Tarenna*

Tarenna attenuata (Voigt) Hutch.

習性：灌木或喬木。花期：4-12月；果期：5月至翌年1月。

產地：香港島、沙田、大圍、大嶼山、南丫島。生於林中或灌叢。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南。印度、越南、柬埔寨。

用途：藥用。

白花苦燈籠（烏口樹） Whiteflower *Tarenna*

Tarenna mollissima (Hook. & Arn.) Robinson

習性：灌木或喬木。花期：5-11月；果期：

5月至翌年2月。

產地：香港島、馬鞍山、壁屋、鹿湖。生於林中或灌叢。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、貴州、湖南、江西、福建、浙江。

用途：藥用。

鈎藤屬 *Uncaria* Schreber

毛鈎藤（剛毛鈎藤） Hirsute Gambirplant

Uncaria hirsuta Mavil.

習性：藤本。花果期：3-12月。

產地：石澳、馬鞍山、企嶺下、大嶼山。生於灌叢。

分佈：廣東、廣西、貴州、福建、臺灣。

用途：藥用。

北越鈎藤 North Viet-Nam Gambirplant

Uncaria homomalla Miq.

習性：藤本。花期：5-10月。

產地：香港有標本記錄。生於灌叢。

分佈：廣西、雲南。印度、孟加拉、緬甸、泰國、越南、柬埔寨、馬來西亞、印度尼西亞。

大葉鈎藤 Large Gambirplant

†*Uncaria macrophylla* Wall.

習性：藤本。花期：夏季。

產地：大嶼山。生於林中。

分佈：雲南、廣西、海南、廣東。印度、不丹、孟加拉、緬甸、泰國、老撾、越南。

用途：藥用。

318. 忍冬科 *Caprifoliaceae*

六道木屬 *Abelia* R. Br.

糯米條（茶條樹）

Abelia chinensis R. Br.

習性：灌木。花期：7-8月

產地：赤柱、大嶼山。生於灌叢中。

分佈：長江以南各省區。

用途：觀賞。

大花六道木 Glossy *Abelia*

**Abelia* × *grandiflora* (Andre) Rehd.

(*Abelia chinensis* R. Br. × *Abelia uniflora* R. Br.)

習性：灌木。
產地：栽培。
分佈：庭園栽培。
用途：觀賞。

忍冬屬 *Lonicera* L.

華南忍冬（山銀花） Wild Honeysuckle

Lonicera confusa (Sweet) DC.

習性：藤本。花期：5月；果期：10月。
產地：新界、大嶼山。生於山坡、灌叢。
分佈：海南、廣東、廣西。越南、尼泊爾。
用途：花供藥用。

忍冬（金銀花） Honeysuckle

Lonicera japonica Thunb.

習性：藤本。花期：4月；果期：9月。
產地：大潭。生於山坡、灌叢。常見栽培。
分佈：除西北省區外，全國大部分地區有分佈。日本、朝鮮。
用途：藥用。

長花忍冬 Long-flowered Honeysuckle

Lonicera longiflora (Lindl.) DC.

習性：藤本。花期：4月；果期：10月。
產地：香港島、紅梅谷、大嶼山。生於山地路旁。
分佈：海南、廣東、雲南。

大花忍冬 Large-flowered Honeysuckle

Lonicera macrantha (D. Don) Spreng.

習性：藤本。花期：3-4月；果期：5-6月。
產地：香港各地。生於山谷和山坡林中。
分佈：華南、華東、西南各省區。尼泊爾、不丹、印度、緬甸、越南。

皺葉忍冬（顯脈忍冬）

Lonicera rhytidophylla Hand.-Mazz.
(*Lonicera reticulata* Champ.)

習性：藤本。花期：4-7月。
產地：大潭、馬己仙峽、扯旗山、馬鞍山。生於灌叢、林中。
分佈：廣東、廣西、湖南、江西、福建。

穿葉忍冬 Trumpet Honeysuckle

**Lonicera sempervirens* L.

習性：藤本。花期：4-7月。
產地：栽培。
分佈：各地溫室栽培，原產北美。
用途：觀賞。

接骨木屬 *Sambucus* L.

接骨草 Elder

Sambucus chinensis Lindl. (*Sambucus javanica* Blume)

習性：草本或亞灌木。花期：4-6月。
產地：壽臣山、寶雲道、西貢大浪、烏蛟騰、沙頭角、大嶼山等。生於林下。
分佈：秦嶺以南，西至西藏。
用途：藥用。

莢蒾屬 *Viburnum* L.

蝶花莢蒾 Hance's Viburnum

†*Viburnum hanceanum* Maxim

習性：灌木。花期：3-4月。
產地：粉嶺、沙螺洞、八仙嶺、大嶼山。生於山谷、灌叢。
分佈：廣東、廣西、湖南、江西、福建。

呂宋莢蒾

†*Viburnum luzonicum* Rolfe

習性：灌木。花期：4月。
產地：鳳凰山。生於山坡灌叢。
分佈：廣東、廣西、雲南、福建、浙江、江西。中南半島、菲律賓至馬來西亞的馬六甲。

珊瑚樹 Sweet Viburnum

Viburnum odoratissimum Ker-Gawl.

習性：灌木或小喬木。花期：3-4月；果期：6-7月
產地：香港各地。
分佈：海南、廣東、廣西、湖南、福建。印度、緬甸、泰國、越南。
用途：綠化樹種。

常綠莢蒾 Evergreen Viburnum

Viburnum sempervirens K. Koch

習性：灌木。花期：4-5月；果期：7-10月。

產地：香港各地。生於山谷林中。
分佈：廣東、廣西、江西。

323. 菊科 Asteraceae (Compositae)

刺苞菊屬 *Acanthospermum* Schrank.

毛葉刺苞菊 Bristly Starbur, Starbur

**Acanthospermum hispidum* DC.

習性：多年生草本。花期：9月。

產地：青衣、西貢（歸化）。生於荒地中。

分佈：原產巴西、阿根廷。有害雜草。

下田菊屬 *Adenostemma* J. R. Forst. & G. Forst.

下田菊

Adenostemma lavenia (L.) Kuntze

習性：一年生草本。花期：5-12月。

產地：香港仔、南山、大帽山、打鐵崗。生於水田邊、路邊、荒地中。

分佈：華南、西南、中南、華東。印度、菲律賓、朝鮮、澳大利亞。

用途：藥用。

藿香薊屬 *Ageratum* L.

藿香薊 Billygoat-weed, Goatweed

**Ageratum conyzoides* L.

習性：一年生草本。花期：6-10月。

產地：香港各地歸化成野生狀。

分佈：原產中南美洲，世界各地均有栽培。

熊耳草 *Ageratum*, Blue billygoat-weed

**Ageratum houstonianum* Mill.

習性：一年生草本。花期：幾全年。

產地：香港島、新界。生於田邊、路旁及荒地中。

分佈：原產墨西哥，現廣佈於熱帶亞熱帶地區。

兔兒風屬 *Ainsliaea* DC.

杏葉兔兒風

Ainsliaea fragrans Champ. (*Ainsliaea parvifolia* auct. non Merr.: Check List HK Pl. 1993, p. p.)

習性：多年生草本。花期：11月至翌年2

月。

產地：香港各地。生於灌叢、草地和路邊。

分佈：廣東、湖南、江西、福建、浙江。

用途：藥用。

燈檯兔兒風

Ainsliaea macrochinidioides Hayata

(*Ainsliaea parvifolia* auct. non Merr.:

Check List HK Pl. 1993, p. p.)

習性：多年生草本。花期：7-8月。

產地：大東山。生於山坡疏林下，路邊。

分佈：廣東、廣西、湖南、湖北、江西、安徽、福建、浙江、臺灣。

華南兔兒風

Ainsliaea walkerii Hook. f.

習性：多年生草本。花期：3-5月。

產地：大潭、新娘潭。生於山谷林下。

分佈：廣東、廣西、福建。

豚草屬 *Ambrosia* L.

豚草 Ragweed

**Ambrosia artemisiifolia* L. [*Ambrosia maritima* auct. non (L.) DC.: Check List HK Pl. 1993.]

習性：一年生草本。花期：夏至秋季。

產地：荔枝角。生於路邊、荒地中。

分佈：原產北美，現為廣佈雜草。

山黃菊屬 *Anisopappus* Hook. & Arn.

山黃菊 Yellow Weed

Anisopappus chinensis (L.) Hook. & Arn.

習性：一年生草本。花期：8-11月。

產地：香港各地。生於林緣、草坡、荒地中。

分佈：廣東、廣西、雲南、福建。

木筒蒿屬 *Argyranthemum* Webb. ex Sch.-Bip.

木筒蒿 (白仔菊) Marguerite

**Argyranthemum frutescens* (L.) Sch.-Bip. (*Chrysanthemum frutescens* L.)

習性：亞灌木。花期：5-6月。

產地：栽培。

分佈：原產北非。

用途：觀賞。

蒿屬 *Artemisia* L.

黃花蒿 Wormwood

Artemisia annua L.

習性：一年生草本。花期：夏至秋季。

產地：新界。生於路邊、荒地中。

分佈：廣佈於亞洲、歐洲和北美洲。

用途：藥用。

茵陳蒿

Artemisia capillaris Thunb. (*Artemisia scoparia* auct. non Waldst.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：一、二年生草本。花期：7-10月。

產地：咸田灣、浪茄灣。生於海濱草地。

分佈：廣佈於東亞、中亞和南亞。

用途：藥用。

五月艾 Mugwort

Artemisia indica Willd. (*Artemisia vulgaris* auct. non L.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：多年生草本。花期：8-10月。

產地：香港島、大帽山、大嶼山。生於耕地邊、路邊、林緣、灌叢中。

分佈：中國南北各地。中亞和南亞。

用途：藥用。

牡蒿 Japanese Wormwood

Artemisia japonica Thunb.

習性：多年生草本。花期：7-10月。

產地：城門、飛鵝山、馬鞍山、青山、平洲。生於林緣、山坡草叢中。

分佈：廣佈於東亞和東南亞各地。

用途：藥用。

白苞蒿 (甜菜子) White Wormwood

Artemisia lactiflora Wall. ex DC.

習性：多年生草本。花期：8-11月。

產地：城門。生於溝邊、路邊。

分佈：廣佈於東亞和東南亞各地。

用途：藥用。

野艾蒿

†*Artemisia lavandulifolia* DC.

習性：多年生草本。花期：8-10月。

產地：青衣島。生於林緣、路邊。

分佈：華南、華中、華東、華北、東北各地。日本、朝鮮、俄羅斯遠東地區。

用途：藥用。

魁蒿

†*Artemisia princeps* Pamp.

習性：多年生草本。花期：7-11月。

產地：歌賦山。生於林緣、灌叢中和溝邊、路旁。

分佈：華南、西南、華中、華北及陝西、甘肅、內蒙古、遼寧。朝鮮、日本。

用途：藥用。

紫菀屬 *Aster* L.

三脈紫菀

Aster ageratoides Turcz.

習性：多年生草本。花期：5-12月。

產地：大帽山、梧桐寨。生於林緣、灌叢、路邊。

分佈：華南、西南、華中、華東。越南。

微糙三脈紫菀

†*Aster ageratoides* var. *scaberulus* (Miq.) Ling

習性：多年生草本。花期：5-12月。

產地：香港各地。生於山地灌叢、草坡、林緣和路邊。

分佈：華南、西南、華中、華東。越南。

白舌紫菀

Aster baccharoides Benth.

習性：多年生草本。花期：6-12月。

產地：香港各地。生於山坡灌叢中和路邊。

分佈：廣東、福建、湖南、江西、浙江。

荷蘭菊 Michaelmas Daisy

**Aster novi-belgii* L.

習性：多年生草本。花期：夏秋季。

產地：栽培。

分佈：原產北美洲，現廣泛栽培於世界各地。

用途：觀賞。

琴葉紫菀

Aster panduratus Nees ex Walp.

習性：多年生草本。花期：1-10 月。

產地：沙田、飛鵝山、大嶼山。生於山坡草叢、荒地、路邊。

分佈：廣東、廣西、貴州、四川、湖北、湖南、江西、浙江、江蘇。

香港紫菀

Aster striatus Champ.

習性：多年生草本。花期：5-10 月。

產地：螺洲、扯旗山。生於山坡草叢、灌叢中。

分佈：香港特有。

鑽形紫菀

†***Aster subulatus** Michx.

習性：多年生草本。花期：8—10 月。

產地：坪洲、白石角、沙埔、龍鼓上灘。生於荒地中。

分佈：外來雜草，原產北美洲。

鬼針草屬 *Bidens* L.

白花鬼針草

†***Bidens alba** (L.) DC.

習性：一年生草本。花期：6-11 月。

產地：香港各地。生於路邊荒地。

分佈：原產熱帶美洲，現廣佈於熱帶地區。

婆婆針 Bur-Marigold

Bidens bipinnata L.

習性：一年生草本。花期：6-9 月。

產地：香港各地。生於路邊荒地。

分佈：美洲、歐洲、亞洲及非洲東部。

用途：藥用。

鬼針草 Hairy Bur-Marigold

Bidens pilosa L.

習性：一年生草本。花期：6-11 月。

產地：香港各地。生於路邊、荒地中。

分佈：廣佈於亞洲和熱帶美洲。

用途：藥用。

艾納香屬 *Blumea* DC.

艾納香 Balsamic *Blumea*

Blumea balsamifera (L.) DC.

習性：多年生草本。花期：幾全年。

產地：新界。生於林緣、荒山草坡。

分佈：中國南部。巴基斯坦、印度、泰國、緬甸、中南半島、馬來西亞。

用途：藥用。

七里明 Clark's *Blumea*

Blumea clarkei Hook. f.

習性：多年生草本。花期：10 月至翌年 4 月。

產地：香港各地。生於山谷濕潤處，路邊。

分佈：中國南部。印度、緬甸、中南半島、馬來西亞。

毛氈草

Blumea hieracifolia (D. Don) DC. [*Blumea sericans* auct. non (Kurz) Hook. f.: Check List HK Pl. 1993.]

習性：多年生草本。花期：12 月至翌年 4 月。

產地：大嶼山、城門、大埔。生於耕地邊、路邊、荒地中。

分佈：中國南部。巴基斯坦、印度、緬甸、中南半島、馬來西亞。

見霜黃 Malay *Blumea*

Blumea lacera (Burm. f.) DC.

習性：多年生草本。花期：2—6 月。

產地：大潭、青山。生於耕地邊、山坡草地、路邊。

分佈：中國南部各省區。亞洲東南部、非洲東南部和大洋洲北部。

六耳鈴

Blumea laciniata (Roxb.) DC.

習性：多年生草本。花期：10 月至翌年 5 月。

產地：香港各地。生於耕地邊、路邊、荒山草地中。

分佈：中國南部。印度、巴基斯坦、中南半島、馬來西亞。

千頭艾納香

Blumea lanceolaria (Roxb.) Druce

習性：多年生草本。花期：1—4月。
產地：香港仔、鳳園、西貢。生於荒山草地和路邊。
分佈：廣東、廣西、雲南、貴州、臺灣。印度、巴基斯坦、緬甸、泰國、中南半島、菲律賓、印度尼西亞。

東風草 (大头艾納香) Big-flowered
Blumea

Blumea megacephala (Randeria) Chang & Tseng (*Blumea riparis* var. *megacephala* Randeria)

習性：多年生草質藤本。花期：7—12月。林緣、灌叢中。
產地：香港各地。生於林緣和山坡草地。
分佈：廣東、廣西、雲南、貴州、四川、湖南、江西、福建、臺灣。

柔毛艾納香

Blumea mollis (D. Don) Merr.

習性：一年生草本。花期：幾全年。
產地：香港島、大埔、粉嶺。生於山坡草地、路邊。
分佈：中國南部。南亞、印度尼西亞至大洋洲北部、非洲。

無梗艾納香

Blumea sessiliflora Decne.

習性：一年生草本。花期：6—11月。
產地：新界。生於山坡草地、路邊。
分佈：廣東、江西。印度、緬甸、泰國、中南半島、印度尼西亞。

金盞花屬 **Calendula** L.

金盞花

***Calendula officinalis** L.

習性：一年生草本。花期：4—10月。
產地：栽培。
分佈：歐洲南部和非洲北部。
用途：觀賞。

翠菊屬 **Callistephus** Cass.

翠菊 China Aster

***Callistephus chinensis** (L.) Nees

習性：一、二年生草本。花期：5-10月。
產地：栽培。
分佈：中國西南、華東、華北各地。
用途：觀賞。

天名精屬 **Carpesium** L.

天名精

Carpesium abrotanoides L.

習性：多年生草本。花期：6月至翌年3月。
產地：沙田。生於村邊荒地，路邊。
分佈：中國南北各地。日本、朝鮮、緬甸、錫金。
用途：藥用。

矢車菊屬 **Centaurea** L.

矢車菊 Cornflower

***Centaurea cyanus** L.

習性：一、二年生草本。花期：2—8月。
產地：栽培。
分佈：歐洲。
用途：觀賞。

石胡荽屬 **Centipeda** Lour.

石胡荽

Centipeda minima (L.) A. Br. & Aschers.

習性：一年生草本。花期：6—10月。
產地：香港各地。生於路邊荒地。
分佈：中國南北各地。朝鮮、日本、印度、馬來西亞、大洋洲。
用途：藥用。

茼蒿屬 **Chrysanthemum** L.

蒿子桿 Tricolor Chrysanthemum

***Chrysanthemum carinatum** Schousb.

習性：一年生草本。花期：5—9月。
產地：栽培。
分佈：原產地中海地區。
用途：觀賞、食用。

艾菜 歐茼蒿 Crown Daisy

***Chrysanthemum coronarium** L.

(*Chrysanthemum spatiosum* auct. non Bailey; Check List HK Pl. 1993.)

習性：一年生草本。花期：5—9月。

產地：栽培。
分佈：原產地中海地區。中國各地有栽培。
用途：觀賞。

茼蒿 Corn Chrysanthemum

**Chrysanthemum segetum* L.

習性：一年生草本。花期：4—8月。
產地：栽培。
分佈：原產地中海地區。中國各地有栽培。
用途：蔬菜。

薊屬 *Cirsium* Mill.

湖北薊

Cirsium hupehense Pamp. [*Cirsium lineare* (Thunb.) Schult.-Bip.]

習性：多年生草本。花期：8—11月。
產地：香港各地。生於林緣及荒地中。
分佈：華南、西南、華東、華中。

薊 Japanese Thistle

Cirsium japonicum Fisch. ex DC.

習性：多年生草本。花期：4—11月。
產地：鶴咀、大嶼山、清水灣。生於山坡草叢、荒地中。
分佈：華南、西南、華中、華東以及河北陝西等省。朝鮮、日本。
用途：藥用。

白酒草屬 *Conyza* Less.

香絲草

**Conyza bonariensis* (L.) Cronq.

習性：一年生草本。花期：4—9月。
產地：香港各地。生於荒地、路邊。
分佈：華南、西南、華中、華東各省。原產南美洲，現廣佈於熱帶和亞熱帶地區。
用途：藥用。

小蓬草

**Conyza canadensis* (L.) Cronq.

習性：一年生草本。花期：5—9月。
產地：香港各地。生於路邊、荒地中。
分佈：原產北美洲。現廣佈於中國南北各地。
用途：藥用。

白酒草

Conyza japonica (Thunb.) Less.

習性：一年生草本。花期：5—8月。
產地：香港島、大帽山。生於林緣、荒山坡。
分佈：華南、西南、華中、華東。日本、印度、緬甸、泰國、馬來西亞。
用途：藥用。

蘇門白酒草

†**Conyza sumatrensis* (Retz.) Walker

習性：一年生草本。花期：5—10月。
產地：沙田、黃竹坑、坪洲。生於路邊、荒地中。
分佈：華南、西南和福建、臺灣等省區。原產南美洲，現廣佈於熱帶和亞熱帶地區。

金雞菊屬 *Coreopsis* L.

劍葉金雞菊 Lance *Coreopsis*

**Coreopsis lanceolata* L.

習性：多年生草本。花期：5—9月。
產地：栽培。
分佈：原產北美洲。
用途：觀賞。

兩色金雞菊 *Coreopsis*

**Coreopsis tinctoria* Nutt.

習性：一年生草本。花期：5—9月。
產地：栽培。
分佈：原產北美洲。
用途：觀賞。

秋菊屬 *Cosmos* Cav.

秋英 Common *Cosmos*

**Cosmos bipinnatus* Cav.

習性：一年生草本。花期：8—10月。
產地：栽培。
分佈：原產墨西哥。
用途：觀賞。

山芫荽屬 *Cotula* L.

芫荽菊 Chamomile

Cotula anthemoides L.

習性：一年生草本。花期：7月至翌年4月。
產地：大埔、沙田、荔枝角。生於路邊、荒地中。

分佈：中國南部。印度、巴基斯坦、中南半島、非洲。

野萵蒿屬 *Crassocephalum* Moench

野萵蒿

†**Crassocephalum crepidioides* (Benth.) S. Moore

習性：一年生草本。花期：幾全年。
產地：香港各地。生於路邊、荒地中。
分佈：中國南部。印度、中南半島、非洲。

芙蓉菊屬 *Crossostephium* Less.

芙蓉菊

**Crossostephium chinense* (L.) Makino

習性：多年生草本。花期：7月至翌年4月。
產地：黑角頭、火石洲。生於海邊石縫中。
分佈：中國東南沿海各地。中南半島、日本、菲律賓有栽培。

用途：藥用。

大麗花屬 *Dahlia* Cav.

大麗花 (洋芍藥) Garden Dahlia

**Dahlia pinnata* Cav.

習性：多年生草本。花期：8—12月。
產地：庭園栽培。
分佈：原產墨西哥。
用途：觀賞。

菊屬 *Dendranthema* (DC.) Des Moul

野菊 Chinese Chrysanthemum

Dendranthema indicum (L.) Des Moul
(*Chrysanthemum indicum* L.)

習性：多年生草本。花期：7—12月。
產地：香港各地。生於山坡草叢、路邊。
分佈：中國南北各地。印度、朝鮮、日本。
用途：藥用。

菊花 Common Chrysanthemum

**Dendranthema morifolium* (Ramat.) Tzvelev
(*Chrysanthemum morifolium* Ramat.)

習性：多年生草本。花期：10月至翌年2月。

產地：栽培。

分佈：原產中國。現已廣泛栽培於世界各地。

用途：觀賞、藥用。

魚眼菊屬 *Dichrocephala* L'Herit. ex DC.

魚眼草

Dichrocephala integrifolia (L. f.) Kuntze
[*Dichrocephala bicolor* (Roth.) Schltr.]

習性：一年生草本。花期：幾全年。
產地：薄扶林、大坳門、橋咀洲、粉嶺、梅子林。生於水田邊、荒地中、路邊。
分佈：長江以南各省區。
用途：藥用。

鱧腸屬 *Eclipta* L.

鱧腸 *Eclipta*

Eclipta prostrata (L.) L.

習性：多年生草本。花期：9—11月。
產地：香港各地。生於水田邊、荒地中、溪邊潮濕地。
分佈：廣佈於世界熱帶、亞熱帶地區。
用途：藥用。

地膽草屬 *Elephantopus* L.

地膽草. Elephants-foot

Elephantopus scaber L.

習性：多年生草本。花期：7—11月。
產地：香港各地。生於路邊、荒地中。
分佈：華南、西南、華東。廣佈於亞洲、美洲和非洲熱帶地區。
用途：藥用。

白花地膽草

Elephantopus tomentosus L.

習性：多年生草本。花期：8月至翌年5月。
產地：香港各地。生於山坡草地、路邊。
分佈：海南、廣東、福建、臺灣。廣佈於熱帶地區。
用途：藥用。

一點紅屬 *Emilia* Cass.

小一點紅

†*Emilia prenanthoides* DC.

習性：一年生草本。花期：4—11月。

產地：大嶼山、九擔租。生於耕地邊、荒地中。

分佈：廣東、貴州、湖南、福建。

一點紅 Tassel-Flower

Emilia sonchifolia (L.) DC.

習性：一年生草本。花期：幾全年。

產地：香港各地。生於耕地邊、荒地中。

分佈：長江以南各省區。廣佈於熱帶亞洲和熱帶非洲。

用途：藥用。

球菊屬 *Epaltes* Cass.

球菊 (鵝不食草) Goose-no-eat

Epaltes australis Less. [*Sphaeromorphaea australis* (Less.) Kitam.]

習性：一年生草本。花期：3—6月。

產地：粉嶺、沙田、尖鼻咀、白石角、河背。生於水田邊。

分佈：廣東、廣西、雲南、福建、臺灣。印度、泰國、中南半島、馬來西亞、大洋洲。

菊苣屬 *Erechtites* Raf.

梁子菜

†**Erechtites hieracifolia* (L.) Raf. ex DC.

習性：一年生草本。花期：5—10月。

產地：香港各地。生於荒地潮濕處。

分佈：廣東、廣西、雲南、貴州、四川、湖北、湖南、江西、福建、臺灣。

裂葉苣 (菊苣)

**Erechtites valerianifolia* (Wolf.) DC.

習性：一年生草本。花期：5—6月。

產地：米埔、錦田。生於林緣、路邊和荒地中。

分佈：原產巴西，現廣佈於熱帶地區。

飛蓬屬 *Erigeron* L.

加勒比飛蓬 Bonytip Fleabane

**Erigeron karvinskianus* DC.

習性：多年生草本。花期：6—10月。

產地：香港島，原為栽培，現歸化成野生狀。生於路邊、荒地。

分佈：原產墨西哥、巴拿馬。

用途：觀賞。

澤蘭屬 *Eupatorium* L.

假臭草

†**Eupatorium catarium* Veldk. (*Praxelis clematidea* R. M. King & H. Robinson)

習性：多年生草本。花期：幾全年。

產地：香港各地。生於路邊、荒地中。

分佈：原產南美洲，現在廣東南部和澳大利亞均有分佈，為一外來雜草。

華澤蘭 Boneset

Eupatorium chinense L.

習性：多年生草本。花期：6—11月。

產地：新圍、大帽山。生於灌叢中。

分佈：廣東、廣西、雲南、貴州、四川、湖南、湖北、福建、浙江、安徽。

用途：藥用。

白頭婆 Japanese Boneset

Eupatorium japonicum Thunb.

習性：多年生草本。花期：6—11月。

產地：香港仔、大帽山、大埔、大嶼山。生於山坡灌叢中和路邊荒地。

分佈：黃河以南各省。日本、朝鮮。

用途：藥用。

林澤蘭 Lindley's Boneset

Eupatorium lindleyana DC.

習性：多年生草本。花期：5—12月。

產地：扯旗山、大嶼山、西貢。生於林緣、山坡草地、灌叢中。

分佈：中國南北各地（新疆除外）。

飛機草

†**Eupatorium odoratum* L.

習性：多年生草本。花果期：4—12月。

產地：南丫島。生於路邊、荒地中。

分佈：原產美洲，現廣佈於熱帶、亞熱帶地區。

大吳風草屬 *Farfugium* Lindl.

大吳風草

Farfugium japonicum (L. f.) Kitam.

習性：多年生草本。花期：8月至翌年3月。
產地：薄扶林、大東山、鳳凰山。生於林下。
分佈：廣東、廣西、福建、臺灣、湖北、湖南。
用途：觀賞。

天人菊屬 *Gaillardia* Foug.

天人菊 荔枝菊 *Gaillardia*

**Gaillardia aristata* Pursh.

習性：多年生草本。花期：7—9月。
產地：栽培。
分佈：熱帶美洲。
用途：觀賞。

牛膝菊屬 *Galinsoga* Ruiz & Pavon

牛膝菊

**Galinsoga parviflora* Cav.

習性：一年生草本。花期：5—12月。
產地：上水、火炭。生於耕地邊、荒地中、路邊。
分佈：原產南美洲，現廣佈於熱帶亞熱帶地區。

扶郎花屬 *Gerbera* L.

非洲菊 (扶郎花) *Flameray Gerbera*

**Gerbera jamesonii* Bolus ex Hook. f.

習性：多年生草本。花期：冬季至翌年春季。
產地：栽培。
分佈：原產非洲。
用途：觀賞。

毛大丁草 *Hairy Gerbera*

Gerbera piloselloides (L.) Cass.

習性：多年生草本。花期：3月及8—12月。
產地：清水灣、馬鞍山、大嶼山、大鵬灣平洲。生於山坡草地、灌叢中。
分佈：華南、西南、華中、華東。朝鮮、日本、越南、印度、緬甸、印度尼西亞。
用途：藥用。

鹿角草屬 *Glossocardia* Cass.

鹿角草

Glossocardia bidens (Retz.) Veldk.

(*Glossogyne tenuifolia* Cass.)

習性：多年生草本。花期：6—7月。
產地：黃泥涌峽、大潭、沙田、蒲台島。生於海濱坡地和石上。
分佈：海南、廣東、廣西、臺灣。菲律賓、馬來西亞及大洋洲。
用途：藥用。

鼠麴草屬 *Gnaphalium* L.

鼠麴草 *Cudweed*

Gnaphalium affine D. Don

習性：一年生草本。花期：8—12月。
產地：香港各地。生於荒地中、水田邊。
分佈：中國南北各地。日本、菲律賓、越南、中南半島、印度尼西亞。
用途：藥用。

秋鼠麴草 *Yellow Cudweed*

Gnaphalium hypoleucum DC.

習性：多年生草本。花期：8—12月。
產地：香港各地。生於耕地邊、荒地中。
分佈：中國南北各地。日本、菲律賓、印度、中南半島、印度尼西亞。

匙葉鼠麴草

Gnaphalium pensylvanicum Willd.

(*Gnaphalium purpureum* auct. non L.:
Check List HK Pl. 1993.)

習性：一年生草本。花期：12—翌年6月。
產地：香港各地。生於路邊、荒地中。
分佈：廣東、廣西、雲南、四川、湖南、江西、浙江、臺灣；熱帶亞洲、美洲南部、非洲南部和大洋洲。

多莖鼠麴草

Gnaphalium polycaulon Pers.

(*Gnaphalium indicum* auct. non L.:
Check List HK Pl. 1993.)

習性：一年生草本。花期：1—4月。
產地：香港各地。生於耕地邊、荒地中。
分佈：廣東、雲南、貴州、福建、浙江。印度、泰國、澳大利亞、熱帶非洲。

田基黃屬 *Grangea* Adans.

田基黃 (荔枝菊) Cutweed

Grangea maderaspatana (L.) Poiret

習性：一年生草本。花期：3—8月。

產地：跑馬地、大潭水塘、大龍、汀角。生於林下，灌叢及荒地中。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南南部、臺灣。亞洲熱帶地區。

三七草屬 *Gynura* Cass.

紫絨草 (紫絨藤) Velvet-Plan

**Gynura aurantiaca* DC.

習性：多年生草本。花期：8—11月。

產地：栽培。

分佈：原產爪哇。

風凰菜 (紅鳳菜、兩色三七草)

**Gynura bicolor* (Roxb. ex Willd.) DC.

習性：多年生草本。花期：1—4月。

產地：栽培。

分佈：海南、廣東、廣西、江西、福建、臺灣。印度、日本。

用途：蔬菜。

白子菜

Gynura divaricata (L.) DC.

習性：多年生草本。花期：10—12月。

產地：香港各地。生於林緣、溪邊。

分佈：中國南部和西南部。印度、中南半島。

用途：藥用。

三七草

**Gynura japonica* (L. f.) Juel [*Gynura segetum* (Lour.) Merr.]

習性：多年生草本。花期：8—10月。

產地：栽培。

分佈：華南、西南、華東。日本、越南。

用途：藥用。

向日葵屬 *Helianthus* L.

向日葵 Sunflower

**Helianthus annuus* L.

習性：一年生草本。花期：6—10月。

產地：栽培。

分佈：原產北美洲。

用途：油料。

菊芋 (菊薯) Girasole

**Helianthus tuberosus* L.

習性：多年生草本。花期：8—9月。

產地：栽培。

分佈：原產北美洲。

用途：塊莖食用。

泥湖菜屬 *Hemistepta* Bunge

泥湖菜

Hemistepta lyrata (Bunge) Bunge

習性：一年生草本。花期：3—8月。

產地：沙田、大埔、粉嶺、西貢。生於路邊、耕地邊、荒地中。

分佈：中國南北各地(新疆、西藏除外)。朝鮮、日本、越南、老撾。

旋覆花屬 *Inula* L.

羊耳菊 (白牛膽) Elecampane

Inula cappa (Buch.-Ham.) DC.

習性：多年生草本。花期：8—12月。

產地：香港各地。生於荒山草坡、灌叢中。

分佈：華南、西南、華東。越南、泰國、緬甸、印度、馬來西亞。

用途：藥用。

苦蕒菜屬 *Ixeris* Cass.

山苦蕒

Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai [*Lactuca chinensis* (Thunb.) Nakai]

習性：多年生草本。花期：4—9月。

產地：香港島、城門水塘、粉嶺、八仙嶺。西貢大浪灣。生於耕地邊、路邊、荒地中。

分佈：中國南北各地。日本、朝鮮、俄羅斯遠東地區。

用途：藥用。

纖細苦蕒菜

†*Ixeris gracilis* Stebb.

習性：多年生草本。花果期：5-9月。

產地：西貢大浪灣。生於耕地邊、荒地中。

分佈：華南、西南、華中及陝西甘肅等省區。

印度、尼泊爾。
用途：藥用。

剪刀股

Ixeris japonica (Burm. f.) Nakai [*Lactuca debilis* (Thunb.) Benth. ex Maxim.; *Ixeris stolonifera* auct. non A. Gray: Check List HK Pl. 1993.]

習性：多年生草本。花期：4—8月。
產地：香港各地。生於耕地邊、路邊，荒地中。
分佈：華南、華東、華中、東北。朝鮮、日本。
用途：藥用。

多頭苦蕒菜

†**Ixeris polycephala** Cass.

習性：一、二年生草本。花期：3—7月。
產地：粉嶺、西貢。生於耕地邊、路邊，荒地中。
分佈：華南、西南、華中、華東。朝鮮、日本、印度。
用途：藥用。

苦蕒菜

Ixeris repens (L.) A. Gray [*Lactuca repens* (L.) Benth. ex Maxim.]

習性：多年生草本。花期：4-10月。
產地：香港各地。生於沙灘。
分佈：華南、華東、華北、東北。日本、朝鮮、俄羅斯遠東地區。

馬蘭屬 *Kalimeris* Cass.

馬蘭 (雞兒腸)

Kalimeris indica (L.) Sch.-Bip.

習性：多年生草本。花期：5—9月。
產地：香港島、大嶼山、新界。生於林緣、山坡草地、路邊。
分佈：華南、西南、華東、華中、東北。朝鮮。
用途：藥用。

萵苣屬 *Lactuca* L.

萵苣 Lettuce

***Lactuca sativa** L.

習性：一年生草本。花期：6—12月。
產地：栽培。
分佈：原產地中海地區。
用途：蔬菜。市上出售的生菜即為本種的一變種(var. *ramosa* Hort.)

單花葵屬 *Lagascea* Cav.

單花葵

***Lagascea mollis** Cass.

習性：多年生草本。花期：4—9月。
產地：青龍頭、沙田、大埔。生於路邊、荒地中。
分佈：原產古巴。
用途：觀賞。

瓶頭草屬 *Lagenophora* Cass.

瓶頭草 (瓶頭菊)

Lagenophora stipitata (Labill.) Druce
(*Lagenophora billardieri* Cass.)

習性：一年生草本。花期：9月。
產地：馬鞍山、大帽山、大東山。生於山坡草地。
分佈：廣東、廣西、雲南、福建、臺灣。印度、中南半島、印度尼西亞、澳大利亞。

六棱菊屬 *Laggera* Sch.-Bip. ex Hochst.

六棱菊

Laggera alata (D. Don) Sch.-Bip ex Oliv.
[*Laggera crispata* (Vahl) Hepper & Wood.]

習性：多年生草本。花期：10月至翌年2月。
產地：香港島、新娘潭。生於山坡草地、耕地邊、水田邊。
分佈：華南、西南、華東。印度、中南半島、馬來西亞、非洲東部。

栓果菊屬 *Launaea* L.

匍莖栓果菊

Launaea sarmentosa (Willd.) Merr.

習性：多年生草本。花期：4—11月。
產地：香港各地。生於沙灘。
分佈：中國南部。印度、埃及和非洲西部。

濱菊屬 *Leucanthemum* Mill.

濱菊 (延命菊)

Leucanthemum vulgare Lam.

習性：多年生草本。花果期：5-10月。
產地：栽培。
分佈：歐洲、北美。中國庭園有栽培。
用途：觀賞。

橐吾屬 *Ligularia* Cass.

大頭橐吾

Ligularia japonica (Thunb.) Less. (*Senecio japonicus* Sch.-Bip.)

習性：多年生草本。花期7—8月。
產地：大東山、鳳凰山。生於山谷疏林下，灌叢中。
分佈：華南、華東、華中。朝鮮、日本、印度。
用途：觀賞。

小舌菊屬 *Microglossa* DC.

小舌菊

Microglossa pyrifolia (Lam.) Kuntze (*Microglossa volubilis* DC.)

習性：亞灌木。花期：2—6月。
產地：大埔、大嶼山。生於林緣、空曠草地中。
分佈：海南、廣東、廣西、雲南、貴州、臺灣。印度、緬甸、中南半島、馬來西亞。

假澤蘭屬 *Mikania* Willd.

薇甘菊 Mile-a-minute weed

**Mikania micrantha* H. B. & K.

習性：多年生草本。花期：6—12月。
產地：香港各地。生於林緣荒地，路邊。
分佈：原產南美洲。現廣佈於熱帶地區。為一有害雜草。

黃瓜菜屬 *Paraixeris* Nakai

黃瓜菜

Paraixeris denticulata (Houtt.) Nakai [*Youngia denticulata* (Houtt.) Kitam.]

習性：二年生草本。花期：4—8月。
產地：香港各地。生於耕地邊、路邊、荒地中。

分佈：中國南北各地。越南、日本、朝鮮、蒙古。

銀膠菊屬 *Parthenium* L.

銀膠菊

†**Parthenium hysterophorus* L.

習性：一年生草本。花期：4—10月。
產地：荃灣。生於荒地中，路邊。
分佈：原產熱帶美洲。

Pectis L.

**Pectis prostata* Cav.

習性：多年生草本。花期：10—11月。
產地：栽培。
分佈：原產熱帶美洲。

瓜葉菊屬 *Pericallis* D. Don

瓜葉菊

Pericallis × *hybrida* B. Nord (*Senecio cineraria* auct. non DC.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：二年生草本。花期：冬季。
產地：栽培。
分佈：由 *Pericallis cruenta* (Masson ex L'Herit.) Bulle 等育成的雜交種，廣泛栽培於世界各地。

帚菊屬 *Pertya* Sch.-Bip.

尖苞帚菊

†*Pertya pungens* Y. C. Tseng

習性：多年生草本。花期：3—5月。
產地：馬鞍山。生於林緣、山坡草叢中。
分佈：廣東。

闊苞菊屬 *Pluchea* Cass.

闊苞菊 Marsh Fleabane

Pluchea indica (L.) Less.

習性：灌木。花期：幾全年。
產地：香港各地。生於海濱沙地。
分佈：中國南部沿海各省區。印度、緬甸、中南半島、馬來西亞。
用途：葉可食。

光梗闊苞菊 (翅煙茜) Winged *Pluchea pteropoda* Hemsl.

習性：亞灌木。花期：5月至翌年1月。
產地：鶴咀。生於海濱石縫中。
分佈：中國南部各省區。中南半島。

假地膽草屬 *Pseudelephantopus*
Rohr

假地膽草

†**Pseudelephantopus spicatus* (Juss. ex
Aublet) Gleason

習性：多年生草本。花期：夏至秋季。
產地：香港各地。生於路邊、荒野草地中。
分佈：廣東、臺灣（歸化）。熱帶美洲和非洲。

翅果菊屬 *Pterocypsela* Shih

翅果菊（山萵苣） Wild Lettuce

Pterocypsela indica (L.) Shih (*Lactuca*
indica L.)

習性：一年生草本。花期：7—11月。
產地：香港各地。生於林緣、荒地中。
分佈：中國南北各地。中南半島、印度、馬來西亞、日本、俄羅斯遠東地區。

多裂翅果菊

†*Pterocypsela laciniata* (Houtt.) Shih

習性：多年生草本。花期：7—10月。
產地：大嶼山。生於林緣、荒地中、路邊。
分佈：中國南北各地。日本、俄羅斯遠東地區。

毛脈翅果菊

†*Pterocypsela raddeana* (Maxim.) Shih

習性：二年生草本。花期：5—9月。
產地：馬鞍山。生於林緣、灌叢中，耕地邊。
分佈：華南、華東、華中、華北、東北。

金光菊屬 *Rudbeckia* L.

黑心金光菊 Black-eyed Susan

†**Rudbeckia hirta* L.

習性：多年生草本。花期：6—9月。
產地：梧桐寨（栽培）。
分佈：原產北美洲。
用途：觀賞。

蛇目菊屬 *Sanvitalia* Lam.

蛇目菊 Trailing *Sanvitalia*

**Sanvitalia procumbens* Lam.

習性：一年生草本。花期：夏至秋季。
產地：栽培。
分佈：原產墨西哥。
用途：觀賞。

風毛菊屬 *Saussurea* DC.

風毛菊

Saussurea japonica (Thunb.) DC.

習性：多年生草本。花期：8—11月。
產地：赤柱、大帽山、大嶼山。生於山坡草地、溝邊。
分佈：華南、華東、華中、東北、西北。朝鮮、日本。

千里光屬 *Senecio* L.

千里光

Senecio scandens Buch.-Ham. ex D. Don

習性：多年生草本。花期：8—12月。
產地：香港各地。生於林緣、路邊灌叢中。
分佈：華南、西南、華中以及陝西甘肅等省區。印度、不丹、尼泊爾、日本、中南半島、菲律賓。
用途：藥用。

閩粵千里光 Staunton's Ragwort

Senecio stauntonii DC.

習性：多年生草本。花期：9—10月。
產地：扯旗山。生於林緣、荒野草地。
分佈：廣東、福建。

豨薟屬 *Siegesbeckia* L.

豨薟 Shrimp Claw Plant

Siegesbeckia orientalis L.

習性：一年生草本。花期：4—10月。
產地：香港各地。生於村旁荒地、路邊。
分佈：華南、西南、華中、華東各省區。廣佈於亞洲、歐洲和熱帶美洲。
用途：藥用。

一枝黃花屬 *Solidago* L.

一枝黃花 Golden-rod

Solidago decurrens Lour. (*Solidago virgo-aurea* auct. non L.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：多年生草本。花期：8—11月。
產地：香港各地。生於林緣、荒野草叢中。
分佈：華南、西南、華中、華東各省區。
用途：藥用。

裸柱菊屬 *Solvia* Ruiz & Pavon

裸柱菊

****Solvia anthemifolia*** (Juss.) R. Br.

習性：一年生草本。花期：3—6月。
產地：鋼線灣、大埔、粉嶺。生於耕地邊、荒地中。
分佈：廣東、福建、江西、臺灣歸化。原產南美洲。

苦苣菜屬 *Sonchus* L.

苣荬菜 Field Sow-Thistle

Sonchus arvensis L.

習性：一年生草本。花期：5—9月。
產地：香港各地。生於荒地中。
分佈：中國南北各地。歐洲也有分佈。
用途：藥用。

苦苣菜 Sow-Thistle

Sonchus oleraceus L.

習性：一年生草本。花期：4—10月。
產地：香港各地。生於荒地中。
分佈：原產歐洲或中亞。廣佈全國各地。
用途：藥用、食用。

金鈕扣屬 *Spilanthes* Jacq.

大花金鈕扣

†***Spilanthes grandiflora*** Turcz.

習性：一年生草本。花期：4—11月。
產地：九龍水塘、城門水塘。生於路邊、荒地中。
分佈：廣佈於熱帶亞熱帶地區。

金鈕扣 Gold Button

Spilanthes paniculata Wall. ex DC. (*Spilanthes acmella* auct. non L.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：一年生草本。花期：4—11月。

產地：香港各地。生於村旁荒地、路邊。
分佈：廣東、廣西、雲南、福建、臺灣。廣佈于南亞、東南亞和馬來西亞各地。

琉璃菊屬 *Stokesia* L'Herit.

琉璃菊 Stokes Aster

****Stokesia cynaea*** L'Herit.

習性：多年生草本。花期：5-7月。
產地：栽培。
分佈：原產北美洲。
用途：觀賞。

金腰箭屬 *Synedrella* Gaertn.

金腰箭 *Synedrella*

****Synedrella nodiflora*** (L.) Gaertn.

習性：一年生草本。花期：6—1月。
產地：香港各地。生於村旁荒地、路邊。
分佈：原產美洲，現廣佈於全世界熱帶和亞熱帶地區。

萬壽菊屬 *Tagetes* L.

萬壽菊 Big Marigold

****Tagetes erecta*** L.

習性：一年生草本。花期：7—10月。
產地：公園栽培。
分佈：原產墨西哥。
用途：觀賞。

孔雀草 French Marigold

****Tagetes patula*** L.

習性：一年生草本。花期：7—10月。
產地：公園栽培。
分佈：原產墨西哥。
用途：觀賞。

細葉萬壽菊

†****Tagetes tenuifolia*** Cav.

習性：一年生草本。花期：7—11月。
產地：栽培。
分佈：原產墨西哥。
用途：觀賞。

蒲公英屬 *Taraxacum* Weber ex Wigg.

蒲公英 Mongolian Dandelion

Taraxacum mongolicum Hand.-Mazz.

習性：多年生草本。花期：4—11月。
產地：大帽山、歌賦山。生於路邊、草地中。
分佈：中國南北各地。廣佈於亞洲。
用途：藥用。

歧傘菊屬 *Thespis* DC.

歧傘菊

†**Thespis divaricata** DC.

習性：一年生草本。花期：4—10月。
產地：沙田。生於牆邊濕潤處。
分佈：廣東、雲南。印度、錫金、不丹、柬埔寨。

腫柄菊屬 *Tithonia* Desf. ex Juss.

腫柄菊 Mexican Sunflower

***Tithonia diversifolia** A. Gray

習性：多年生草本。花期：7—11月。
產地：栽培。
分佈：廣東、廣西、雲南、福建均有栽培。
原產墨西哥。
用途：綠肥、觀賞。

羽芒菊屬 *Tridax* L.

羽芒菊 *Tridax*

Tridax procumbens L.

習性：多年生草本。花期：11月至翌年4月。
產地：香港各地。生於荒地中。
分佈：中國東南沿海各地。亞洲和美洲熱帶地區。

斑鳩菊屬 *Vernonia* Schreb.

夜香牛 Iron-weed

Vernonia cinerea (L.) Less.

習性：一年生草本。花期：幾全年。
產地：香港各地。
分佈：華南、西南、中南、華東各省區。日本、印度、中南半島、馬來西亞、非洲。
用途：藥用。

毒根斑鳩菊

Vernonia cumingiana Benth. (*Vernonia andersoni* auct. non Clarke: Check List

HK Pl. 1993.)

習性：攀援灌木。花期：10月至翌年4月。
產地：鶴咀、黃泥涌、南風道。生於林緣、溪邊和灌叢中。
分佈：海南、廣東、廣西、雲南、四川、福建、臺灣。泰國、中南半島。
用途：藥用。

臺灣斑鳩菊

†**Vernonia gratiosa** Hance

習性：攀援灌木。花期：8月至翌年4月。
產地：大帽山。生於林緣和疏林中。
分佈：福建、臺灣。

海濱斑鳩菊

†**Vernonia maritima** Merr.

習性：亞灌木。花期：6—10月。
產地：大嶼山、長洲。生於荒野草地。
分佈：臺灣。菲律賓。

鹹蝦花 Iron-weed

Vernonia patula (Dryand.) Merr.

習性：一年生草本。花期：幾全年。
產地：香港各地。生於荒地中。
分佈：海南、廣東、廣西、雲南、貴州、福建、臺灣。印度、中南半島、馬來西亞。
用途：藥用。

柳葉斑鳩菊 Willow-leaved Iron-weed

Vernonia saligna (Wall.) DC.

習性：多年生草本。花期：9月至翌年2月。
產地：柏架山、大帽山、大嶼山。生於疏林下和灌叢中。
分佈：廣東、廣西、雲南、貴州、福建。印度、尼泊爾、緬甸、泰國、越南。
用途：藥用。

茄葉斑鳩菊 (斑鳩菊) Large-leaved Iron-weed

Vernonia solanifolia Benth.

習性：灌木或小喬木。花期：10月至翌年4月。
產地：香港各地。生於山谷林中。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、福建。印度、緬甸、中南半島。

用途：藥用。

蟛蜞菊屬 *Wedelia* Jacq.

孳花蟛蜞菊

***Wedelia biflora* (L.) DC.** [*Melanthera biflora* (L.) Wild]

習性：多年生草本。花期：幾全年。

產地：香港各地。生於海濱沙灘。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、福建、臺灣。廣佈于東亞、南亞、馬來西亞、大洋洲。

蟛蜞菊 *Wedelia*

***Wedelia chinensis* (Osbeck) Merr.**

習性：多年生草本。花期：3—9月。

產地：香港各地。生於水田邊、溝邊濕潤處。

分佈：中國南部、東部和東北部。廣佈于東亞、南亞和馬來西亞。

鹵地菊 *Beach Wedelia*

***Wedelia prostrata* (Hook. & Arn.) Hemsl.**

習性：一年生草本。花期：6—10月。

產地：石澳、鹹田、西貢大浪灣。生於海濱沙地。

分佈：廣東、廣西、福建、浙江、江蘇、臺灣。印度、越南、菲律賓、日本、朝鮮。

三裂葉蟛蜞菊

****Wedelia trilobata* (L.) Hitch.**

習性：多年生草本。花期：幾全年。

產地：栽培。

分佈：原產熱帶美洲。現已成為惡性雜草。

山蟛蜞菊

***Wedelia wallichii* Less.**

習性：多年生草本。花期 4—10 月。

產地：城門（針山）。生於林緣草地。

分佈：中國南部、西南部各省。印度、中南半島。

蒼耳屬 *Xanthium* L.

蒼耳 *Cocklebur*

***Xanthium sibiricum* Patr. ex Widder**

習性：一年生草本。花期：7—9月。

產地：香港各地。生於村邊荒地、路邊。

分佈：中國南北各地。

用途：種子可榨油供工業用。

黃鵪菜屬 *Youngia* Cass.

異葉黃鵪菜

†*Youngia heterophylla* (Hemsl.) Babcock & Stebbins

習性：一年生草本。花期：3-5月。

產地：梧桐寨。生於林緣和荒地中。

分佈：雲南、四川、貴州、湖南湖北、江西、陝西。

黃鵪菜 *Hawk's Beard*

***Youngia japonica* (L.) DC.**

習性：一年生草本。花期：3-5月。

產地：香港各地。生於路邊、荒地中。

分佈：中國南北各地。東亞、南亞、中南半島。

百日菊屬 *Zinnia* L.

百日菊（魚尾菊） *Zinnia*

****Zinnia violacea* Cav. (*Zinnia elegans* Jacq.)**

習性：一年生草本。花期：7—10月。

產地：公園栽培。

分佈：原產墨西哥。

用途：觀賞。