

B · 百合亞綱 Liliidae

325. 黃花絨葉草科

Limnocharitaceae

黃花絨葉草屬 *Limnocharis Bonpl.

黃花絨葉草 Yellow velvetleaf

**Limnocharis flava* (L.) Buch.

習性：水生草本。

產地：沙田。

分佈：原產熱帶美洲。

用途：食用、飼料。

326. 澤瀉科 Alismataceae

澤瀉屬 *Alisma* L.

澤瀉 *Plantago-aquatica*

†**Alisma plantago-aquatica* L.

習性：水生草本。花果期：5-10 月。

產地：沙田。

分佈：東北至西北、雲南。北溫帶廣佈。

用途：觀賞。

慈姑屬 *Sagittaria* L.

冠果草 Cockscomb fruit arrowhead

Sagittaria guyanensis subsp. *lappula* (D. Don)

Bojin [*Lophotocarpus guyanensis* (H. B. & K.) Smith]

習性：水生草本。花果期：5-11 月。

產地：沙田、粉嶺、大嶼山。生於水塘、水田、沼澤。

分佈：中國西南部至東南部。南亞、東南亞及非洲熱帶地區。

慈姑 Chinese Arrow head

Sagittaria sagittifolia subsp. *leucopetala*

(Miq.) Hartog [*Sagittaria trifolia* L.; *Sagittaria trifolia* var. *sinense* (Sims.) Makino]

習性：水生草本。花、果期：5-10 月。

產地：栽培。生於池塘、水田、沼澤。

分佈：我國南北各地及亞洲廣佈。

用途：食用。

327. 水鼈科

Hydrocharitaceae

水篩屬 *Blyxa* Noronha

無尾水篩 Aubert's *Blyxa*

Blyxa aubertii Rich. [*Blyxa octandra* auct. non (Roxb.) Planch ex Thwaites: Check List HK Pl. 1993.]

習性：沉水草本。花果期：5-9 月。

產地：觀塘、西徑、大澳。生於水田、水溝中。

分佈：四川、廣西、海南、廣東、湖南、江西、浙江、臺灣。馬達加斯加、印度、馬來西亞、澳大利亞。

水篩 Japanese *Blyxa*

Blyxa japonica (Miq.) Maxim. ex Asch. & Gürke

習性：沉水草本。花果期：5-10 月。

產地：新界八鄉。生於水田、池塘、河涌。
分佈：東北、華東、華中、華南至四川。印度、孟加拉、馬來西亞、朝鮮、日本、歐洲。

喜鹽草屬 *Halophila* Thou.

貝克喜鹽草 Becar's *Halophila*

Halophila becarii Asch.

習性：海生草本。花期：5 月。

產地：大潭灣、上白泥、下白泥、大蠔灣。
分佈：海南、廣東、臺灣。熱帶亞洲。

喜鹽草 Oval *Halophila*

Halophila ovalis (R. Br.) Hook. f. (*Halophila ovata* auct. non Gaudich.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：海生草本。花期：11-12 月。

產地：大潭灣、蠔涌、烏石角(沙頭角海)、東涌碼頭。生於淺海灘上。
分佈：海南、廣東、臺灣。紅海、印度洋、西太平洋沿海。

黑藻屬 *Hydrilla* Rich.

黑藻 Water-weed

**Hydrilla verticillata* (L. f.) Royle

習性：沉水草本。花果期：5-10月。

產地：栽培。生於淡水中。

分佈：全國大部分地區。歐亞大陸廣佈。

水車前屬 *Ottelia* Pers.

水車前 Water plantain

Ottelia alismoides (L.) Pers.

習性：沉水草本。花期：4-10月。

產地：大埔、粉嶺、大嶼山。生於水田、水塘或溪溝旁。

分佈：南北均有。非洲、亞洲及大洋洲。

用途：飼料。

苦草屬 *Vallisneria* L.

苦草 Eel Grass

Vallisneria natans (Lour.) Hara (*Vallisneria spiralis* auct. non L.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：沉水草本。

產地：蠔涌。生於溪溝、池塘中。

分佈：南北均有。亞洲熱帶、亞熱帶地區、澳大利亞。

328. 水蘊科

Aponogetonaceae

水蘊屬 *Aponogeton* L. f.

水蘊 Pond weed

Aponogeton lakhonensis A. Camus
[*Aponogeton natans* auct. non (L.) Engl. & Krause: Check List HK Pl. 1993.]

習性：水生草本。花期：4-10月。

產地：荃灣。生於水塘、溪溝、水田。

分佈：海南、廣西、廣東、江西、福建、浙江。印度、泰國、中南半島、馬來西

亞。

331. 眼子菜科

Potamogetonaceae

眼子菜屬 *Potamogeton* L.

小眼子菜 Baby Pondweed

†*Potamogeton pusillus* L.

習性：沉水草本。花、果期：5-10月。

產地：米埔。生於池塘、沼澤地。

分佈：南北各省區均有分佈。北半球溫帶廣佈。

332. 川蔓藻科 *Ruppiaceae*

川蔓藻屬 *Ruppia* L.

川蔓藻 Widgeon grass

Ruppia maritima L.

習性：沉水草本。花、果期：4-6月。

產地：石澳。生於海邊鹽沼地。

分佈：海南、廣東、浙江、臺灣。世界溫帶及亞熱帶海域及鹽湖。

333. 茨藻科 *Najadaceae*

茨藻屬 *Najas* L.

小茨藻

Najas minor All.

習性：沉水草本。

產地：西貢。生於淡水池塘中。

分佈：華南、西北、華北及雲南等省區。歐洲南部。

337. 大葉藻科 *Zosteraceae*

大葉藻屬 *Zostera* L.

矮大葉藻 Dwarf Eel grass

Zostera japonica Asch. & Graebn. (*Zostera nana* Auct. non Roth: Check List HK Pl. 1993.)

習性：沉水草本。花、果期：6-9月。

產地：相思灣、東涌碼頭、荔枝窩。生於海水中。

分佈：山東、河北、遼寧沿海。日本、俄羅

斯沿海。

339. 霉草科 Triuridaceae

喜蔭草屬 *Sciaphila* Blume

大柱霉草 *Large stylus Sciaphila*

†*Sciaphila megastyla* Fukuyama & Suzuki

習性：腐生草本。花、果期：8月。

產地：大帽山、馬鞍山。生於林下枯枝落葉層。

分佈：臺灣。

多枝霉草 *Multi-branched Sciaphila*

†*Sciaphila ramosa* Fukuyama & Suzuki

習性：腐生草本。花、果期：8月。

產地：大帽山。生於林下枯枝落葉層。

分佈：臺灣。

340. 棕櫚科 *Areaceae* (*Palmae*)

棕葵屬 *Acoelorrhaphe* H. Wendl.

棕葵 *Everglades palm*

**Acoelorrhaphe wrightii* (Griseb. & H. Wendl.) H. Wendl. ex Becc. [*Paurotis wrightii* (Griseb. & H. Wendl.) Britt.]

習性：灌木狀。

產地：栽培。

分佈：原產中美洲。

用途：觀賞。

假檳榔屬 *Archontophoenix* H. Wendl.

假檳榔 *Alexandra palm*

**Archontophoenix alexandrae* (F. Muell.) H. Wendl. & Drude

習性：喬木。

產地：香港各地。栽培。

分佈：雲南、廣西、海南、廣東、福建、臺灣有栽培。原產澳大利亞，現各熱帶地區常見栽培。

用途：觀賞。

桃榔屬 *Arenga* Labill.

山棕 (白欖王) *Arenga palm*

**Arenga englerii* Becc.

習性：喬木。花期：5-6月；果期：10-12月。

產地：栽培。

分佈：雲南、廣東、福建、臺灣有栽培。日本。

桃榔 *Gomuti sugar palm*

**Arenga pinnata* (Wurmb.) Merr.

習性：喬木。花期：6月；果期：花後2-3年。

產地：栽培。

分佈：雲南、廣西、海南、廣東。亞洲東南部。

用途：觀賞。

省藤屬 *Calamus* L.

大白藤 *Faber Rattan palm*

†*Calamus faberii* Becc.

習性：藤本。果期：春季。

產地：寶雲道。

分佈：海南。越南。

用途：編織。

澤生藤 (省藤) *Rattan palm*

Calamus palustris Griff. (*Calamus latifolius* auct. non Roxb.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：藤本。花期：4-5月。

產地：跑馬地、灣仔峽。生於林中。

分佈：雲南、廣西。印度、緬甸、泰國。

白藤 *Fourfinger Rattan palm*

Calamus tetradactylus Hance

習性：藤本。花、果期：5-6月。

產地：香港各地。生於林中。

分佈：廣西、海南、廣東、福建。越南。

用途：編織藤器。

毛鱗省藤 *Hairy scale Rattan palm*

Calamus thysanolepis Hance

習性：藤本。花期：6-7月；果期：9-10月。
產地：香港仔、大帽山。生於林中。
分佈：廣東、福建、江西、浙江。

多果省藤 Many fruit Rattan palm

Calamus walkerii Hance

習性：藤本。果期：7月。
產地：跑馬地、柏架山。生於林中。
分佈：海南、廣東。

魚尾葵屬 *Caryota* L.

短穗魚尾葵 (小魚尾葵) Small fishtail palm

**Caryota mitis* Lour.

習性：小喬木。花期：4-6月；果期：8-11月。
產地：栽培。
分佈：海南、廣西。印度、緬甸、越南、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓。
用途：觀賞，莖髓含澱粉、可食用。

魚尾葵 Fishtail palm

**Caryota ochlandra* Hance

習性：喬木。花期：5-7月；果期：8-11月。
產地：栽培。
分佈：雲南、廣西、海南、廣東、福建。
用途：觀賞。

董棕 Wine palm

**Caryota urens* L.

習性：喬木。花期：6-10月；果期：5-10月。
產地：栽培。
分佈：廣西、雲南。印度、緬甸、中南半島。
用途：觀賞。

散尾葵屬 *Chrysalidocarpus* H. Wendl.

散尾葵

**Chrysalidocarpus lutescens* H. Wendl.

習性：灌木。花期：5月；果期：8月。
產地：栽培。
分佈：華南各地有引種。原產馬達加斯加。

用途：觀賞。

椰子屬 *Cocos* L.

椰子 Coconut palm

**Cocos nucifera* L.

習性：喬木。花、果期：秋季。
產地：栽培。
分佈：雲南、海南、廣東、臺灣。
用途：觀賞、食用。

黃藤屬 *Daemonorops* Blume

黃藤 (真白藤) Rattan palm

Daemonorops margaritae (Hance) Becc.

習性：藤本。花期：5月；果期：6-10月。
產地：扯旗山、大埔、黃泥涌。生於林中。
分佈：海南、廣西、廣東。

酒瓶椰子屬 *Hyophorbe* Gaertn.

酒瓶椰子 Bottle palm

**Hyophorbe lagenicaulis* (L. Bailey) H. Moore (*Mascarena lagenicaulis* L. Bailey)

習性：喬木。
產地：栽培。
分佈：海南、廣東有引種。原產馬斯克林群島。
用途：觀賞。

軸欖屬 *Licuala* Thunb.

穗花軸欖

Licuala fordiana Becc.

習性：灌木。花期：5月。
產地：柏架山、香港仔、動植物公園。生於林中。
分佈：海南、廣東。

蒲葵屬 *Livistona* R. Br.

蒲葵

**Livistona chinensis* (Jacq.) R. Br.

習性：喬木。花、果期：4月。
產地：栽培。
分佈：華南、中南半島。
用途：觀賞、編織。

刺葵屬 *Phoenix* L.

加那利刺葵 *Cannary date palm*

**Phoenix canariensis* Chabaud

習性：喬木。花期：9月。

產地：栽培。

分佈：原產加那利群島。

用途：觀賞。

海棗（棗椰樹） *Date palm*

**Phoenix dactylifera* L.

習性：喬木。花期：3-4月；果期：9-10月。

產地：栽培。

分佈：雲南、廣西、廣東、福建。原產西亞和北非。

用途：食用（果）、觀賞。

刺葵 *Spinny date palm*

Phoenix hanceana Naud.

習性：喬木。花期：4-5月；果期：6-10月。

產地：香港各地。

分佈：雲南、廣西、海南、廣東、臺灣。

用途：觀賞。

軟葉刺葵（日本葵） *Dwarf date palm*

**Phoenix roebelenii* O'Brien

習性：小喬木。花期：4-5月；果期：6-9月。

產地：栽培。

分佈：雲南、廣西和廣東等省區有引種。緬甸、越南、印度。

用途：觀賞。

齒葉葵屬 *Ptychosperma* Labill.

齒葉葵（麥氏葵） *Hurricane palm*

**Ptychosperma macarthuri* Nichols.

習性：喬木。

產地：栽培。

分佈：原產新幾內亞。

用途：觀賞。

棕竹屬 *Raphis* L. f. ex Ait.

棕竹 *Lady palm*

Raphis excelsa (Thunb.) Henry ex Rehd.

習性：灌木。花期：6-9月。

產地：香港島、大帽山、梧桐寨、南丫島等地。野生，亦有栽培。

分佈：中國西南部至南部。日本。

用途：觀賞。

細棕竹 *Slender palm*

**Raphis gracilis* Burret

習性：灌木。花期：7-8月。

產地：粉嶺、動植物公園。

分佈：廣西、海南、廣東。

用途：觀賞。

王棕屬 *Roystonea* O. F. Cook

萊王棕（南美王棕） *South American Royal palm*

**Roystonea oleracea* (Jacq.) O. F. Cook

習性：喬木。

產地：栽培。

分佈：華南熱帶地區有引種。原產熱帶美洲。

用途：觀賞、莖嫩心可食用。

王棕 *Royal palm*

**Roystonea regia* (Kunth) O. F. Cook

習性：喬木。花期：3-4月；果期：10月。

產地：栽培。

分佈：華南熱帶地區有栽培。原產古巴。

用途：觀賞。

金山葵屬 *Syagrus* Mart.

金山葵（皇后葵） *Queen palm*

**Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassm.

[*Arecastrum romanzoffianum* (Cham.) Becc.]

習性：喬木。花期：2月；果期：11月。

產地：栽培。

分佈：中國南部有栽培。原產巴西。

用途：觀賞。

棕櫚屬 *Trachycarpus* H. Wendl.

棕櫚 *Windmill palm*

***Trachycarpus fortunei** (Hook.) H. Wendl.
習性：喬木。花期：4月；果期：12月。
產地：栽培。
分佈：長江以南各省區。日本。
用途：纖維、觀賞。

絲葵屬 *Washingtonia* H. Wendl.

大絲葵（華盛頓葵） Maxican fan palm

***Washingtonia robusta** H. Wendl.

習性：喬木。
產地：栽培。
分佈：華南有引種。原產墨西哥。
用途：觀賞。

342. 露兜樹科 Pandanaceae

露兜樹屬 *Pandanus* Parkins.

簕古子（露兜簕） False pineapple

Pandanus forceps Mart.

習性：灌木或小喬木。花期：5-6月。
產地：大潭、大帽山。生於海邊、林中或栽培。
分佈：海南、廣東。越南。
用途：綠籬。

分叉露兜（簕角） Furcate screwpine

Pandanus furcatus Roxb.

習性：喬木。花期：8月。
產地：香港島、大帽山、大嶼山。生於林中溝邊或栽培。
分佈：西藏、雲南、廣西、廣東。錫金至中南半島。
用途：綠籬。

花葉露兜

***Pandanus sanderii** Hort. Sand.

習性：喬木。花期：6月。
產地：栽培。
分佈：原產馬魯古群島、波利尼西亞。
用途：觀賞。

露兜樹 *Pandanus*

Pandanus tectorius Sol. (*Pandanus remotus* H. John)

習性：灌木或小喬木。花期：1-5月。
產地：香港各地。生於海邊沙地或栽培。
分佈：雲南、貴州、廣西、海南、廣東、福建、臺灣。熱帶亞洲至澳大利亞。
用途：編織、藥用、綠籬。

馬達加斯加露兜 Common screwpine

***Pandanus utilis** Bory

習性：喬木。花期：7月。
產地：栽培。
分佈：原產馬達加斯加，現熱帶地區常見栽培。

343. 菖蒲科 Acoraceae

菖蒲屬 *Acorus* L.

金錢蒲 Grass-leaf sweet flag

Acorus gramineus Soland.

習性：多年生草本。花期：5-6月；果期：7-8月。
產地：大帽山、大埔滘、下坑。生於水旁濕地或石上。
分佈：浙江、江西、湖北、湖南、廣東、廣西、陝西、甘肅、四川、貴州、雲南、西藏。
用途：根莖入藥。

石菖蒲

†**Acorus tatarinowii** Schott

習性：多年生草本。花果期2-6月。
產地：淺水灣、深水灣、大埔、下坑。常見於密林下，生長於濕地或溪旁石上。
分佈：黃河以南各省區。印度東北部至泰國北部。
用途：根莖入藥。

344. 天南星科 Araceae

廣東萬年青屬 *Aglaonema* Schott

廣東萬年青 Chinese evergreen

***Aglaonema modestum** Schott ex Engl.

習性：多年生草本。花期：5月；果期：10-11月。

產地：栽培。

分佈：廣東、廣西、雲南。越南、菲律賓。

用途：全株入藥。

海芋屬 *Alocasia* (Schott) G. Don

尖尾芋 Chinese Taro

Alocasia cucullata (Lour.) Schott

習性：多年生直立草本。花期：5月。

產地：跑馬地、扯旗山、沙田、大網仔、西徑、南涌、鹿頸等地。生於溪旁濕地或田邊，有些地方栽培於庭院或藥圃。

分佈：浙江、福建、廣西、廣東、四川、貴州、雲南。孟加拉、斯里蘭卡、緬甸、泰國。

用途：藥用。

海芋 Giant *Alocasia*

Alocasia macrorrhiza (L.) Schott

習性：多年生草本。

產地：香港各地。常生長於熱帶雨林林緣或河谷野芭蕉林下。

分佈：江西、福建、臺灣、湖南、廣東、廣西、四川、貴州、雲南。孟加拉、印度馬來半島、中南半島、菲律賓、印度尼西亞。

用途：藥用；觀賞。

魔芋屬 ***Amorphophallus*** Blume ex Decne.

南蛇棒 (鄧氏蒟蒻) Dunn's *Amorphophallus*

Amorphophallus dunnii Tutcher

習性：多年生草本。花期：3-4月；果期：7-8月。

產地：柏架山、梧桐寨、大嶼山。生於林下。

分佈：湖南、廣東、廣西、海南、雲南。

野魔芋 (鞋棒芋) Snake Aroid

Amorphophallus variabilis Blume

習性：多年生草本。花期：7月。

產地：扯旗山、城門、大帽山、大嶼山。生

於疏林下陰濕處。

分佈：江西、福建、廣東。印度尼西亞、菲律賓。

花燭屬 *Anthurium* Schott

花燭 Flamingo-lily, Oilcloth-flower

****Anthurium andraeanum*** Linden

習性：草本。

產地：栽培。

分佈：熱帶美洲。

用途：觀賞。

水晶花燭 Crystal *Anthurium*

****Anthurium crystallinum*** Linden & André

習性：草本。

產地：栽培。

分佈：熱帶美洲。

用途：觀賞。

火鶴花 Flamingo Flower

†****Anthurium scherzerianum*** Schott

習性：草本。

產地：栽培。

分佈：原產中美洲。

用途：觀賞。

天南星屬 *Arisaema* Mart.

心簷南星

Arisaema cordatum N. E. Br.

習性：纖弱草本。花期：4月。

產地：大帽山、大東山。

分佈：廣東、廣西。

一把傘南星 Dragon Arum

Arisaema erubescens (Wall.) Schott
(*Arisaema consanguineum* Schott)

習性：直立草本。

產地：大東山、鳳凰山。生於林下、灌叢、草坡、荒地。

分佈：內蒙古、黑龍江、吉林、遼寧、山東、江蘇、新疆。印度、尼泊爾、錫金、緬甸、泰國。

用途：藥用。

異葉天南星

Arisaema heterophyllum Blume

習性：直立草本。花期：4-5 月；果期：7-9 月。

產地：大東山。生於林下、灌叢或草地。

分佈：除西北、西藏外、大部分省區都有分佈。日本、朝鮮。

用途：藥用。

畫筆南星 *Brush Arisaema*

Arisaema penicillatum N. E. Br.

習性：多年生草本。花果期：4—6 月。

產地：扯旗山、馬鞍山、青山。生於密林中。

分佈：廣東、廣西、雲南。

五彩芋屬 *Caladium* Vent.

五彩芋 *Common Caladium*

***Caladium bicolor** (Aiton) Vent.

習性：草本。花期：4 月。

產地：栽培。

分佈：廣東、福建、雲南、臺灣有栽培。原產南美洲亞馬遜河流域。

用途：藥用。觀賞。

芋屬 *Colocasia* Schott

芋 *Taro*

Colocasia esculenta (L.) Schott (*Colocasia antiquorum* Schott)

習性：草本。

產地：栽培或野生。

分佈：長江流域以南各省區。熱帶地區廣為栽培。

用途：食用。

花葉萬年青屬 *Dieffenbachia* Schott

花葉萬年青 *Dieffenbachia*

***Dieffenbachia sequine** (Jacq.) Schott (*Dieffenbachia picta* Schott)

習性：亞灌木狀草本。

產地：栽培。

分佈：南美洲。

用途：觀賞。

麒麟葉屬 *Epipremnum* Schott

麒麟葉 *Centipede Tongavine, Golden Pothos*

***Epipremnum pinnatum** (L.) Engl. [*Epipremnum aureum* (Linden & Andre) Bunting]

習性：藤本。花期：4-5 月。

產地：新界。生於熱帶雨林的大樹上或岩壁上。

分佈：廣東、廣西、雲南、臺灣、福建。印度、馬來半島、菲律賓、太平洋諸島均有分佈。

用途：藥用、觀賞。

刺芋屬 *Lasia* Lour.

刺芋 *Lasia, Spring Taro*

***Lasia spinosa** (L.) Thwaites

習性：常綠草本。花期：9 月；果期：2 月。

產地：栽培。

分佈：雲南、廣西、廣東、臺灣。錫金、孟加拉、印度、緬甸、泰國、中南半島、馬來西亞。

用途：蔬食、藥用。

龜背竹屬 *Monstera* Adans.

龜背竹 *Ceriman*

***Monstera deliciosa** Liebm. ex Endl.

習性：攀援灌木。花期：8-9 月。

產地：栽培。

分佈：福建、廣東、雲南各地廣為栽培。原產墨西哥。

用途：觀賞、食用。

喜林芋屬（喜樹蕉屬）

Philodendron Schott

裂葉喜樹蕉 *Philodendron*

***Philodendron bipinnatifidum** Schott ex Endl.

習性：攀援草本。

產地：栽培。
分佈：熱帶美洲。
用途：觀賞。

心葉喜樹蕉 Hearted Leaved Philodendron

***Philodendron cordatum** (Vell.) Kunth

習性：攀援草本。
產地：栽培。
分佈：熱帶美洲。
用途：觀賞。

琴葉喜樹蕉 Philodendron

***Philodendron panduraeforme** Kunth

習性：攀援草本。
產地：栽培。
分佈：熱帶美洲。
用途：觀賞。

鱗葉喜樹蕉 Philodendron

***Philodendron squamiferum** Poepp. & Endl.

習性：攀援草本。
產地：栽培。
分佈：熱帶美洲。
用途：觀賞。

半夏屬 *Pinellia* Tenore

半夏 *Pinellia*

†**Pinellia ternata** (Thunb.) Makino

習性：直立草本。花期：5-7月；果期：8月。
產地：紫羅蘭山。常見於草坡、荒地、玉米地、田邊或疏林下。
分佈：除內蒙古、新疆、西藏、青海之外，全國各地廣佈。朝鮮日本也有。
用途：藥用。

狹葉半夏 Ternate pinellia

†**Pinella ternata** f. **angustata** (Schott) Makino

習性：直立草本。
產地：大嶼山。

大漂屬 *Pistia* L.

大漂 Water lettuce

Pistia stratiotes L.

習性：水生草本、漂浮。花期：5-11月。
產地：沙田、西貢。喜高溫多雨的環境，適宜於在平靜的淡水池塘、溝渠中生長。
分佈：福建、廣東、廣西、臺灣、雲南、湖南、湖北、江蘇、浙江、安徽、山東、四川。熱帶及亞熱帶地區廣佈。
用途：可作豬飼料；藥用。

石柑屬 *Pothos* L.

石柑 Rock Vine

Pothos chinensis (Raf.) Merr.

習性：附生藤本。花果期：四季。
產地：香港各地。生於陰濕密林中，常匍匐於岩石上或附生於樹幹上。
分佈：廣東、廣西、貴州、雲南、四川、臺灣。越南、老撾、泰國。
用途：藥用。觀賞。

崖角藤屬 *Rhaphidophora* Hassk.

獅子尾 (崖角藤) Hongkong Taro-vine

Rhaphidophora hongkongensis Schott

習性：附生藤本。花期：4—8月；果於翌年成熟。
產地：香港島、大帽山、梧桐寨、馬鞍山、新娘潭、青山、大嶼山等地。常攀附於熱帶溝谷雨林內的樹幹上或石岩上。
分佈：福建、廣東、廣西、貴州、雲南。緬甸、老撾、越南、泰國、加里曼丹島。
用途：全株藥用。

白鶴芋屬 *Spathiphyllum* Schott

白鶴芋 Snow flower

†***Spathiphyllum floribundum** (Linden & André) N. E. Br.

習性：草本。
產地：栽培。
分佈：原產南美洲，現熱帶地區常見栽培。
用途：觀賞。

合果芋屬 *Syngonium* Schott

長耳合果芋 *Syngonium*

**Syngonium auritum* (L.) Schott

習性：草本。

產地：栽培。

分佈：熱帶美洲。

用途：觀賞。

合果芋 African Evergreen

**Syngonium podophyllum* Schott

習性：草本。

產地：栽培。

分佈：墨西哥。

用途：觀賞。

犁頭尖屬 *Typhonium* Schott

犁頭尖 *Divaricate Typhonium*

Typhonium blumei Nicols. & Sivadasan

[*Typhonium divaricatum* (L.) Decne.]

習性：草本。花期：5-7 月。

產地：馬已仙峽、薄扶林。

分佈：浙江、江西、福建、湖南、廣東、廣西、四川、雲南。印度、緬甸、泰國至印度尼西亞、帝汶島、日本。

用途：藥用。

鞭笞犁頭尖 *Flagelliforme Typhonium*

†**Typhonium flagelliforme* (Lodd.) Blume

習性：多年生草本。花期：4-5 月。

產地：栽培。

分佈：廣東、廣西、雲南。孟加拉、印度、斯里蘭卡、緬甸、中南半島、馬來半島、印度尼西亞、帝汶島、菲律賓。

用途：藥用。

馬蹄犁頭尖 *Trilobe Typhonium*

†**Typhonium trilobatum* (L.) Schott

習性：多年生草本。花期：5-7 月。

產地：栽培。

分佈：廣東、廣西、雲南。孟加拉、斯里蘭卡、緬甸、越南、泰國、老撾、柬埔寨

寮、馬來西亞、新加坡、印度尼西亞。

用途：藥用。

馬蹄蓮屬 *Zantedeschia* Engl.

馬蹄蓮 *Calla lily*

**Zantedeschia aethiopica* (L.) Spreng

習性：多年生草本。花期：2-3 月；果期：8-9 月。

產地：栽培。

分佈：熱帶地區常引種栽培。非洲東北部及南部。

用途：觀賞。

345. 浮萍科 *Lemnaceae*

浮萍屬 *Lemna* L.

青萍 *Lesser Duck-weed*

Lemna minor L.

習性：浮水小草本。

產地：新界。生於水塘或水田。

分佈：全世界廣佈。

用途：飼料、藥用。

紫萍屬 *Spirodela* Schleiden

紫萍(浮萍) *Greater duck-weed*

Spirodela polyrrhiza (L.) Schleiden

習性：浮水小草本。

產地：新界。生於水田或水溝中。

分佈：中國各地。全世界溫帶至熱帶地區。

用途：飼料、藥用。

微萍屬 *Wolffia* Horkel ex Schleid.

微萍 *Rootless wolffia*

Wolffia arrhiza (L.) Wimm.

習性：浮水小草本。

產地：新界。生於靜水水面。

分佈：中國東南部。全世界熱帶及溫帶地區。

用途：飼料。

347. 黃眼草科 *Xyridaceae*

黃眼草屬 *Xyris* L.

黃穀精 *Chinese onion grass*

Xyris capensis var. *schoenoides* (Mart.)

Nilsson (*Xyris bancana* auct. non Miq.:

Check List HK Pl. 1993.)

習性：草本。花期：7-11 月。

產地：飛鵝山、城門、大欖涌。生於濕地。

分佈：海南。

黃眼草 Yellow eye grass

Xyris indica L.

習性：草本。花期：10 月。

產地：粉嶺。生於濕地上。

分佈：中國南部。中南半島、馬來半島、印度尼西亞、菲律賓、澳大利亞。

葱草 Onion grass

Xyris pauciflora Willd.

習性：草本。花期：10-11 月。

產地：爛泥灣、大埔、粉嶺、上水、大嶼山。

分佈：中國東南部至南部。熱帶亞洲、澳大利亞。

349. 鴨跖草科

Commelinaceae

鞘苞花屬 *Amischophacelus* R. Rao & Kamm.

鞘苞花 Common *Amischophacelus*

Amischophacelus axillaris (L.) R. Rao & Kamm. [*Cyanotis axillaris* (L.) Roem. & Schult.]

習性：草本。花期：春、秋季。

產地：大坳門。生於濕潤砂地上。

分佈：海南。熱帶亞洲。

穿鞘花屬 *Amischotholype* Hassk.

穿鞘花 Hispid *Amischotholype*

Amischotholype hispida (Less. & A. Rich.) Hong (*Forrestia chinensis* N. E. Br.)

習性：草本。花期：7-8 月；果期：9-11 月。

產地：梧桐寨、甲龍徑、茅坪。生於山谷密林中、水旁。

分佈：海南、廣東、廣西、福建、臺灣、雲南、貴州、西藏。日本（琉球群島）、

中南半島、新幾內亞。

鴨跖草屬 *Commelina* L.

耳苞鴨跖草 Auriculate Dayflower

Commelina auriculata Blume

習性：草本；果期：11 月。

產地：元朗。

分佈：廣東、澳門、福建、臺灣。日本、印度尼西亞、大洋洲。

飯包草 Bengal Dayflower

Commelina bengalensis L.

習性：草本。花期：夏秋季。

產地：大圍、汀九、元朗、南生圍。生於潮濕地。

分佈：海南、廣東、廣西、江西、湖南、湖北、福建、臺灣、浙江、河南、河北、山東、陝西、雲南、四川。

用途：藥用。

鴨跖草 Common Dayflower

Commelina communis L.

習性：草本。花期：夏秋季。

產地：大帽山。生於濕地上。

分佈：幾遍全國。

用途：藥用。

節節草 Diffuse Dayflower

†**Commelina diffusa** Burm. f.

習性：草本。花果期：5-11 月。

產地：香港各地。生於溪地或曠野。

分佈：海南、廣東、廣西、臺灣、雲南、貴州、西藏。

用途：藥用。

大苞鴨跖草 Bigbract Dayflower

Commelina paludosa Blume [*Commelina obliqua* Buch.-Ham. ex D. Don]

習性：草本。花期 8-10 月；果期：10 月至翌年 4 月。

產地：粉嶺、大帽山、城門、大嶼山。生於溪澗邊。

分佈：廣東、廣西、湖南、江西、福建、臺灣、雲南、四川、貴州、西藏。尼泊尔、印度、印度尼西亞。

用途：藥用。

藍耳草屬 *Cyanotis* Don

蛛絲毛藍耳草 *Arachnoid Cyanotis*

†*Cyanotis arachnoidea* C. B. Clarke

習性：草本。花期：6-9月；果期：10月。

產地：香港島、馬鞍山、大嶼山。生於山谷濕潤的岩石上。

分佈：海南、廣東、廣西、江西、福建、臺灣、雲南、貴州。

藍耳草 *Common Cyanotis*

Cyanotis vaga (Lour.) Roem. & Schult.

習性：草本。花期：7-9月；果期：10月。

產地：香港島、大嶼山。

分佈：海南、廣東、臺灣、雲南、貴州、西藏。越南、老撾、柬埔寨。

聚花草屬 *Floscopa* Lour.

聚花草 *Climber Floscopa*

Floscopa scandens Lour.

習性：草本。花期：7-11月。

產地：香港島、大帽山、林村、粉嶺、西貢、大網仔、榕樹澳、大嶼山。

分佈：廣東、廣西、江西、浙江、雲南、四川、西藏。

用途：藥用。

水竹葉屬 *Murdannia* Royle

大苞水竹葉 *Largebract Murdannia*

Murdannia bracteata (C. B. Clarke) J. K.

Morton ex Hong [*Aneilema bracteata* (C. B. Clarke) Kuntze]

習性：草本。花果期：5-11月。

產地：新界。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南。中南半島。

裸花水竹葉 *Nakedflower Murdannia*

Murdannia nudiflora (L.) Brenan

(*Commelina nudiflora* L.; *Aneilema nudiflorum* (L.) R. Br.)

習性：草本。花果期：8-9月。

產地：香港島、城門、西貢、荔枝莊、蒲台島。生於草地上。

分佈：海南、廣東、廣西、江西、湖南、福建、江蘇、浙江、安徽、河南、山東、雲南、四川。

用途：藥用。

細竹篙草 *Simplex Murdannia*

Murdannia simplex (Vahl) Brenan [*Aneilema simplex* (Vahl) Brenan]

習性：草本。花期：4-9月。

產地：鶴咀、西貢、粉嶺、大嶼山。生於草地上。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川。非洲、印度至印度尼西亞。

水竹葉 *Triquetrous Murdannia*

†*Murdannia triquetra* (Wall.) Bruckn.

習性：草本。花期：9-10月；果期：10-11月。

產地：大網仔。生於潮濕處。

分佈：我國東南部至西南部以及河南、陝西。印度至越南、老撾、柬埔寨。

細柄水竹葉 *Sheathed Murdannia*

Murdannia vaginata (L.) Bruckn. (*Aneilema vaginatum* R. Br.)

習性：草本。果期：8-9月。

產地：沙田、西貢、烏蛟騰、粉嶺、羅湖。

分佈：海南、廣東、廣西、江蘇。菲律賓、越南、泰國、印度、斯里蘭卡。

杜若屬 *Pollia* Thunb.

杜若

Pollia secundiflora (Blume) Bakh. f.

習性：多年生草本。花期4月。

產地：扯旗山、鶴咀、銅鑼灣。生於密林中。

分佈：雲南、貴州、廣西、湖南、江西、廣東。南亞至東南亞。

長柄杜若 Siam Pollia

†*Pollia siamensis* (Craib) Fadea

習性：草本。花期：4-8 月；果期：8-12 月。
產地：香港島、梧桐寨。生於溝谷密林中。
分佈：海南、廣東、雲南。菲律賓、印度尼西亞、越南、老撾、柬埔寨、泰國、新幾內亞。

紫鴨跖草屬 *Setcreasea* K. Schum.
& Sydow

紫鴨跖草 Purple Heart

**Setcreasea purpurea* B. K. Boom

習性：多年生草本。
產地：栽培。
分佈：華南各地有栽培。原產墨西哥。
用途：觀賞。

吊竹梅屬 *Tradescantia* L.

吊竹梅 Wandering Jew

**Tradescantia fluminensis* Vell.

習性：草本。花期：夏季。
產地：栽培。
分佈：我國南方一些城市有栽培。原產熱帶美洲。

白紋吊竹梅

**Tradescantia fluminensis* cv. *Variegata*

習性：草本。花期：夏秋季。
產地：栽培。
分佈：我國南方一些城市有引種。原產熱帶美洲。

紫萬年青（蚌花） Oyster Plant

**Tradescantia spathacea* Sw. [*Rhoeo discolor* (L'Herit.) Hance]

習性：草本。花期：夏、秋季。
產地：栽培。
分佈：華南各地常見栽培。原產熱帶美洲。

水竹草 Wandering Jew *Zebrina*

**Tradescantia zebrina* Hort. ex Bosse

(*Zebrina pendula* Schnitzl.)

習性：草本。花期：秋、冬季。
產地：栽培。
分佈：我國各大城市常見栽培。原產墨西哥。

350. 穀精草科 *Eriocaulaceae*

穀精草屬 *Eriocaulon* L.

毛穀精草 Southern Pipewort

Eriocaulon australe R. Br

習性：濕生草本。花果期：夏秋季。
產地：石澳、鯽魚涌、沙田、大嶼山。生於水塘、濕地。
分佈：江西、福建、湖南、廣東、海南。越南、柬埔寨、澳大利亞。

白藥穀精草 Siebold Pipewort

Eriocaulon cinereum R. Br (*Eriocaulon sieboldianum* Sieb. & Zucc. ex Steud.)

習性：一年生草本。花期：6-8 月；果期：9-10 月。
產地：深水灣、大帽山、大嶼山。生於稻田、水溝中。
分佈：甘肅及秦嶺以南各省區。印度、泰國、越南、老撾、柬埔寨、菲律賓、日本、澳大利亞、非洲。

菲律賓穀精草

Eriocaulon merrillii Ruhl. ex Perkins (*Eriocaulon truncatum* auct. non Buch.-Ham. ex Mart.: Check List HK. Plant. 1993.)

習性：濕生草本。花果期：5-12 月。
產地：香港島、深井、河背、大嶼山。生於水田和濕地陽處。
分佈：臺灣、廣東、海南。菲律賓。

南投穀精草 Nanto Pipewort

Eriocaulon nantoense Hayata (*Eriocaulon luzulifolium* auct. non Mart.: Check List HK. Pl. 1993.)

習性：草本。花果期：9-11 月。

產地：新界。生於沼澤、稻田中。
分佈：臺灣、浙江、福建、廣東、海南、廣西。

絲葉穀精草 Bristle-leaved Pipewort

Eriocaulon setaceum L.

習性：水生草本。花果期：8-10月。
產地：粉嶺。生於池塘、沼澤。
分佈：廣東、海南、廣西、雲南。印度、孟加拉、斯里蘭卡、澳大利亞。

華南穀精草 Sixangular Pipewort

Eriocaulon sexangulare L. (*Eriocaulon wallichianum* Mart.)

習性：大型濕生草本。
產地：香港各地。
分佈：臺灣、福建、廣東、海南、廣西。

短萼穀精草 Short-calyx Pipewort

†**Eriocaulon yaoshanense** var. **brevicalyx** (C. H. Wright) W. L. Ma (*Eriocaulon cristatum* auct. non Mart.: Check List HK. Pl. 1993.; *Eriocaulon cristatum* var. *brevicalyx* C. H. Wright]

習性：濕生草本。花果期：10月至翌年1月。
產地：黃泥涌道、爛泥灣、石澳。生於濕地沼澤。
分佈：廣東、江西。印度、日本。

355. 燈心草科 Juncaceae

燈心草屬 *Juncus* L.

燈心草 Common Rush

Juncus effusus L.

習性：草本。花期：4-11月。
產地：大帽山。生於水旁或濕地上。
分佈：全世界廣佈。
用途：編織、藥用。

筭石菖 Rush

Juncus prismatocarpus R. Br. (*Juncus prismatocarpus* var. *leschenaultii*

Buch.)

習性：草本。果期：5-8月。
產地：香港島。生於濕地上。
分佈：中國各地。南亞至東亞、澳大利亞。
用途：藥用。

357. 莎草科 Cyperaceae

球柱草屬 *Bulbostylis* Kunth

球柱草 Barbed *Bulbostylis*

Bulbostylis barbata (Rottb.) C. B. Clarke

習性：草本。花果期：4-10月。
產地：深水灣，大龍、烏石角、東涌。生於海邊沙地或田野。
分佈：我國除西北地區外，各地均產。東半球熱帶地區及北美南部。

絲葉球柱草 Filiform-leaf *Bulbostylis*

Bulbostylis densa (Wall.) Hand.-Mazz.

習性：草本。花果期：4-12月。
產地：大東山。生於沙質草地上。
分佈：黃河流域以南各省區。廣佈於東半球熱帶和溫帶地區。

毛鱗球柱草 Puberulous *Bulbostylis*

†**Bulbostylis puberula** (Poir.) C. B. Clarke

習性：草本。花果期：2-6月。
產地：大帽山。生於海邊沙地上。
分佈：海南、廣東。亞洲和非洲熱帶地區。
用途：藥用。

薹草屬 *Carex* L.

漿果薹草 (山稗子) Berry-fruit Sedge

Carex baccans Nees

習性：草本。花果期：8-12月。
產地：梧桐寨、大帽山。生於山坡、山谷林中。
分佈：華南、西南及臺灣。馬來西亞、印度、越南及日本。

青綠薹草 White-green Sedge

Carex breviculmis R. Br. [*Carex leucochlora*

Bunge; *Carex breviculmis* subsp.
royleana (Nees) Kukenthal]

習性：草本。花果期：4-6 月。

產地：香港。生於山坡林下。

分佈：廣東、江西、福建、臺灣、浙江、江蘇、廣西、雲南、四川、陝西、河北。緬甸、印度、朝鮮、日本。

栗褐蘆草(棕苔) Chestnut-colored Sedge

Carex brunnea Thunb.

習性：草本。花果期：8-11 月。

產地：灣仔峽、西貢。生於山坡、山谷林中或潮濕岩石上。

分佈：廣東、福建、湖南、湖北、廣西、雲南、貴州。菲律賓、中南半島各國及日本。

果柄蘆草 Stipitate-fruit Sedge

Carex canina Dunn

習性：草本。花果期：3-8 月。

產地：大東山。生於山坡林緣。

中華蘆草 Chinese Sedge

Carex chinensis Retz..

習性：草本。花果期：3-5 月。

產地：香港各地。生於潮濕林中。

分佈：雲南、廣東、江西、福建、江蘇。

十字蘆草 Cruciate Sedge

Carex cruciata Wahlenb.

習性：草本。花果期：8-12 月。

產地：香港各地。生於山坡潮濕林中。

分佈：我國南部、西南部、東部及臺灣。印度、越南、尼泊爾、馬達加斯加。

隱穗蘆草 Cryptostachys Sedge

Carex cryptostachys Brongn.

習性：草本。花果期：4-6 月。

產地：香港各地。生於山坡潮濕林中。

分佈：廣東、福建、臺灣、廣西、雲南。中南半島各國、菲律賓、印度尼西亞、

日本及大洋洲北部。

蕨狀蘆草 Pteriform Sedge

†**Carex filicina** Nees

習性：草本。花果期：6-10 月。

產地：扯旗山、大帽山、彌勒山。生於溪邊山坡灌叢。

分佈：四川、雲南、湖北、廣西、廣東、福建、臺灣。印度、斯里蘭卡、越南、菲律賓、馬來西亞。

纖花蘆草

†**Carex graciliflora** Dunn

習性：草本。花果期：2-4 月。

產地：地點不詳。生於河旁。

分佈：廣東、福建。

長囊蘆草 Harland Sedge

Carex harlandii Boott

習性：草本。花果期：4-8 月。

產地：大帽山、飛鵝山。生於山坡密林中。

分佈：廣西、廣東、福建和湖北。

顯柱蘆草 Stylose Sedge

†**Carex ligata** Boott (*Carex nexa* Boott; *Carex hongkongensis* Franch.)

習性：草本。花果期：3-5 月。

產地：大帽山、南涌、牛押山。生於山坡林中。

分佈：廣東、臺灣。日本(琉球群島)及朝鮮。

銹點蘆草 Bodinier Sedge

†**Carex longiper** D. Don

習性：草本。花果期：3-10 月。

產地：香港。生於蔭蔽林中。

分佈：廣東、湖南、江西、福建、浙江。

斑點蘆草 Maculate Sedge

†**Carex maculata** Boott

習性：草本。花果期：4-5 月。

產地：大帽山、八仙嶺。生於溪邊灌叢中。

分佈：廣東、福建、臺灣、浙江、江蘇、湖

北。印度、朝鮮、日本。

紅苞蘆草 (缺如蘆草) Red Bract Sedge

Carex manca Boott

習性：草本。花果期：3-6 月。

產地：馬鞍山、大帽山。生於密林中。

分佈：廣東、福建、臺灣。

線穗蘆草 Linear-spike Sedge

†**Carex nemostachys** Steud.

習性：草本。花果期：3-10 月。

產地：大埔。生於陰濕林中。

分佈：長江流域以南各省區。

鏡子蘆草 Convexutricle Sedge

Carex phacota Spreng.

習性：草本。花果期：4-11 月。

產地：筆架山。生於陰蔽林中或潮濕草地上。

分佈：雲南、廣西、廣東、福建、浙江、臺灣。印度、中南半島各國、印度尼西亞、菲律賓、朝鮮和日本。

彌勒蘆草

†**Carex pseudolaticeps** Tang & Wang ex S. Y. Liang

習性：草本。花果期：4-5 月。

產地：大嶼山（彌勒山）。

分佈：香港特有。

矮生蘆草 Dwarf Sedge

Carex pumila Thunb.

習性：草本。花果期：3-4 月。

產地：白石角、西貢大浪灣。生於海邊沙灘上。

分佈：廣東、福建、浙江、臺灣、江蘇及山東。日本、朝鮮及俄羅斯。

花葶蘆草 Scapose Sedge

Carex scaposa C. B. Clarke

習性：草本。花果期：3-11 月。

產地：馬鞍山、大帽山。生於林中或潮濕草

地上。

分佈：雲南、廣西、廣東、福建。越南。

翠麗蘆草 Angusti-leaf Sedge

Carex speciosa Kunth (*Carex speciosa* var. *angustifolia* Boott)

習性：草本。花果期：6 月。

產地：大嶼山。生於山坡、山谷和空曠林中。

分佈：廣東。

細梗蘆草 Slender pedicel Sedge

Carex teinogyna Boott

習性：草本。花果期：9-11 月。

產地：大帽山、新娘潭。生於溪邊、林中或山邊沼澤地。

分佈：福建、廣西、廣東、湖南、江西、安徽、湖北、四川、雲南。印度、印度尼西亞、中南半島各國、朝鮮和日本。

芒尖鱗蘆草 (薄葉蘆草) Thin leaf Sedge

Carex tenebrosa Boott

習性：草本。花果期：3 月。

產地：香港有記錄。生於山坡、山谷、曠地林中。

分佈：廣東。

西藏蘆草 Tibet Sedge

†**Carex thibetica** Franch.

習性：草本。花果期：5-7 月。

產地：牛押山。生於林中。

分佈：廣東、廣西、雲南、四川、西藏、湖北、陝西。

截鱗蘆草 Truncate-glume Sedge

Carex truncatigluma C. B. Clarke

習性：草本。花果期：4-6 月。

產地：長洲、大帽山。生於山地灌叢。

分佈：廣東、福建、浙江。

克拉莎屬 Cladium P. Browne

華克拉莎 (大克拉莎) Chinense Cladium

Cladium mariscus subsp. **jamaicense** (Crantz)

Kukenthal (*Cladium chinense* Nees;
Cladium jamaicense Crantz)

習性：草本。花果期：5-6 月。

產地：香港各地。生於林中、河邊或沼澤地。
分佈：臺灣、海南、廣東、廣西、雲南。全
世界熱帶、亞熱帶地區。

莎草屬 *Cyperus* L.

扁穗莎草 *Compress Galingale*

†*Cyperus compressus* L.

習性：草本。花果期：7-12 月。

產地：香港各地。生於空曠草地或荒田。
分佈：海南、廣東、福建、臺灣、湖南、江
西、浙江、江蘇、湖北、安徽、貴州、
四川。全世界熱帶地區廣佈。

長尖莎草 *Cuspidate Galingale*

Cyperus cuspidatus H. B. & K. (*Cyperus*
uncinatus auct. non Poir.: Check List
HK Pl. 1993.)

習性：草本。花果期：6-9 月。

產地：筆架山。生於空曠草地上。
分佈：廣東、福建、浙江、四川、雲南。全
世界熱帶地區廣佈。

異型莎草 *Diffomed Galingale*

Cyperus difformis L.

習性：草本。花果期：6-12 月。

產地：香港各地。生於空曠潮濕草地或河邊。
分佈：幾遍全國。東半球熱帶、亞熱帶地區
廣佈。

多脈莎草（綠穗莎草） *Diffuse Galingale*

Cyperus diffusus Vahl

習性：草本。花果期：6-10 月。

產地：梧桐寨、大埔。生於山谷林下、林緣
濕地上。
分佈：雲南、廣西、廣東、臺灣。印度、馬
來西亞、印度尼西亞。

疏穗莎草（疏穎莎草） *Laxspiculate Galingale*
Cyperus distans L. f.

習性：草本。花果期：7-8 月。

產地：香港各地。生於河邊或稻田中、潮濕
草地上。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南。尼泊爾、
錫金、斯里蘭卡、緬甸、越南、菲律
賓、喜馬拉雅山地區、非洲、澳大利
亞熱帶地區及美洲大西洋區域。

高桿莎草 *Tallculm Galingale*

†*Cyperus exaltatus* Retz.

習性：草本。花果期：6-8 月。

產地：青山。生於潮濕草地或沼澤地上。
分佈：海南、廣東、福建。越南、印度、印
度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、大洋
洲及非洲。

風車草 *Umbrella Plant*

**Cyperus flabelliformis* Rottb. [*Cyperus*
alternifolius subsp. *flabelliformis*
(Rottb.) Kukenthal]

習性：草本。花果期：4-8 月。

產地：香港動植物公園。公園、庭園栽培或
逸為野生。

分佈：原產非洲。

用途：觀賞。

畦畔莎草 *Field-bank Galingale*

Cyperus halpan L.

習性：草本。花果期：6-10 月。

產地：香港各地。生於潮濕草地和稻田中。
分佈：臺灣、福建、廣東、廣西、雲南、四
川。熱帶、亞熱帶地區。

疊穗莎草 *Imbricate Galingale*

Cyperus imbricatus Retz. (*Cyperus sadiatus*
Vahl)

習性：草本。花果期：9-10 月。

產地：香港各地。生於河邊、空曠潮濕地或
稻田中。

分佈：廣東、臺灣。日本、越南、印度、馬
來西亞、馬達加斯加、非洲及美洲。

碎米莎草 Rice Galingale

Cyperus iria L.

習性：草本。花果期：6-10月。

產地：香港各地。生於空曠潮濕草地、河邊或稻田中。

分佈：幾遍全國。俄羅斯遠東地區、朝鮮、日本、越南、印度、伊朗、澳大利亞北部及非洲。

茳芏 Malacca Galingale

Cyperus malaccensis Lam.

習性：草本。花果期：6-11月。

產地：元朗、銀礦灣。生於溝邊或河口污泥淺灘。

分佈：廣東。印度、緬甸、越南、馬來西亞、印度尼西亞、日本琉球群島及澳大利亞。

短葉茳芏 (鹹水草) Short-leaf Malacca Galingale

Cyperus malaccensis var. **brevifolius** Bocklr.

(*Cyperus tegetiformis* auct. non Roxb.:

Check List HK Pl. 1993.)

習性：草本。花果期：6-11月。

產地：沙田、鶴咀、青山、米埔、西貢、大嶼山、泥涌、三桠涌、榕樹澳。生於河邊潮濕地上。

分佈：四川、廣西、廣東、福建。日本。

用途：秆可用作編織草席、草籃和草帽。

垂穗莎草 Nodding Galingale

Cyperus nutans Vahl (*Cyperus nutans* var.

eleusinoides auct. non Haines: Check

List HK Pl. 1993.)

習性：草本。花果期：5-10月。

產地：大水坑。生於山谷近水旁。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南。越南、斯里蘭卡、印度、菲律賓、印度尼西亞、新幾內亞及非洲。

三輪草 Upright-spiked Galingale

†***Cyperus orthostachys** Franch. & Savat.

習性：草本。花果期：6-8月。

產地：元朗廈村。

分佈：原產地意大利。

用途：觀賞。

紙莎草 Paper Galingale

†***Cyperus papyrus** L.

習性：草本。花果期：6-8月。

產地：栽培。

分佈：原產於熱帶非洲中部。

用途：觀賞。

毛軸莎草 Pilose Galingale

Cyperus pilosus Vahl

習性：草本。花果期：8-11月。

產地：大帽山、青山、東涌。生於沼澤、稻田、河邊等空曠潮濕草地。

分佈：四川、雲南、貴州、廣西、廣東、江西、福建、浙江、海南。日本、中亞、熱帶亞洲及澳大利亞。

盤柱莎草 Platystyle Galingale

Cyperus platystylis R. Br.

習性：草本。花果期：3-10月。

產地：西貢。生於沼澤地或稻田。

分佈：臺灣。印度、斯里蘭卡、馬來西亞、澳大利亞北部。

闊穗莎草 Latespike Galingale

Cyperus procerus Rottb.

習性：草本。花果期：6-9月。

產地：昂船洲。生於水邊或低窪潮濕地上。

分佈：我國南部和西南部。印度、越南、馬來西亞、澳大利亞及非洲。

香附子 (香頭草) Nutgrass Galingale

Cyperus rotundus L.

習性：草本。花果期：5-11月。

產地：香港各地。生於向陽或稍蔭蔽的路邊

草地或荒蕪之處。

分佈：廣東、福建、貴州、四川、雲南、江西、浙江、臺灣、安徽、江蘇、山東、河南、河北、山西、甘肅、陝西。廣佈於全世界溫暖地帶。

用途：藥用（塊莖）。

粗根莖莎草 Stolon-bearing Galingale

Cyperus stoloniferus Retz.

習性：草本。花果期：7-8 月。

產地：青山、南丫島。生於海岸沙地上或鹽漬污泥上。

分佈：廣東、福建。馬達加斯加、越南、印度、馬來西亞、印度尼西亞、澳大利亞。

窄穗莎草 Narrow speulate Galingale

†**Cyperus tenuispica** Steud.

習性：草本。花果期：8-10 月。

產地：嶺南學院對面。生於空曠草地上。

分佈：廣東、廣西、貴州、湖南。廣佈於亞洲、非洲和大洋洲的溫帶地區。

稜穗莎草 Zollingen Galingale

Cyperus zollingerii Steud.

習性：草本。花果期：5-11 月。

產地：香港。生於山坡、空曠草地上。

分佈：廣東、廣西、雲南、福建。尼泊爾、錫金、印度、馬來西亞、印度尼西亞、日本、澳大利亞、非洲、喜馬拉雅山區。

裂穎茅屬 *Diplacrum* R. Br.

裂穎茅 Common Diplacrum

Diplacrum caricinum R. Br.

習性：草本。花果期：8-10 月。

產地：薄扶林水塘、扯旗山、東涌。生於田間或蔭蔽山坡。

分佈：廣東、福建、臺灣。印度、越南、馬來西亞、菲律賓、日本及澳大利亞。

荸薺屬 *Eleocharis* R. Br.

牛毛氈 Needle Spikesedge

Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult.

習性：草本。花果期：4-11 月。

產地：沙田、粉嶺。生於池塘邊或濕地上。

分佈：幾遍全國。北美、歐洲、俄羅斯東部、朝鮮、日本、印度、緬甸、越南、印度尼西亞、菲律賓和斯里蘭卡。

銳稜荸薺 Acute-angular Spikesedge

†**Eleocharis acutangula** (Roxb.) Schult.

習性：草本。花果期：6-9 月。

產地：香港仔、西貢大浪。生於沼澤地或稻田中。

分佈：雲南、海南、廣東、福建、臺灣。全世界熱帶地區廣佈。

紫果藺 Purple-fruit Spikesedge

†**Eleocharis atropurpurea** (Retz.) Presl

習性：草本。花果期：6-10 月。

產地：青山、東龍洲。生於稻田或潮濕草地上。

分佈：海南、廣東、廣西、湖南、江蘇、四川、雲南。歐洲、非洲和亞洲。

密花荸薺（透明鱗荸薺） Dense-flower Spikesedge

Eleocharis congesta D. Don (*Eleocharis pellucida* Presl)

習性：草本。花果期：5-8 月。

產地：沙田。生於淺水中、沼澤地或稻田中。

分佈：我國西南部、南部和東南部。俄羅斯遠東地區、朝鮮、日本、印度、緬甸、中南半島、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓、歐洲及北美。

荸薺（馬蹄） Water Chestnut

***Eleocharis dulcis** (Burm.f.) Henschel

習性：草本。花果期：5-10 月。

產地：栽培。生於水塘中、稻田中、沼澤地。

分佈：全國各地都有栽培。朝鮮、日本(琉球

半島)、印度、越南、馬來西亞、馬達加斯加、非洲西部、澳大利亞。

用途：球莖可供食用。

木賊荸薺 Equisetine Spikesedge

†*Eleocharis equisetina* J. & C. Presl.

習性：草本。花果期：6-9月。

產地：大帽山、沙埔村、馬灣。生於沼澤地或潮濕地上。

分佈：海南、廣東、臺灣、江蘇。日本琉球群島、東南亞和印度。

黑籽荸薺 Black-seed Spikesedge

†*Eleocharis geniculata* (L.) Roem. & Schult.

(*Eleocharis capitata* R. Br.)

習性：草本。花果期：1-7月。

產地：香港島。生於沼澤或潮濕草地上、稻田中。

分佈：海南、廣東、福建、臺灣。印度、緬甸、泰國、馬來西亞、印度尼西亞和日本。

假荸薺 Cylindric-culm Spikesedge

†*Eleocharis ochrostachys* Steud. (*Eleocharis variegata* auct. non Presl: Check List HK Pl. 1993.)

習性：草本。花果期：9-11月。

產地：大嶼山。生於沼澤、稻田或湖邊。

分佈：海南、廣東、福建、臺灣。越南、泰國、緬甸、印度、馬來西亞、印度尼西亞、日本(琉球群島)以及密克羅尼西亞。

貝殼葉荸薺 Retroflex Spikesedge

†*Eleocharis retroflexa* (Poir.) Urb.

習性：草本。花果期：10-11月。

產地：大浪灣、貝澳、西貢嶂上。生於淺水塘邊、溪邊、污泥中。

分佈：海南、廣東、福建、雲南。印度、斯里蘭卡、緬甸、馬來西亞、澳大利亞、美洲熱帶地區

螺旋鱗荸薺 Spiralscale Spikesedge

†*Eleocharis spiralis* (Rottb.) Roem. & Schult.

習性：草本。花果期：10月至翌年1月。

產地：米埔、榕樹澳、船灣、烏溪沙、大蠔。生於池塘邊或沼澤地上。

分佈：廣東、海南。越南、緬甸、馬來西亞、印度、斯里蘭卡、熱帶非洲、馬達加斯加、澳大利亞。

用途：織蓆。

龍師草 Fourangledculm Spikesedge

†*Eleocharis tetraquetra* Nees

習性：草本。花果期：9-11月。

產地：大帽山。生於空曠潮濕地或水塘邊。

分佈：廣東、廣西、湖南、福建、江西、臺灣、安徽、浙江、江蘇、河南。日本。

飄拂草屬 *Fimbristylis* Vahl

披針穗飄拂草 Acuminate *Fimbristylis*

Fimbristylis acuminata Vahl

習性：草本。花果期：6-9月。

產地：榕樹澳、赤徑、西貢大浪、咸田。生於沙質田中、次生林下、山坡岩石隙中。

分佈：廣東、廣西、臺灣。斯里蘭卡、印度、馬來西亞、日本(琉球半島)和澳大利亞熱帶地區。

夏飄拂草 Aestival *Fimbristylis*

Fimbristylis aestivalis (Retz.) Vahl

習性：草本。花果期：5-8月。

產地：九華徑、大埔、林村。生於潮濕地、沼澤、稻田。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、福建、臺灣。日本、尼泊爾、斯里蘭卡、印度、泰國、印度尼西亞、菲律賓、澳大利亞。

扁鞘飄拂草 Flatsheath *Fimbristylis*

Fimbristylis complanata (Retz.) Link

習性：草本。花果期：5-8月。

產地：大帽山、東涌。生於海岸污泥、河岸邊潮濕草地上、稻田中。

分佈：海南、廣東、福建、臺灣、江蘇、湖北、四川、貴州、雲南。泛熱帶地區廣佈，亞洲東南部最爲常見。

血色飄拂草 *Consanguine Fimbristylis*

***Fimbristylis consanguinea* Kunth**

習性：草本。花果期：5-8月。

產地：跑馬地。生於沼澤地、溪邊、潮濕草地上。

分佈：廣東、福建、臺灣、江西、浙江、江蘇、安徽、山東、貴州。南非、馬達加斯加、斯里蘭卡、印度、馬來西亞、朝鮮、日本及非洲。

黑果飄拂草 *Black-fruit Fimbristylis*

***Fimbristylis cymosa* (Lam.) R. Br.** [*Fimbristylis spathacea* Roth]

習性：草本。花果期：7-10月。

產地：鶴咀、昂船洲、青山、平洲。生於海濱沙灘上、潮濕沙丘、窪地或紅樹林污泥上。

分佈：海南、臺灣、廣東、廣西、福建。泛熱帶地區廣佈。

兩歧飄拂草（稜穗飄拂草） *Dichotomous Fimbristylis*

***Fimbristylis dichotoma* (L.) Vahl**

習性：草本。花果期：7-10月。

產地：香港各地。生於空曠荒蕪地上及路邊草地。

分佈：幾遍全國。全世界溫暖地區廣佈，亞洲南部及東南部常見。

用途：葉可作飼料。

擬二葉飄拂草 *Setaceous-bract Fimbristylis*

†***Fimbristylis diphyloides* Makino**

習性：草本。花果期：6-9月。

產地：龍鼓上灘。生於路邊草地、水稻田中、溪邊潮濕地。

分佈：長江流域以南各省區。日本和朝鮮。

知風飄拂草 *Eragrostiella Fimbristylis*

***Fimbristylis eragrostis* (Nees) Hance**

習性：草本。花果期：6-9月。

產地：香港島、青山。生於疏林中或路邊草地上。

分佈：海南、廣東、福建、臺灣。斯里蘭卡、印度、馬來西亞和澳大利亞熱帶地區。

銹鱗飄拂草 *Ferrugineous-scale Fimbristylis*

***Fimbristylis ferruginea* (L.) Vahl**

習性：草本。花果期：6-8月。

產地：香港各地。生於向陽潮濕草地、池塘邊。

分佈：海南、廣東、福建、臺灣。全球溫暖地帶的沿海地區。

羅浮飄拂草（福氏飄拂草） *Ford's Fimbristylis*

***Fimbristylis fordii* C. B. Clarke**

習性：草本。花果期：8-9月。

產地：鶴咀山。生於草叢中或溪邊岩石上。

分佈：廣東、湖南、江西、浙江。印度、越南、老撾、泰國、菲律賓。

褐穗飄拂草 *Fuscous Fimbristylis*

***Fimbristylis fusca* (Nees) C. B. Clarke.**

習性：草本。花果期：6-9月。

產地：香港仔、鶴咀、奇力山、大帽山、青山。生於山坡草地、休閒田中。

分佈：廣西、廣東、湖南、福建和臺灣。印度、緬甸、泰國和日本。

纖細飄拂草（纖莖飄拂草） *Tender-clavate Fimbristylis*

***Fimbristylis leptoclada* Benth.**

習性：草本。花果期：7-8月。

產地：西高山。生於空曠、乾燥沙質草地上。

分佈：廣東、福建。斯里蘭卡、越南、泰國、馬來西亞。

日照飄拂草 Sunshiny *Fimbristylis*

†***Fimbristylis miliacea*** (L.) Vahl (*Fimbristylis littoralis* Gaudich)

習性：草本。花果期：8-10月。

產地：香港各地。生於空曠、潮濕草地上、稻田中。

分佈：我國東部、西南部至南部各省區。印度、斯里蘭卡、緬甸、泰國、老撾、柬埔寨、越南、馬來西亞、波利尼西亞和澳大利亞。

垂穗飄拂草 Drooping *Fimbristylis*

Fimbristylis nutans (Retz.) Vahl

習性：草本。花果期：7-8月。

產地：香港仔、獅子山、東涌。生於潮濕的林緣、稻田、沼澤地。

分佈：廣東、海南、臺灣。越南、緬甸、斯里蘭卡、印度、馬來西亞、新幾內亞和澳大利亞。

獨穗飄拂草 Unispiket *Fimbristylis*

Fimbristylis ovata (Burm. f) Kern
[*Fimbristylis monostachya* (L.) Hassk.]

習性：草本。花果期：6-9月。

產地：香港各地。生於向陽路邊、草地上。

分佈：雲南、廣西、湖南、廣東、海南、福建、臺灣。日本、朝鮮、馬來西亞和澳大利亞。

細葉飄拂草 Fineleaf *Fimbristylis*

†***Fimbristylis polytrichoides*** (Retz.) Vahl

習性：草本。花果期：3-9月。

產地：二澳、橫洲(糧船灣海)。生於海岸污泥中或海邊岩石縫隙中。

分佈：海南、廣東。熱帶非洲、亞洲及大洋洲。

結壯飄拂草(剛穗飄拂草) Woody-rhizomed *Fimbristylis*

Fimbristylis rigidula Nees

習性：草本。花果期：4-6月。

產地：大嶼山。生於山坡路邊草地上。

分佈：四川、雲南、廣西、廣東、海南、福建、臺灣、浙江。日本、尼泊爾、印度、泰國、菲律賓。

少穗飄拂草 Fewspikelet *Fimbristylis*

Fimbristylis schoenoides (Retz.) Vahl

習性：草本。花果期：8-11月。

產地：香港仔。生於空曠草地上、休閒稻田中。

分佈：臺灣、海南、廣東、福建、廣西、雲南。亞洲東部、東南部及大洋洲。

絹毛飄拂草 Sericeous *Fimbristylis*

†***Fimbristylis sericea*** (Poir.) R. Br.

習性：草本。花果期：8-10月。

產地：浪茄。生於沙質海岸、潮濕沙丘上。

分佈：海南、廣東、福建、臺灣、浙江。印度、越南、泰國、日本、朝鮮、馬來西亞和澳大利亞。

雙穗飄拂草

†***Fimbristylis subbispicata*** Nees & Meyen

習性：草本。花果期：8-10月。

產地：香港仔、跑馬地、烏溪沙、東涌。生於山坡、山谷、溪邊、沼澤地及海邊鹽沼地。

分佈：我國東北、東部、中部、南部和臺灣。日本、朝鮮。

四稜飄拂草 Tetragonal *Fimbristylis*

Fimbristylis tetragona R. Br.

習性：草本。花果期：9-10月。

產地：香港仔。生於空曠潮濕稻田中、沼澤地上。

分佈：海南、廣東、福建、臺灣。越南、緬甸、尼泊爾、斯里蘭卡、印度、泰國、中南半島、馬來西亞、菲律賓和澳大利亞。

西南飄拂草 Thomson *Fimbristylis*

Fimbristylis thomsonii Bockl.

習性：草本。花果期：5-7 月。

產地：香港各地。生於空曠山坡灌叢中或潮濕草地上。

分佈：雲南、廣西、海南、廣東、臺灣。印度、緬甸、泰國、馬來西亞、越南、老撾、日本(琉球半島)。

華飄拂草 Chinese Fimbristylis

Fimbristylis thouarsii (Kunth) Merr.
(*Fimbristylis actinoschoenus* C. B. Clarke)

習性：草本。花果期：7-9 月。

產地：香港。生於沙質田中、林中、岩石上。

分佈：海南、廣東。越南、泰國、斯里蘭卡、馬來西亞、馬達加斯加、毛里求斯。

三穗飄拂草 Trispikelet Fimbristylis

Fimbristylis tristachya R. Br.

習性：草本。花果期：7-10 月。

產地：鶴咀、石澳大浪灣、沙田。生於空曠草地上、灌叢或疏林中。

分佈：廣東。非洲、亞洲及大洋洲熱帶地區。

曲芒飄拂草 Curbed-awn Fimbristylis

Fimbristylis velata R. Br. (*Fimbristylis squarrosa* Vahl)

習性：草本。花果期：7-10 月。

產地：香港仔。生於空曠潮濕草地上、池塘邊。

分佈：臺灣、廣東、山東、雲南、河北。印度、緬甸、日本、朝鮮、俄羅斯、歐洲南部至非洲南部。

芙蘭草屬 *Fuirena* Rottb.

毛芙蘭草 Ciliate *Fuirena*

Fuirena ciliaris (L.) Roxb.

習性：草本。花果期：7-12 月。

產地：青山、沙田、西貢大浪灣。生於空曠潮濕草地上或池塘邊。

分佈：海南、廣東、臺灣、廣西、江蘇。喜馬拉雅山東部地區、斯里蘭卡、越南、

泰國、馬來西亞、菲律賓、日本、朝鮮、熱帶非洲和澳大利亞。

芙蘭草 *Umbrella Fuirena*

Fuirena umbellata Rottb.

習性：草本。花果期：6-11 月。

產地：香港各地。生於空曠潮濕草地上、河邊或稻田中。

分佈：海南、廣東、廣西、臺灣。全世界熱帶、亞熱帶地區廣佈。

黑莎草屬 *Gahnia* J. R. & G. Forst.

黑莎草 *Triste Gahnia*

Gahnia tristis Nees

習性：草本。花果期：3-12 月。

產地：香港各地。生於乾燥山坡灌叢中。

分佈：海南、廣西、廣東、湖南、福建。泰國、越南、日本(琉球群島)和馬來西亞。

割雞芒屬 *Hypolytrum* Rich.

海南割雞芒 *Hainan Hypolytrum*

†***Hypolytrum hainanensis*** (Merr.) Tang & Wang

習性：草本。花果期：5-8 月。

產地：大埔滘。生於林中灌叢中或溪邊潮濕地上。

分佈：海南。

割雞芒 (海薄利) *Wooded Hypolytrum*

Hypolytrum nemorum (Vahl) Spreng.
(*Hypolytrum latifolium* Rich.)

習性：草本。花果期：4-8 月。

產地：香港各地。生於林中潮濕地或灌叢中。

分佈：臺灣、海南、廣東、廣西和雲南。熱帶亞洲、非洲廣佈。

水莎草屬 *Juncellus* (Griseb.) C. B. Clarke

水莎草 *Late-Juncellus*

†***Juncellus serotinus*** (Rottb.) C. B. Clarke
(*Cyperus sezotinus* Rottb.)

習性：草本。花果期：7-10 月。

產地：新界。

分佈：幾遍全國。朝鮮、日本、喜馬拉雅山西北部、歐洲中部及地中海地區。

水蜈蚣屬 *Kyllinga* Rottb.

香根水蜈蚣 *Aromatic Kyllinga*

†**Kyllinga aromatica* (Ridl.) Mattf. & Kunth

習性：草本。花果期：5-8 月。

產地：維多利亞公園、蕉坑、大埔滘。生於路邊、荒地、河邊沙質草地上。

分佈：原產西非洲。現各地引種。

用途：香料。

短葉水蜈蚣 *Shortleaf Kyllinga*

Kyllinga brevifolia Rottb. [*Cyperus brevifolia* (Rottb.) Hassk.]

習性：草本。花果期：5-9 月。

產地：香港各地。生於山坡灌叢中、路邊潮濕草地。

分佈：長江流域以南各省區。全世界熱帶地區廣佈。

單穗水蜈蚣 *Unispike Kyllinga*

Kyllinga monocephala Rottb. [*Cyperus kyllinga* Endl.; *Cyperus triceps* auct. non Rottb.: Check List HK Pl. 1993.; *Kyllinga nemoralis* (Forst.) Dandy ex Hutchinson & Dalziel]

習性：草本。花果期：5-8 月。

產地：香港各地。生於荒蕪草地、路旁、溝邊、田邊。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南。喜馬拉雅山區、印度、緬甸、泰國、越南、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓、日本琉球群島、澳大利亞及美洲熱帶地區。

鱗子莎屬 *Lepidosperma* Labill.

鱗子莎（炮仗草） *Chinese Scaleseed Sedge*

Lepidosperma chinense Nees

習性：草本。花果期：5-12 月。

產地：香港各地。生於山谷草地。

分佈：廣東、福建、湖南。馬來西亞、新幾內亞。

石龍芻屬 *Lepironia* Rich

蒲草（肇慶草） *Cattail-leaf Lepironia*

Lepironia articulata (Retz.) Domin.

習性：草本。花果期：2-6 月。

產地：香港動植物公園。栽培。

分佈：廣東。馬達加斯加至波利尼西亞。

用途：織蓆。

湖瓜草屬 *Lipocarpa* R. Br.

華湖瓜草（銀色湖瓜草） *Chinese Lipocarpa*

Lipocarpa chinensis (Osbeck) Kern

習性：草本。花果期：6-10 月。

產地：香港仔、榕樹澳、烏蛟騰。生於潮濕草地、稻田、沼澤地、河岸旁、池塘邊。

分佈：臺灣、福建、海南、廣東、雲南。熱帶亞洲、非洲及澳大利亞。

湖瓜草 *Lipocarpa*

Lipocarpa microcephala (R. Br.) Kunth

習性：草本。花果期：5-10 月。

產地：粉嶺、榕樹澳。生於水邊或潮濕草地上。

分佈：我國東北、東部、南部和西南部。日本、越南、印度、馬來西亞、印度尼西亞和澳大利亞。

劍葉莎屬 *Machaerina* Vahl

劍葉莎 *Machaerina*

Machaerina ensigera (Hance) Koyama
(*Cladium ensigerum* Hance)

習性：草本。花果期：4-8 月。

產地：薄扶林、西貢。生於林下、溪邊或石澗中。

分佈：臺灣。

圓葉劍葉莎 *Roundleaf Machaerina*

Machaerina rubiginosa (Spreng.) Koyama
(*Cladium glomeratum* auct. non R. Br.:

Check List HK Pl. 1993.)

習性：草本。花果期：4-8 月。

產地：香港。

分佈：斯里蘭卡、孟加拉、印度、印度尼西亞、新幾內亞、日本(琉球群島)、新西蘭、澳大利亞。

播鼓芳屬 *Mapania* Vahl

播鼓芳 Chinese *Mapania*

Mapania wallichii C. B. Clarke (*Mapania sinensis* H. Uittien)

習性：草本。花果期：9-10 月。

產地：黃竹洋、橫山腳。生於林中。

分佈：廣東、廣西、海南。印度、馬來西亞和印度尼西亞。

磚子苗屬 *Mariscus* Vahl

莎草磚子苗 Nutgrass Sawgrass

Mariscus cyperinus Vahl [*Cyperus cyperinus* (Retz.) Saringar]

習性：草本。花果期：7-9 月。

產地：鶴咀、城門。生於山谷、山坡潮濕草地上。

分佈：海南、廣東、臺灣、浙江、四川。印度、緬甸、越南、印度尼西亞、菲律賓、日本琉球群島以及澳大利亞。

羽穗磚子苗 Featheryspike Sawgrass

Mariscus javanicus (Houtt.) Merr. & Metc. (*Mariscus albescens* Gaudich; *Cyperus javanicus* Houtt.)

習性：草本。花果期：6-7 月。

產地：薄扶林、石澳。生於沙質海灘、河岸污泥中、沼澤地。

分佈：海南。緬甸、馬來西亞、菲律賓、日本琉球群島、熱帶非洲、大洋洲和美國夏威夷。

輻射磚子苗 Radiate Sawgrass

Mariscus radians (Nees & Meyen) Tang & Wang (*Cyperus radians* Nees & Meyen)

習性：草本。花果期：8-9 月。

產地：西貢。生於海邊沙地上或鹽漬地上。

分佈：廣東、臺灣、浙江、山東。越南、馬來西亞。

磚子苗 Sawgrass

Mariscus umbellatus Vahl [*Cyperus cyperoides* (L.) Kuntze]

習性：草本。花果期：4-10 月。

產地：香港各地。生於山坡路邊草地上及溪邊。

分佈：我國南部、東部、中部、西南部及臺灣。亞洲東南部、喜馬拉雅地區、非洲、大洋洲、美洲。

扁莎屬 *Pycreus* P. Beauv.

球穗扁莎 Globularspike *Pycreus*

Pycreus flavidus (Retz.) Koyama [*Pycreus globosus* (All.) Reich.; *Cyperus flavidus* Retz.]

習性：草本。花果期：6-11 月。

產地：香港各地。生於田邊、溪旁潮濕草地上。

分佈：除西北部外、幾遍全國。日本、朝鮮、越南、印度、地中海沿岸、非洲南部及大洋洲。

多穗扁莎 Branch *Pycreus*

Pycreus polystachyus (Rottb.) P. Beauv. (*Cyperus polystachyus* Rottb.)

習性：草本。花果期：5-10 月。

產地：香港各地。生於溪邊、路旁、田中潮濕草地上。

分佈：海南、廣東、福建、臺灣。朝鮮、印度、越南、朝鮮、日本。

矮扁莎 Dwarf *Pycreus*

Pycreus pumilus (L.) Domin (*Cyperus pumilus* L.)

習性：草本。花果期：8-11 月。

產地：香港仔、上水、蒲台島、大帽山。生於田間陰濕草地上。

分佈：海南、廣東、福建、江西、湖南。印度、尼泊爾、緬甸、越南、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓。

紅鱗扁莎 Redscale *Pycurus*

†*Pycurus sanguinolentus* (Vahl) Nees
(*Cyperus sanguinolentus* Vahl)

習性：草本。花果期：7-12月。

產地：青山。生於稻田、路邊草地上。

分佈：幾遍全國。亞洲中部至東部，地中海地區、非洲和大洋洲。

海濱沙屬 *Remirea* Aublet

海濱莎 Seashore *Remirea*

†*Remirea maritima* Aublet

習性：草本。花果期：9-12月。

產地：香港。生於海岸邊沙灘上。

分佈：海南、廣東、臺灣。全球熱帶海邊。

刺子莞屬 *Rhynchospora* Vahl

†*Rhynchospora chinensis* Nees & Mey.

習性：草本。花果期：7—10月。

產地：青山。生於水濕地。

分佈：海南、廣東、臺灣、浙江、福建、山東。朝鮮、日本、印度、斯里蘭卡、緬甸、越南、印度尼西亞、馬達加斯加。

傘房刺子莞 Corymbose Beakrush

Rhynchospora corymbosa (L.) Britt.

習性：草本。花果期：3-12月。

產地：濶西洲。生於河岸邊或休耕稻田中。

分佈：雲南、海南、廣東、臺灣。廣佈於全球熱帶和亞熱帶地區。

柔弱刺子莞 Gracile Beakrush

Rhynchospora gracillima Thw.

習性：草本。花果期：3-12月。

產地：河背水塘。生於草山潮濕地上。

分佈：廣東、福建。斯里蘭卡、印度、泰國、馬來西亞、熱帶非洲、馬達加斯加、澳大利亞。

日本刺子莞 Malacea Beakrush

†*Rhynchospora malasica* C. B. Clarke
(*Rhynchospora nipponica* Makino)

習性：草本。花果期：5-10月。

產地：大潭水塘。生於河邊沼澤地上。

分佈：廣東、臺灣。日本(琉球群島)、加里曼丹。

刺子莞 Red Beakrush

Rhynchospora rubra (Lour.) Makino

習性：草本。花果期：5-11月。

產地：香港各地。生於路邊、草地、空曠地上。

分佈：廣佈于長江流域以南各省區。亞洲及澳大利亞熱帶地區。

皺果刺子莞 Rugosefruit Beakrush

Rhynchospora rugosa (Vahl) Gale

習性：草本。花果期：5-10月。

產地：大潭、香港仔、城門、青山、榕樹澳、東涌。生於河邊沼澤地或空曠草地上。

分佈：廣西、廣東、江西、福建、臺灣、安徽、江蘇、山東。廣佈於全世界熱帶、亞熱帶地區。

赤箭莎屬 *Schoenus* L.

赤箭莎 Common Bogrush

†*Schoenus falcatus* R. Br.

習性：草本。花果期：5-7月。

產地：大嶼山。生於海岸邊石上或河邊疏林中。

分佈：貴州、廣西、廣東、臺灣。越南、泰國、馬來西亞、新幾內亞、日本(琉球群島)。

蔗草屬 *Scirpus* L.

螢蘭 Rush like Bulrush

Scirpus juncoides Roxb. (*Scirpus erectus* auct. non Poir.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：草本。花果期：8-11月。

產地：鳥溪沙。生於空曠濕地、沼澤地、河

岸邊及稻田中。

分佈：全國除內蒙古、西藏、甘肅外都有分佈。馬達加斯加、亞洲熱帶和亞熱帶地區、大洋洲及北美洲。

海南蘆草 Hainan Bulrush

†**Scirpus hainanensis** S. M. Huang

習性：草本。花果期：6-9月。

產地：大東山。生於溪邊林中。

分佈：海南。

鑽苞蘆草 Coastal Bulrush

†**Scirpus littoralis** Schard. (*Scirpus subulatus* Vahl; *Scirpus supinus* auct. non L.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：草本。花果期：7-10月。

產地：船灣、米埔。生於潮濕草地上。

分佈：海南、廣東、四川、山西、甘肅。印度、大洋洲、非洲及歐洲。

側花蘆草 Lateriflower Bulrush

Scirpus supinus var. **lateriflorus** Gmel.

習性：草本。花果期：8-9月。

產地：香港。生於田野、水旁潮濕地上。

分佈：臺灣、廣東、廣西、雲南。印度、斯里蘭卡、馬來西亞、印度尼西亞和澳大利亞。

百穗蘆草 Ternate Bulrush

Scirpus ternatanus Reinw. ex Miq.

習性：草本。花果期：7-8月。

產地：大潭水塘。生於潮濕草地上、山谷水旁。

分佈：廣東、福建、臺灣。熱帶亞洲和日本琉球群島。

珍珠茅屬 *Scleria* P. Bergius

緣毛珍珠茅 Ciliate Razorsedge

Scleria ciliaris Nees (*Scleria chinensis* Kunth)

習性：草本。花果期：12月至翌年4月。

產地：香港各地。生於疏林中或路邊潮濕地上。

分佈：海南、廣東。緬甸、泰國、越南、馬來西亞、印度尼西亞、澳大利亞熱帶地區。

傘房珍珠茅 Corymbose Razorsedge

Scleria corymbosa Roxb.

習性：草本。花果期：6-12月。

產地：大東山。生於山坡疏林下。

分佈：海南、廣東。印度、斯里蘭卡、緬甸、馬來西亞、印度尼西亞和菲律賓。

圓桿珍珠茅（夏蘭珍珠茅） Harland Razorsedge

Scleria harlandii Hance

習性：草本。花果期：3-9月。

產地：大埔滘、薄扶林、打爛埗頂山（龍脊）。生於疏或密林中。

分佈：海南、廣東。越南、柬埔寨。

疏鬆珍珠茅 Lax Razorsedge

Scleria laxa R. Br.

習性：草本。花果期：6月。

產地：觀塘、東涌。生於山坡草地上。

分佈：廣東、福建。菲律賓和昆士蘭。

毛果珍珠茅 Hairyfruit Razorsedge

Scleria levis Retz.. [*Scleria herbecarpa* Nees; *Scleria herbecarpa* var. *pubescens* (Steud.) C. B. Clarke]

習性：草本。花果期：6-10月。

產地：香港各地。生於疏林中或灌叢中。

分佈：海南、廣東、廣西、四川、貴州、雲南、湖南、浙江、福建、臺灣。印度、斯里蘭卡、馬來西亞、越南、日本、印度尼西亞和澳大利亞。

石果珍珠茅 Cromwell Razorsedge

Scleria lithosperma (L.) Sw.

習性：草本。花果期：6-10月。

產地：香港仔、熨波洲。生於空曠地上、林緣或海濱沙地上。

分佈：海南、廣東。全世界熱帶地區廣佈。

小型珍珠茅 Small Razorsedge

†*Scleria parvula* Steud. (*Scleria biflora* auct. non Roxb.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：草本。花果期：10月。

產地：鯽魚涌。生於沼澤地、空曠潮濕地上。

分佈：廣東、福建。斯里蘭卡、印度、尼泊爾、泰國、越南、日本、朝鮮、菲律賓、新幾內亞及非洲熱帶地區。

皺果珍珠茅 Rugosefruit Razorsedge

†*Scleria rugosa* R. Br. (*Scleria onoei* Franch. & Savat.)

習性：草本。花果期：8-9月。

產地：風門坳。生於沼澤地上、稻田中、路邊潮濕地上。

分佈：廣東、臺灣。斯里蘭卡、印度、日本、馬來西亞及澳大利亞、印度尼西亞、菲律賓。

高桿珍珠茅 Highstalk Razorsedge

Scleria terrestris (L.) Fass. (*Scleria elata* Thw.; *Scleria radula* Hance)

習性：草本。花果期：5-10月。

產地：大帽山、新娘潭。生於次生林中或灌叢中。

分佈：海南、廣東、福建、臺灣、廣西、雲南、四川。泰國、越南、印度、斯里蘭卡、馬來西亞、印度尼西亞及澳大利亞。

358. 禾本科 Gramineae

鳳頭黍屬 *Acroceras* Stapf

鳳頭黍 Colorado-Grass

†*Acroceras munroanum* (Balansa) Henrard

習性：草本。花果期：6-10月。

產地：掃桿埔、大埔滘、大帽山。生於丘陵、山地、林緣、草坡上。

分佈：海南。亞洲熱帶地區。

用途：飼料。

毛穎草屬 *Alloteropsis* ex Presl

臭蟲草 Annual Jet-glumed Grass

Alloteropsis cimicina (L.) Stapf

習性：一年生草本。花果期：9-10月。

產地：九龍。生於疏林下。

分佈：海南。熱帶非洲、印度、緬甸、越南至大洋洲。

毛穎草 Jet-glumed Grass

Alloteropsis semialata (R. Br.) Hitchc.

習性：多年生草本。花果期：春秋。

產地：香港仔、嘉道理農場。生於曠野、丘陵、荒坡。

分佈：廣東、廣西、雲南、福建及臺灣等省區。熱帶非洲、印度、錫金、馬來西亞和大洋洲。

用途：牧草。

看麥娘屬 *Alopecurus* L.

看麥娘 Short-awn Foxtail

Alopecurus aequilis Sobol.

習性：一年生草本。花果期：3-5月。

產地：沙田、上水、大嶼山。生於田邊及潮濕地。

分佈：我國大部分省區。歐亞與北美大陸的寒溫和溫暖地區。

日本看麥娘 Japanese Foxtail

Alopecurus japonicus Steud.

習性：一年生草本。花果期：2-5月。

產地：馬鞍山。生於田邊及濕地。

分佈：廣東、福建、浙江、江蘇、安徽、湖北、山東、陝西等諸省。日本、朝鮮。

鬚芒草屬 *Andropogon* L.

華鬚芒草 Chinese Beardgrass

Andropogon chinensis (Nees) Merr.

習性：多年生草本。花果期：8-12月。

產地：香港島。生於山坡草地、灌叢、疏林等較乾燥之地。

分佈：廣東、廣西、雲南、四川等省區。越

南、老撾、柬埔寨等地。

水蔗草屬 *Apluda* L.

水蔗草 *Glutene-rice* Grass

***Apluda mutica* L.**

習性：多年生草本。花果期：夏秋季。

產地：香港各地。生於田邊、水旁濕地及山坡草叢中。

分佈：華南、西南及臺灣等地。印度、日本、菲律賓、中南半島、東南亞、澳大利亞及熱帶非洲。

楔穎草屬 *Apocopis* Nees

大花楔穎草 *Apocopis*

†***Apocopis wrightii* var. *macrantha* S. L. Chen**

習性：多年生草本。

產地：大帽山、西灣。常生於路邊草叢中。

分佈：廣東、浙江。

三芒草屬 *Aristida* L.

華三芒草屬 *Chinese Three-awn*

***Aristida chinensis* Munro**

習性：多年生草本。花果期：4-12月。

產地：香港各地。多生於山坡草地。

分佈：廣東、廣西、福建、臺灣等地。中南半島。

黃毛草 *Yellow Three-awn*

***Aristida cumingiana* Trin. & Rupr.**

習性：多年生草本。花果期：夏秋季。

產地：香港仔。生於山坡或乾燥草地。

分佈：廣東、湖南、福建、浙江、江蘇。菲律賓、印度。

蓋草屬 *Arthraxon* P. Beauv.

蓋草 *White heart-leaf*

†***Arthraxon hispidus* (Thunb.) Makino**

習性：一年生草本。花果期：8-10月。

產地：香港各地。生於山坡草地陰濕處。

分佈：遍佈全國及東半球的溫暖地區。

用途：牧草。

匿芒蓋草

†***Arthraxon hispidus* var. *cryptatherus* (Hack.) Honda**

習性：一年生草本。

產地：歌賦山、青山。

分佈：遍佈全國及東半球的溫暖地區。

青籬竹屬 *Arundinaria* Michaux

茶稈竹（籬竹） *Tonkin Cane, Tea Stick*
Bamboo

****Arundinaria amabilis* McClure**

習性：喬木狀、散生。

產地：大埔滘有栽培。

分佈：廣東、廣西、湖南、江西、福建。

用途：材用。

托竹 *Cantor Bamboo*

***Arundinaria cantorii* (Munro) L. C. Chia**

習性：喬木狀、散生。

產地：沙田、西貢、大埔滘、青洲及大嶼山。
生於丘陵和山坡。

分佈：海南、廣東、福建、江西。

大明竹 *Daming Bamboo*

†****Arundinaria graminea* (Bean) Munro**

習性：灌木狀、散生。

產地：香港動植物公園有栽培。

分佈：原產日本。廣東、福建、江蘇、浙江、四川、臺灣有栽培。

用途：觀賞。

簕竹 *Ramrod Bamboo*

***Arundinaria hindsii* Munro**

習性：喬木狀、散生。

產地：香港島、道風山、大帽山、梧桐寨、大嶼山。生於丘陵或低山。

分佈：廣東、廣西、福建、臺灣有栽培。

秀英竹 *Shiuying Bamboo*

***Arundinaria shiuyingiana* Chia & But**

習性：喬木狀、散生。

產地：尖山、飛鵝山、馬料水（中文大學校園）。

分佈：香港特有。

野古草屬 *Arundinella* Raddi

石珍芒（石芒草） *Minireed*

Arundinella nepalensis Trin.

習性：多年生草本。花果期：9-11 月。

產地：香港各地。生於山坡草叢中。

分佈：華南、華中、西南和福建等省區。熱帶東南亞至大洋洲、非洲廣泛分佈。

刺芒野古草

Arundinella setosa Trin.

習性：多年生草本。花果期：8-12 月。

產地：沙田、馬料水、果洲群島。生於山坡草地、灌叢及林緣。

分佈：華東、華中、華南及西南各省。亞州熱帶、亞熱帶均有分佈。

蘆竹屬 *Arundo* L.

蘆竹 *Giant Reed*

Arundo donax L.

習性：多年生草本。花果期：10-12 月。

產地：小瀝源、川龍。

分佈：華南、西南和江蘇、浙江、湖南諸省。舊大陸之熱帶地區。

用途：造紙、觀賞。

燕麥屬 *Avena* L.

南燕麥 *South oat*

**Avena meridionalis* (Malz.) Roshev.

習性：一年生草本。花果期：6-9 月。

產地：黃竹坑。生於農田邊。

分佈：新疆。亞洲中部、阿富汗、非洲東部直到美洲。

野燕麥 *Wild oat*

**Avena fatua* L.

習性：一年生草本。花果期：4-9 月。

產地：大龍農場。生於荒蕪田野或田間雜草。

分佈：廣佈於南北各省。歐、亞、非三洲的

溫寒帶地區。

用途：飼料、造紙。

光稈野燕麥 *Glabrous Wild Oat*

†**Avena fatua* var. *glabrata* Peterm.

習性：一年生草本。花果期：4-9 月。

產地：粉嶺。生於山坡草地、路旁及農田中。

分佈：我國南北各省。歐洲及溫暖的亞洲和北非。

燕麥 *Oat*

**Avena sativa* L.

習性：一年生草本。花果期：4-9 月。

產地：掃桿埔、青山。

分佈：東北、華北、西北、西南及廣西、廣東和華中等省區，多為栽培。

用途：糧食、飼料。

地毯草屬 *Axonopus* P. Beauv.

類地毯草 *Carpet Grass*

†**Axonopus affinis* A. Chase

習性：多年生草本。

產地：大龍農場，栽培。

分佈：臺灣有引種。原產熱帶美洲。

用途：牧草。

地毯草 *Carpet Grass*

**Axonopus compressus* (Sw.) Beauv.

習性：多年生匍匐草本。

產地：香港各地。多見栽種於公園草地。

分佈：海南、廣東。原產熱帶美洲，世界熱帶亞熱帶地區有引種。

籐竹屬 *Bambusa* Schreb.

印度籐竹

†**Bambusa bambos* (L.) Voss

習性：喬木狀、叢生。

產地：上水有栽培。

分佈：廣東有栽培。原產印度。

扁竹 *Bian Bamboo*

**Bambusa basihirsuta* McClure

習性：喬木狀、叢生。
產地：大埔滘、掃桿埔有栽培。
分佈：廣東。
用途：材用。

吊絲球竹 Beechey Bamboo

***Bambusa beecheyana** Munro
[*Dendrocalamopsis beecheyana*
(Munro) Keng f. ; *Sinocalanus
beecheyanus* (Munro) McClure]

習性：喬木狀、叢生。
產地：九龍、沙田、大埔滘、大埔、上水、
大嶼山等地有栽培。
分佈：海南、廣東、廣西。
用途：筍用。

粉單竹 White Powdery Bamboo

***Bambusa chungii** McClure
習性：喬木狀、叢生。
產地：城門、沙田、大埔滘有栽培。
分佈：廣東、廣西、湖南、福建。
用途：觀賞、編織。

煥鏞籐竹 Woon-yong Bamboo

***Bambusa chunii** Chia & Fung
習性：喬木狀、叢生。
產地：錦田高埔村。
分佈：香港特有。

牛角竹 Ox-horn Bamboo

***Bambusa cornigera** McClure
習性：喬木狀、叢生。
產地：大埔滘、上水有栽培。
分佈：廣西。

坭籐竹（梢仔竹、長枝仔竹）

***Bambusa dissimulator** McClure
習性：喬木狀、叢生。
產地：上水有栽培。
分佈：廣東。

白節坭籐竹 White Joint Bamboo

†***Bambusa dissimulator** var. **albinodia**
McClure

習性：喬木狀、叢生。
產地：大嶼山東涌有栽培。
分佈：廣東。

長枝竹

***Bambusa dolichoclada** Hayata
習性：喬木狀、叢生。
產地：上水有栽培。
分佈：福建、臺灣。
用途：編織。

大眼竹

***Bambusa eutuldoides** McClure
習性：喬木狀、叢生。
產地：大埔滘、上水等地有栽培。
用途：材用。

小籐竹 Lesser Thorny Bamboo

***Bambusa flexuosa** Murno
習性：喬木狀、叢生。
產地：沙田、粉嶺、大嶼山等地有栽培。
用途：綠籬。

坭竹 Nai Bamboo

***Bambusa gibba** McClure
習性：喬木狀、叢生。
產地：扯旗山、新界、大嶼山等地有栽培。
分佈：廣東、廣西、福建。
用途：綠籬、材用。

魚肚臍竹 Tender Shoot Bamboo

***Bambusa gibboides** W. T. Lin
習性：喬木狀、叢生。
產地：沙田道風山有栽培。
分佈：廣東。
用途：筍用。

黎庵高竹 Lai Am Ko Bamboo

***Bambusa insularis** Chia & Fung (*Bambusa duriuscula* W. T. Lin)

習性：喬木狀、叢生。

產地：大埔滘、上水有栽培。

分佈：海南。

用途：材用。

油籐竹（油刺竹）

***Bambusa lapidea** McClure

習性：喬木狀、叢生。

產地：大埔滘、上水、錦田有栽培。

分佈：廣東、廣西、四川、雲南。

用途：材用。

馬嶺竹 Maling Bamboo

***Bambusa malingensis** McClure

習性：喬木狀、叢生。

產地：大埔滘有栽培。

分佈：海南。

用途：材用。

孝順竹（蓬萊竹） Hedge Bamboo

***Bambusa multiplex** (Lour.) Raeusch.
[*Bambusa glaucescens* (Willd.) Sieb. ex Munro]

習性：喬木狀、叢生。

產地：扯旗山、大埔滘、上水有栽培。

分佈：華南至西南。越南。

用途：觀賞、綠籬。

鳳尾竹 Fernleaf Hedge Bamboo

†***Bambusa multiplex** cv. **Fernleaf**

習性：灌木狀、叢生。

產地：中文大學校園、上水有栽培。

分佈：華南、西南、華東及臺灣各省區。

用途：觀賞。

銀絲竹 Silverstripe Hedge Bamboo

†***Bambusa multiplex** cv. **Silverstripe**
[*Bambusa glaucescens* cv. *Silverstripe*]

習性：喬木狀、叢生。

產地：大埔滘有栽培。

分佈：廣東。

用途：觀賞。

小葉琴絲竹

†***Bambusa multiplex** cv. **Stripestem Fernleaf**

習性：灌木狀、叢生。

產地：西貢蕉坑有栽培。

分佈：廣東、臺灣、四川有栽培。

用途：觀賞。

觀音竹 Riviere Hedge Bamboo, Chinese Goddess Bamboo

***Bambusa multiplex** var. **riviereorum** R. Maire [*Bambusa glaucescens* var. *riviereorum* (R. Maire) Chia & Fung]

習性：灌木狀、叢生。

產地：大嶼山龍仔有栽培。

分佈：華南。

用途：觀賞。

黃竹仔 Lesser Yellow Bamboo

***Bambusa mutabilis** McClure

習性：喬木狀、叢生。

產地：大埔滘有栽培。

分佈：海南。

長毛米篩竹

†***Bambusa pachinensis** var. **hirsutissima** (Odashima) W. C. Lin

習性：喬木狀、叢生。

產地：大埔滘、道風山、大嶼山等地有栽培。

分佈：福建、浙江、臺灣、廣東、廣西。

用途：編織。

撐篙竹 Punting Pole Bamboo

***Bambusa pervariabilis** McClure

習性：喬木狀、叢生。

產地：大埔滘、上水有栽培。

分佈：華南。

用途：材用、觀賞。

木竹 Muk Bamboo

***Bambusa rutila** McClure

習性：喬木狀、叢生。

產地：粉嶺、涌尾有栽培。

分佈：福建、廣東、廣西、四川。

車筒竹 Chinese Thorny Bamboo

***Bambusa sinospinosa** McClure

習性：喬木狀、叢生。

產地：新界各地均有栽培。

分佈：華南、西南。

用途：材用。

青皮竹 Weaver's Bamboo

***Bambusa textilis** McClure

習性：喬木狀、叢生。

產地：大埔滘、觀音山、上水有栽培。

分佈：廣東、廣西。

用途：編織、觀賞。

光稈青皮竹（黃竹） Smooth Weaver's
Bamboo

***Bambusa textilis** var. **glabra** McClure

習性：喬木狀、叢生。

產地：大埔、涌尾有栽培。

分佈：廣東、廣西。

用途：編織、觀賞。

崖州竹 Slender Weaver's Bamboo

***Bambusa textilis** var. **gracilis** McClure

習性：喬木狀、叢生。

產地：新界各地常見栽培。

分佈：廣東、廣西。

用途：觀賞。

青稈竹（花眉竹） Verdant Bamboo

Bambusa tuldoidea Munro (*Bambusa
breviflora* Munro)

習性：喬木狀、叢生。

產地：新界及大嶼山各地常見。生於低丘陵地或溪河兩岸。

分佈：廣東。

用途：材用、編織。

佛肚竹 Buddha Bamboo, Buddha's Belly
Bamboo

***Bambusa ventricosa** McClure

習性：喬木狀、叢生。

產地：扯旗山、香港動植物公園、大埔有栽培。

分佈：廣東。

用途：綠籬或觀賞。

龍頭竹（銀竹、泰山竹） Common Bamboo

***Bambusa vulgaris** Schrad. ex Wendl.

習性：喬木狀、叢生。

產地：香港動植物公園、大埔滘、上水、城門標本林有栽培。

分佈：雲南。亞洲熱帶地區及非洲馬達加斯加。

用途：材用。

黃金間碧竹 Stripe Bamboo, Greenstripe
Common Bamboo

***Bambusa vulgaris** cv. **Vittata** (*Bambusa
vulgaris* var. *striata* Gamble)

習性：喬木狀、叢生。

產地：香港、九龍、新界各地常見栽培。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、福建、臺灣等地有栽培。

用途：觀賞。

大佛肚竹

†***Bambusa vulgaris** cv. **Wamin**

習性：喬木狀、叢生。

產地：公園或庭園有栽培。

分佈：華南、西南、華東、臺灣有栽培。

用途：觀賞。

孔穎草屬 *Bothriochloa* Kuntze

臭根子草 Australian Bluestem

Bothriochloa bladonii (Retz.) S. T. Blake
[*Bothriochloa intermedia* (R. Br.) A. Camus]

習性：多年生草本。花果期：7-10 月。
產地：沙松道、扎山道、香港仔、大埔墟、九龍公園、上水。生於山坡草地。
分佈：華東、華南、西南。非洲、亞洲、大洋洲的熱帶和亞熱帶地區。

光孔穎草

Bothriochloa glabra (Roxb.) A Camus
習性：多年生草本。花果期：7—11 月。
產地：香港各地。生於山坡草地。
分佈：廣東、雲南、臺灣。印度、馬來西亞、菲律賓、澳大利亞和非洲。

白羊草

Bothriochloa ischaemum (L.) Keng
習性：多年生草本。花果期：秋季。
產地：香港各地。生於山坡草地和荒地。
分佈：幾遍全國。全世界亞熱帶和溫帶地區。

孔穎草 Perforated Bothriochloa

†**Bothriochloa pertusa** (L.) A. Camus
習性：多年生草本。花果期：7-10 月。
產地：鯽魚涌。生於山坡草叢中。
分佈：廣東、雲南。印度、菲律賓。

格蘭馬草屬 *Bouteloua* Lagasca

格蘭馬草 Mat grama

***Bouteloua simplex** Lagasca
習性：多年生草本。
產地：大龍農場。
分佈：美洲。
用途：牧草。

臂形草屬 *Brachiaria* Griseb.

信號草 Common Signalgrass, Brood Signalgrass

†**Brachiaria brizantha** (Hochst. ex A. Rich) Stapf
習性：草本。

產地：打鼓嶺。
分佈：廣佈全世界熱帶地區。

巴拉草 Blunt Signalgrass

***Brachiaria mutica** (Forssk.) Stapf
習性：草本。
產地：香港仔、沙田、元朗、南生圍、新田、米埔、船灣、青衣。
分佈：廣佈全世界熱帶。

四生臂形草 Two-spiked Signalgrass

Brachiaria subquadripara (Trin.) Hitchc.
習性：一年生草本。花果期：9-11 月。
產地：香港仔、飛鵝山、道風山。生於丘陵草地、田野、疏林下或沙丘上。
分佈：海南、廣東、廣西、福建、臺灣。印度、澳大利亞。

細柄草屬 *Capillipedium* Stapf

硬稈子草（竹枝細柄草） Hard-stemmed Golden-beard

Capillipedium assimile (Steud.) A. Camus
習性：多年生亞灌木狀草本。花果期：8-12 月。
產地：城門水塘。生於河邊、林中或濕地上。
分佈：華中、華東、廣西、廣東、雲南、西藏等地。印度、中南半島、馬來西亞、印度尼西亞、日本。

細柄草（吊絲草） Smallflower Capillipedium

Capillipedium parviflorum (R. Br.) Stapf
習性：多年生草本。花果期：8-12 月。
產地：香港各地。生於山坡、草地、河邊、灌叢中。
分佈：華東、華中、華南及西南地區。舊大陸之熱帶與亞熱帶地區。

蒺藜草屬 *Cenchrus* L.

蒺藜草 Bur Grass

***Cenchrus echinatus** L. (*Cenchrus ciliaris* auct non L.: Check List HK Pl. 1993.)
習性：一年生草本。花果期：夏季。

產地：薄扶林、大坑、九華徑、沙田、大埔
滘。多生於臨海的砂質草地上。
分佈：海南、雲南、臺灣。日本、印度、緬
甸、巴基斯坦。

假淡竹葉屬 *Centotheca* Desv.

假淡竹葉 Common *Centotheca*

***Centotheca lappacea* (L.) Desv.** [*Centotheca
latifolia* (Osbeck) Trin.]

習性：多年生草本。花果期：6-10 月。

產地：香港各地。

分佈：華南諸省。熱帶非洲、澳大利亞、印
度、馬來西亞。

空竹屬 *Cephalostachyum* Munro

香糯竹 Tinwa Bamboo

†****Cephalostachyum pergracile* Munro**

習性：喬木狀、叢生。

產地：大埔滘有栽培。

分佈：雲南。緬甸。

用途：觀賞。

方竹屬 *Chimonobambusa* Makino

方竹（四方竹）Square Bamboo

****Chimonobambusa quadrangularis* (Fenzi)
Makino**

習性：灌木狀、散生。

產地：香港動植物公園有栽培。

分佈：廣西、湖南、江西、福建、臺灣、江
蘇、安徽等省區。日本。

用途：觀賞。

虎尾草屬 *Chloris* Sw.

孟仁草（虎尾草）Peacock-plume Grass

***Chloris barbata* Sw.**

習性：一年生草本。花果期：3-8 月。

產地：香港各地。

分佈：廣東沿海島嶼。熱帶東南亞。

非洲虎尾草 Rhodesgrass

†****Chloris gayana* Kunth**

習性：多年生草本。

產地：栽培。

分佈：非洲。

臺灣虎尾草 Taiwan *Chloris*

†***Chloris formosana* (Honda) Keng** (*Chloris
virgata* auct. non Sw.: Check List HK
Pl. 1993.)

習性：一年生草本。花果期：8-12 月。

產地：萬宜水庫、大埔滘。海邊沙地。

分佈：福建、臺灣、海南、廣東沿海島嶼。

金鬚茅屬 *Chrysopogon* Trin.

竹節草 Wild Oat Grass

***Chrysopogon aciculatus* (Retz.) Trin.**

習性：多年生草本。花果期：6-10 月。

產地：香港各地。生於向陽貧瘠的山坡草地
或荒野中。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、臺灣。熱
帶大洋洲、亞洲。

薏苡屬 *Coix* L.

薏苡 Job's Tears

***Coix lacryma-jobi* L.**

習性：一年生草本。花果期：6-12 月。

產地：香港各地。生於濕潤的屋旁、池塘、
河溝、山谷、溪澗或易受澇的農田。

分佈：亞洲東南部與太平洋島嶼，世界熱帶-
亞熱帶均種植或逸生。

香茅屬 *Cymbopogon* Spreng.

青香茅 Grey Lemongrass

***Cymbopogon caesius* (Nees ex Hook. & Arn.)
Stapf** (*Cymbopogon mekongensis* auct.
non A. Camus: Check List HK Pl.
1993.)

習性：多年生草本。花果期：7-9 月。

產地：香港各地。生於開闊乾旱的草地。

分佈：廣西、廣東沿海島嶼、雲南及我國沿
海地區。印度、阿富汗、斯里蘭卡、
中南半島、東非、阿拉伯。

用途：香料、牧草。

橘草 Goering Lemongrass

†**Cymbopogon goeringii** (Steud.) A. Camus

習性：多年生草本。花果期：7-10 月。

產地：大嶼山。生於丘陵山坡、草地、荒野和平原路旁。

分佈：華中、華東和河北等省區。日本和朝鮮南部。

扭鞘香茅 Twisted Lemongrass

Cymbopogon hamatulus (Nees ex Hook. & Arn.) A. Camus [*Cymbopogon tortilis* auct. non (J. Presl) Hitchc.; *Cymbopogon goeringii* var. *hongkongensis* auct. non S. Soenarko: Check List HK Pl. 1993.]

習性：多年生草本。花果期：7-10 月。

產地：香港各地。生於草地。

分佈：廣東、海南、臺灣沿海島嶼。太平洋島嶼、越南、菲律賓、馬魯古群島。

亞香茅 Citronella Grass

***Cymbopogon nardus** (L.) Rendle (*Cymbopogon citratus* auct. non Stapf: Check List HK Pl. 1993.)

習性：密叢生大型草本。花果期：11 月至翌年 4 月。

產地：栽培。

分佈：廣東、海南、臺灣。原產斯里蘭卡，熱帶亞洲地區常栽培。

用途：香料。

狗牙根屬 *Cynodon* Rich.

狗牙根 Couch Grass, Doub Grass, Bermuda Grass

Cynodon dactylon (L.) Pers.

習性：多年生草本。花果期：5-10 月。

產地：香港各地。

分佈：廣佈於黃河以南各省，北京也有栽培。歐洲。

用途：飼料、藥用。

星草 Star Grass

***Cynodon plectostachyus** (K. Schum.) Pilger

習性：多年生草本。

產地：栽培。

分佈：歐洲、亞洲的熱帶及亞熱帶。

弓果黍屬 *Cyrtococcum* Stapf

散穗弓果黍 Broad-leaved Bowgrass

Cyrtococcum accrascens (Trin.) Stapf

習性：一年生草本。花果期：5-12 月。

產地：香港各地。生於山地丘陵林下。

分佈：廣西、廣東、湖南、臺灣、雲南、貴州、西藏。印度至馬來西亞，日本南部有分佈。

弓果黍

Cyrtococcum patens (L.) A. Camus

習性：一年生草本。花果期：9 月至翌年 2 月。

產地：香港各地。生於林中或草地陰濕處。

分佈：廣東、廣西、雲南、江西、福建、臺灣。印度。

龍爪茅屬 *Dactyloctenium* Willd.

龍爪茅 Crow-foot Grass

Dactyloctenium aegyptium (L.) Beauv.

習性：一年生草本。花果期：5-10 月。

產地：香港仔、淺水灣、黃竹坑、大帽山、粉嶺、大鴉洲等。生於山坡或草地。

分佈：華南、華東和中南各省。全世界熱帶及亞熱帶地區。

牡竹屬 *Dendrocalamus* Nees

馬來甜龍竹 (高舌竹) Rough *Dendrocalamus*

***Dendrocalamus asper** (J. A. & J. H. Schult.) Backer ex Heyne

習性：喬木狀、叢生。

產地：沙田、青山有栽培。

分佈：雲南、臺灣有栽培。菲律賓、馬來西亞、泰國、印度尼西亞、老撾、緬甸。

用途：筍用、觀賞。

麻竹 Sweet *Dendrocalamus*

***Dendrocalamus latiflorus** Munro

習性：喬木狀、叢生。

產地：沙田、大埔、上水、大嶼山有栽培。

分佈：海南、廣東、廣西、四川、貴州、雲南、福建、臺灣。越南、緬甸。

用途：筍用。

吊絲竹

†***Dendrocalamus minor** (McClure) L. C.

Chia & H. L. Fung

習性：喬木狀、叢生。

產地：大埔滘有栽培。

分佈：廣東、廣西、貴州。

粉麻竹 Powdered Dendrocalamus

***Dendrocalamus pulverulentus** L. C. Chia & But

習性：喬木狀、叢生。

產地：香港動植物公園、大埔滘有栽培。

分佈：廣州有栽培。

用途：觀賞。

牡竹 Male Bamboo

***Dendrocalamus strictus** (Roxb.) Nees

習性：喬木狀、叢生。

產地：香港動植物公園、大埔滘、上水有栽培。

分佈：廣西、雲南。印度、緬甸。

雙花草屬 Dichanthium Willemet

雙花草 Two-flowered Golden-beard

Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf

習性：多年生草本。花期：10月。

產地：香港島、九龍。生於山坡草地。

分佈：廣東、廣西、貴州、雲南、四川、湖北。亞洲東南部、非洲及大洋洲。

馬唐屬 Digitaria Hill.

毛馬唐 Hairy Crabgrass

†**Digitaria chrysoblephara** Fig.

習性：一年生草本。花果期：6-10月。

產地：沙田、長洲。生於路邊、田野。

分佈：福建、安徽、江蘇、河南、山西等省區。全世界亞熱帶和溫帶地區。

升馬唐 Ciliate Crabgrass

Digitaria ciliaris (Retz.) Parl. (*Digitaria setigera* auct. non Roth ex Roem. & Schult.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：一年生草本。

產地：香港各地。生於路旁、荒野、荒坡。

分佈：廣佈於世界熱帶與溫帶。

十字馬唐 Cruciform Crabgrass

Digitaria cruciata (Nees) A. Camus

習性：一年生草本。花果期：6-10月。

產地：香港島。生於山坡草地。

分佈：湖北、四川、貴州、雲南、西藏。印度、錫金、尼泊爾。

纖維馬唐

Digitaria fibrosa (Hack.) Stapf (*Digitaria setifolia* auct. non Stapf: Check List HK Pl. 1993.)

習性：多年生草本。花果期：5—8月。

產地：香港各地。生於山坡、路旁等地。

分佈：廣東、廣西、雲南、四川及我國沿海地區。緬甸、泰國。

亨利馬唐 Henryi Crabgrass

†**Digitaria henryi** Rendle

習性：一年生草本。

產地：扯旗山、九龍。生於山坡草地。

分佈：臺灣、廣西、廣東。越南。

二型馬唐

Digitaria heterantha (Hook. f.) Merr.

習性：一年生草本。花果期：6—10月。

產地：香港各地。生於海濱沙地。

分佈：廣東、福建、臺灣。印度、斯里蘭卡、越南、馬來西亞、印度尼西亞。

長花馬唐 Long-flowered Crabgrass

Digitaria longiflora (Retz.) Pers.

習性：多年生草本。花果期：4-10 月。

產地：香港各地。生於田野草地。

分佈：海南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、湖南、江西、福建、臺灣。東半球熱帶、亞熱帶地區，並已侵入北美熱帶地區。

短穎馬唐 Hispid Crabgrass

†**Digitaria microbachne** (Presl) Henr.

習性：多年生草本。花果期：6-10 月。

產地：跑馬地。生於林緣、曠野。

分佈：廣東、廣西、雲南、福建、臺灣。廣泛分佈於亞洲熱帶地區。

紅尾翎 Root Crabgrass

†**Digitaria radicata** (Presl) Miq.

習性：一年生草本。

產地：香港島、新界。生於丘陵路邊、濕潤草地。

分佈：海南、雲南、福建、臺灣。東半球熱帶、印度、緬甸、菲律賓、馬來西亞、印度尼西亞至大洋洲均有。

馬唐 Hairy Crabgrass

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

習性：一年生草本。花果期：6-9 月。

產地：屯門。生於路旁、曠野。

分佈：西藏、四川、新疆、陝西、甘肅、山西、河北、河南、安徽。廣佈於兩半球的溫帶和亞熱帶山地。

紫馬唐 Violet Crabgrass

†**Digitaria violascens** Link

習性：一年生草本。花果期：7-11 月。

產地：香港各地。生於山坡草地、路邊、荒野。

分佈：華南、華中、西南和河北、山西、陝西、新疆等省區。亞洲及美洲的熱帶地區皆有分佈。

鱸茅屬 *Dimeria* R. Br.

鐮形鱸茅 *Falcate Dimeria*

Dimeria falcata Hack.

習性：草本。花期：10 月。

產地：九龍、新界。生於較潮濕的山坡草地。

分佈：廣東、廣西、福建、臺灣諸省。

細鱸茅 *Falcate Dimeria*

†***Dimeria falcata*** var. ***tenuior*** Keng & Y. L.

Yang

習性：草本。

產地：飛鵝山。

分佈：廣東、廣西、福建。

鱸茅 *Birdley Dimeria*

Dimeria ornithopoda Trin.

習性：一年生草本。花果期：10-11 月。

產地：香港島、新界。生於林間、路邊草地、較陰濕的岩石縫中。

分佈：廣東、廣西、雲南。印度。

華鱸茅 *Chinese Dimeria*

†***Dimeria sinensis*** Rendle

習性：一年生草本。

產地：香港島、新界。生於林間、路邊草地、岩石縫。

分佈：廣東、廣西、福建、江西、安徽、浙江、江蘇。

雙稈草屬 *Diplachne* P. Beauv.

雙稈草 *Common Diplachne*

†***Diplachne fusca*** (L.) P. Beauv.

習性：多年生草本。花果期：6-9 月。

產地：沙田、米埔。多生於潮濕地。

分佈：華南、華東及河南、河北、遼寧、臺灣等省區。從埃及到熱帶非洲及南非，東南亞至澳大利亞。

稗屬 *Echinochloa* P. Beauv.

光頭稗 *Jungle rice*

Echinochloa colona (L.) Link.

習性：一年生草本。花果期：夏秋季。
產地：香港各地。生於田野、園圃、路邊或濕潤地。

分佈：華南、華東、西南及湖北、河南、河北等省區。全世界溫暖地區。

稗 Barnyardgrass

Echinochloa crusgalli (L.) P. Beauv.

習性：一年生草本。花果期：夏秋季。

產地：香港各地。生於沼澤地、溝邊及水稻田中。

分佈：幾遍全國，以及全世界溫暖地區。

用途：飼料。

小果稗

†**Echinochloa crusgalli** var.

austrojaponensis Ohwi (*Echinochloa frumentacea* auct. non Link: Check List HK Pl. 1993.)

習性：一年生草本。

產地：香港島、新界。生於溝邊草地上。

分佈：廣東、廣西、貴州、雲南、湖南、江西、浙江、江蘇、臺灣。日本。

短芒稗 Short-awn Barnyard-grass

†**Echinochloa crusalli** var. **breviseta** (Doell) Neilr.

習性：一年生草本。

產地：粉嶺。生於草地上。

分佈：廣東、臺灣。馬來西亞、印度、斯里蘭卡、熱帶非洲。

孔雀稗 Gulf barnyard Grass

†**Echinochloa cruspavonis** (H. B. & K.) Schult.

習性：草本。

產地：灣仔峽。生於沼澤地或水溝邊。

分佈：海南、廣東、貴州、福建等省。全世界熱帶地區。

用途：飼料。

硬稗

†**Echinochloa glabrescens** Munro ex Hook. f.

習性：草本。

產地：九龍、青山。生於田間水塘邊或濕潤地上。

分佈：江蘇、浙江、四川、貴州、廣西、廣東、雲南。朝鮮、日本、非洲(西內各拉)。

稗屬 Eleusine Gaertn.

稗 Finger Millet, Kurakkan

Eleusine coracana (L.) Gaertn.

習性：一年生草本。花果期：5-9月。

產地：栽培。

分佈：長江以南及安徽、河南、陝西、西藏等省區有栽培。廣泛栽培於東半球熱帶至亞熱帶地區。

用途：食用、釀造、；飼料、造紙、編織。

牛筋草 Goose Grass

Eleusine indica (L.) Gaertn.

習性：一年生草本。花果期：6-10月。

產地：香港各地。

分佈：我國南北各省區。全世界熱帶和亞熱帶地區。

用途：飼料、藥用。

腸鬚草屬 Enteropogon Nees

腸鬚草

†**Enteropogon dolichostachyus** (Lagasca) Keng

習性：多年生草本。花果期：8-10月。

產地：大鵬灣半洲。多生於曠野草地或海邊。

分佈：臺灣、雲南、海南等地。自阿富汗經印度、緬甸至熱帶東南亞。

畫眉草屬 Eragrostis Wolf

鼠婦草 Thalia Lovegrass

Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin.

習性：多年生草本。

產地：香港島、新界。多生於路邊和溪旁。

分佈：廣東、廣西、貴州、雲南、四川。亞

洲的熱帶和亞熱帶地區。

秋畫眉草 Autumn Lovegrass

†**Eragrostis autumnalis** Keng (*Eragrostis perennans* auct. non Keng.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：一年生草本。花果期：7-11月。

產地：川龍。生於路旁草地。

分佈：江西、福建、安徽、江蘇、河北、山東。

彎葉畫眉草 Oulandgrass, Weeping love grass

†**Eragrostis curvula** (Schrad.) Nees

習性：多年生草本。

產地：米埔、城門。

分佈：江蘇、湖北、廣西有栽培。原產非洲。

用途：牧草；觀賞。

佛歐里畫眉草 Fauriei Lovegrass

†**Eragrostis fauriei** Ohwi (*Eragrostis stenophylla* auct. non Hack.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：多年生草本。

產地：香港仔、西貢。

分佈：臺灣。

知風草 Wind grass

†**Eragrostis ferruginea** (Thunb.) P. Beauv.

習性：多年生草本。

產地：清水灣。生於路旁、山坡草地。

分佈：南北各地。朝鮮、日本、東南亞等地。

用途：藥用。飼料。

亂草 Japanese Lovegrass

Eragrostis japonica (Thunb.) Trin.

習性：一年生草本。

產地：香港島、新界。生於田野、路旁、河邊及潮濕地。

分佈：廣東、雲南、江西、安徽、浙江、湖北、臺灣。印度、日本、韓國、澳大

利亞、非洲。

無毛畫眉草 Beardless Indian Lovegrass

Eragrostis pilosa var. **imberbis** Franch. [*Eragrostis pilosa* auct. non (L.) P. Beauv.: Check List HK Pl. 1993.]

習性：一年生草本。花果期：8-11月。

產地：香港仔、黃泥涌。多生於田野路旁或草地上。

分佈：東北、華北、華南、長江流域各省。日本。

用途：飼料。

多毛知風草 Manyhairy Lovegrass

Eragrostis pilosissima Link

習性：多年生草本。花果期：8月。

產地：香港各地。多生於乾燥山坡或草地。

分佈：廣東、福建、臺灣、江西。東南亞。

扭枝畫眉草

Eragrostis reflexa Hack.

習性：一年生草本。花果期：7-9月。

產地：香港各地。喜生於砂質草地。

分佈：廣東、廣西、福建。菲律賓群島。

†**Eragrostis spartinoides** Steud.

習性：草本。

產地：新界、香港中文大學。

分佈：全世界溫帶與熱帶地區。

鯽魚草 Japanese Lovegrass

Eragrostis tenella (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult.

習性：一年生草本。花果期：4-8月。

產地：香港各地。生於田野或陰蔽處。

分佈：廣東、廣西、湖北、福建、臺灣。東半球熱帶地區。

用途：牧草、藥材。

牛虱草 Chinese Lovegrass

Eragrostis uniolooides (Retz.) Nees ex Steud.

習性：一年生或多年生草本。花果期：7-10月。

產地：香港各地。生於荒山、草地、庭院、路旁等地。

分佈：華南各地和雲南、江西、福建、臺灣等省。亞洲和非洲的熱帶地區。

長畫眉草 Elongated Lovegrass

Eragrostis zeylanica Nees & Mey.

習性：多年生草本。花期：春季。

產地：香港島。生態適應性廣。

分佈：華東、華南、西南。東南亞、大洋洲。

蜈蚣草屬 *Eremochloa* Büse

蜈蚣草 Ciliate Centipedegrass

Eremochloa ciliaris (L.) Merr.

習性：多年生草本。花果期：夏秋季。

產地：香港各地。生於山坡、路旁草叢中。

分佈：雲南、貴州、廣西、廣東、海南、福建。印度、緬甸、中南半島。

假儉草 Common Centipedegrass

Eremochloa ophiuroides (Munro) Hack.

習性：多年生草本。花果期：夏秋季。

產地：香港島、新界。生於潮濕草地及河岸、路旁。

分佈：華南、華東及湖南、湖北、貴州等省區。中南半島。

馬陸草 Zeyland Centipedegrass

Eremochloa zeylanica Hack.

習性：多年生草本。花果期：夏秋季。

產地：香港各地。生於丘陵、路旁或草叢中。

分佈：廣西、雲南。中南半島、印度、斯里蘭卡。

鷓鴣草屬 *Eriachne* R. Br.

鷓鴣草 Common Eriachne

Eriachne pallescens R. Br.

習性：多年生草本。花果期：夏秋季。

產地：香港各地。生於乾燥山坡、松林樹下和濕潤草地上。

分佈：廣東、廣西、福建。印度、馬來西亞、澳大利亞。

用途：飼料。

金茅屬 *Eulalia* Kunth

四脈金茅 Fournerved Eulalia

Eulalia quadrinervis (Hack.) Kuntze

習性：多年生草本。花果期：8-10月。

產地：香港各地。常生於山坡草地。

分佈：華中、華南、華東、西南。非洲、印度、日本、菲律賓。

用途：燃料、造紙。

棕茅 Brown Eulalia

Eulalia phaeothrix (Hack.) Kuntze

習性：多年生草本。花果期：8-10月。

產地：觀塘。常生於草地。

分佈：海南。印度和中南半島。

金茅

Eulalia speciosa (Debeaux) Kurtz

習性：多年生草本。花果期：8—11月。

產地：**地點不詳**。生於山坡草地。

分佈：華南、華中、西南、華東等地。朝鮮與印度。

耳稈草屬 *Garnotia* Brongn.

無芒耳稈草 Mutica Garnotia

Garnotia mutica (Munro) Druce

習性：多年生草本。花果期：9-10月。

產地：香港。生於林下、山谷的潮濕地。

分佈：廣東、廣西等省區。

耳稈草

Garnotia patula (Munro) Benth.

習性：多年生草本。花果期：秋季。

產地：馬鞍山、火炭。

分佈：廣東、廣西、福建。中南半島。

三芒耳稈草

Garnotia trisetata Hitchc.

習性：多年生草本。花果期：9—10月。

產地：香港。生於丘陵山地潮濕處。

分佈：廣東、廣西等省區。

巨竹屬 *Gigantochloa* Kurz ex Munro

黑毛巨竹 Blackhair Giantgrass

**Gigantochloa nigrociliata* (Büse) Kurz

習性：喬木狀、叢生。

產地：香港大學校園有栽培。

分佈：雲南、亞洲東南部。

用途：觀賞。

花巨竹 Greater Giantgrass

**Gigantochloa pseudoarundinacea* (Steud.)

Widjaja (*Gigantochloa maxima* Kurz)

習性：喬木狀、叢生。

產地：香港大學校園有栽培。

分佈：雲南。亞洲東南部。

用途：觀賞。

球穗草屬 *Hackelochloa* Kuntze

球穗草 Pitscalegrass

Hackelochloa granularis (L.) Kuntze

習性：一年生草本。花果期：自夏季至初冬。

產地：粉嶺、蒲台島。生於路邊草叢和山坡上。

分佈：廣東、廣西、貴州、雲南、四川、福建、臺灣。全球熱帶均有分佈。

用途：飼料。

牛鞭草屬 *Hemarthria* R. Br.

扁穗牛鞭草 Flattened Hemarthria

Hemarthria compressa (L. f.) R. Br.

習性：多年生草本。花果期：夏秋季。

產地：香港仔、城門。生於田野、路邊濕潤處。

分佈：廣東、廣西、雲南。印度、中南半島。

假蛇尾草屬 *Heteropholis* C. E.

Hubb.

假蛇尾草 Cochinchina *Thaumastochloa*

†*Heteropholis cochinchinensis* (Lour.) C. E.

Hubb. (*Ophiuros cochinchinensis* Merr.;

Thaumastochloa cochinchinensis C. E.

Hubb.; *Ophiuros monostachyus* auct. non Presl: Check List HK Pl. 1993.)

習性：多年生草本。

產地：香港島。生於路旁草叢中。

分佈：海南、廣東、廣西、福建、臺灣。印度、中南半島、菲律賓。

黃茅屬 *Heteropogon* Pers.

黃茅 Tanglehead, Contorted Tanglehead

Heteropogon contortus (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult.

習性：多年生草本。花果期：4-12月。

產地：香港各地。生於山坡草地。

分佈：華南、華東、華中、西南及河南、陝西、甘肅等省區。全世界溫暖地區皆有。

用途：牧草、造紙、清涼劑。

大麥屬 *Hordeum* L.

大麥 Barley

**Hordeum vulgare* L.

習性：一年生草本。

產地：栽培。

分佈：我國各地均有栽培。

用途：糧食。

膜稈草屬 *Hymenachne* P. Beauv.

膜稈草

Hymenachne acutigluma (Steud.) Gill.

習性：多年生草本。花果期：夏秋季。

產地：地點不詳。生於河邊、沼澤淺水處。

分佈：海南、雲南。印度、緬甸、泰國。

苞茅屬 *Hyparrhenia* Andress. ex

Fourn.

短梗苞茅 Eberhardt *Hyparrhenia*

†*Hyparrhenia diplandra* (Hack.) Stapf

習性：多年生草本。花果期：8-11月。

產地：青山。

分佈：廣西、廣東、雲南。熱帶非洲、中南半島、印度尼西亞。

距花黍屬 *Ichnanthus* P. Beauv.

距花黍 Scargrass

Ichnanthus vicinus (Bail.) Merr.

習性：匍匐草本。花果期：8-11 月。

產地：扯旗山、大帽山、井欄樹。生於山坡草地及灌叢中。

分佈：廣東、廣西、雲南、江西、湖南、福建、臺灣。亞洲、大洋洲、南美洲熱帶地區。

用途：飼料。

白茅屬 *Imperata* Cyrillo

絲茅 Lalang Grass

†***Imperata koenigii*** (Retz.) P. Beauv.

[*Imperata cylindrica* auct. non (L.) P.

Beauv.: Check List HK Pl. 1993.]

習性：多年生草本。花果期：5-8 月。

產地：香港各地。生態適應性強。

分佈：華南、華東、華中、西南和河南、陝西等省區。東半球熱帶和溫帶地區。

箬竹屬 *Indocalamus* McClure

粽巴箬竹（光籐箬竹） Herklots Cane

Indocalamus herklotsii McClure

習性：灌木狀、散生。

產地：扯旗山、馬鞍山、大嶼山。生於疏林下或灌叢中。

分佈：廣東。

箬葉竹 Long-ear Cane

Indocalamus longiauritus Hand.-Mazz.

習性：灌木狀、散生。

產地：大帽山。生於林下或灌叢中。

分佈：廣東、廣西、貴州、湖南、江西、福建、河南。

水銀竹（華箬竹）

Indocalamus sinicus (Hance) Nakai

(*Arundinaria sinica* Hance)

習性：灌木狀、散生。

產地：香港各地常見。生於疏林或灌叢。

分佈：海南、廣東。

鴨嘴草屬 *Ischaemum* L.

鴨嘴草 Duck-beakgrass

Ischaemum aristatum var. ***glaucum*** (Honda)

T. Koyama (*Ischaemum fieldingianum* auct. non Rendle: Check List HK Pl. 1993.)

習性：多年生草本。花果期：7-10 月。

產地：香港各地。常生於水邊濕地。

分佈：福建、江蘇、浙江。日本。

粗毛鴨嘴草 Meygen Duck-grass

Ischaemum barbatum Retz.

習性：多年生草本。花果期：夏秋季。

產地：香港各地。生於山坡草地。

分佈：華東、華北、華中、華南、西南。南亞至東南亞。

細毛鴨嘴草 Indian Duck-beak grass

Ischaemum indicum (Houtt.) Merr.

習性：多年生草本。

產地：香港各地。生於山坡草叢和路旁及曠野草地。

分佈：廣東、廣西、雲南、福建、浙江、臺灣。印度、中南半島、東南亞各國。

用途：飼料。

無芒鴨嘴草 Mutica Duck-grass

Ischaemum muticum L.

習性：多年生草本。花果期：夏秋季。

產地：香港有記錄。生於海岸各地。

分佈：臺灣。南亞至東南亞。

田間鴨嘴草 Wrinkled Duck Beak

Ischaemum rugosum Salisb.

習性：一年生草本。花果期：夏秋季。

產地：地點不詳。多生於田邊路旁濕潤處。

分佈：廣東、廣西、雲南、湖南、臺灣。印度、中南半島及東南亞各國。

柳葉箬屬 *Isachne* R. Br.

白花柳葉箬

***Isachne albens* Trin.**

習性：多年生草本。花果期：夏秋季。

產地：地點不詳。生於山坡、谷地、溪邊或林緣草地中。

分佈：廣東、廣西、雲南、貴州、四川、福建、臺灣。熱帶亞洲。

***Isachne firmula* Büse**

習性：草本。

產地：大帽山。

分佈：熱帶和亞熱帶地區。

柳葉箬 *Globose Zo-sasa*

***Isachne globosa* (Thunb.) Kuntze**

習性：多年生草本。花果期：夏秋季。

產地：香港各地。生於緩坡、平原草地上。

分佈：華南、華東、華中、西南和河南、河北、陝西、遼寧等省區。日本、印度、馬來西亞、菲律賓、太平洋諸島、大洋洲。

李氏禾屬 *Leersia* Swartz

李氏禾 *Clubhead Cutgrass*

***Leersia hexandra* Swartz**

習性：多年生草本。花果期：夏秋季。

產地：香港各地。生於水邊、沼澤濕地或溝渠中。

分佈：海南、福建、臺灣。全世界之熱帶。

千金子屬 *Leptochloa* P. Beauv.

千金子 *Chinese Sprangletop*

***Leptochloa chinensis* (L.) Nees**

習性：一年生草本。花果期：8-11月。

產地：香港各地。生於潮濕之地。

分佈：華東、華中、華南、四川、貴州、陝西。舊大陸溫暖區域。

蟻子草 *Thread Sprangletop*

***Leptochloa panicea* (Retz.) Ohwi**

習性：一年生草本。

產地：新界。多生於田野路邊和園圃。

分佈：華南、華東、華中、西南及陝西等省區。全球的熱帶和亞熱帶地區。

黑麥草屬 *Lolium* L.

黑麥草 *Perennial Ryegrass*

†****Lolium perenne* L.**

習性：多年生草本。

產地：鶴咀、井欄樹。

分佈：我國引種。原產歐洲。

淡竹葉屬 *Lophatherum* Brong

淡竹葉 *Common Lophantherum*

***Lophatherum gracile* Brongn.**

習性：多年生草本。花果期：6-10月。

產地：香港各地。

分佈：長江流域和華南、西南諸省。新幾內亞、印度、馬來西亞、日本。

用途：藥用、牧草。

糖蜜草屬 *Melinis* P. Beauv.

糖蜜草 *Molasses Grass*

****Melinis minutiflora* P. Beauv.**

習性：草本。

產地：掃桿埔、油塘灣。

分佈：四川有栽培。原產巴西。

梨竹屬 *Melocanna* Trin.

梨竹 *Muli*

****Melocanna arundina* C. E. Parkinson**

[*Melocanna baccifera* (Roxb.) Kurz]

習性：小喬木狀、散生。

產地：香港動植物公園、上水有栽培。

分佈：廣東、臺灣有栽培。印度、孟加拉、緬甸。

用途：觀賞。

莠竹屬 *Microstegium* Nees

剛莠竹 *Ciliate Microstegium*

***Microstegium ciliatum* (Trin.) A. Camus**

習性：多年生蔓生草本。花果期：9-12月。

產地：香港各地。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、四川、江西、福建、臺灣。印度、緬甸、泰國、印度尼西亞爪哇、馬來西亞。

莠竹 Beardless *Microstegium*

†*Microstegium nodosum* (Kom.) Tzvelev

習性：一年生蔓生草本。

產地：沙田。

分佈：吉林、山西、陝西、江蘇、廣東、四川、雲南。印度、朝鮮、日本、俄羅斯。

蔓生莠竹 Vagabondage *Microstegium*

Microstegium vagans (Nees ex Steud.) A. Camus

習性：多年生草本。花果期：8-10月。

產地：馬鞍山。

分佈：海南、廣東、雲南。印度、緬甸、泰國、印度尼西亞爪哇、馬來西亞。

芒屬 *Miscanthus* Anderss.

芒 Chinese Silvergrass

Miscanthus sinensis Anderss

習性：多年生草本。花果期：7-12月。

產地：香港各地。生於山坡丘陵和荒坡原野。

分佈：華南、華東、西南各省區。朝鮮、日本。

五節芒 Manyflower Silvergrass, Japanese Silvergrass

Miscanthus floridulus (Labill) Warb. ex Schum. & Lauterb.

習性：多年生草本。

產地：香港各地。生於撈荒地和山坡草地。

分佈：海南、廣東、廣西、福建、浙江、江蘇、臺灣。自亞洲東南部太平洋諸島嶼至波利尼西亞。

用途：飼料、造紙、藥用。

毛儉草屬 *Mnesithea* Kunth

毛儉草

Mnesithea mollicoma (Hance) A. Camus

習性：多年生草本。花果期：秋季。

產地：地點不詳。生於草地和灌叢中。

分佈：海南、廣東、廣西。中南半島。

河八王屬 *Narenga* Bor

金貓尾 *Narenga*

†*Narenga fallax* (Balansa) Bor

習性：多年生草本。花果期：8-10月。

產地：大埔滘。生於山坡草地。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南。亞洲東南部熱帶地區。

類蘆屬 *Neyraudia* Hook. f.

類蘆 (石珍茅) *Burmareed*

Neyraudia reynaudiana (Kunth) Keng ex Hitchc.

習性：多年生草本。花果期：8-12月。

產地：香港各地。生於潮濕堤岸旁或溪邊。

分佈：長江流域以南各地。

用途：燃料、觀賞、固堤。

球米草屬 *Oplismenus* P. Beauv.

竹葉草 Composite *Oplismenus*

Oplismenus compositus (L.) P. Beauv.

習性：草本。

產地：香港各地。生於疏林下陰濕處。

分佈：我國華南和西南諸省。全球熱帶地區。

稻屬 *Oryza* L.

稻 Rice

**Oryza sativa* L.

習性：一年生草本。

產地：栽培。

分佈：全世界廣為栽培。

用途：糧食。

露籽草屬 *Ottochloa* Dandy

小花露籽草 Malabar *Ottochloa*

Ottochloa malabarica (L.) Dandy. [*Ottochloa nodosa* var. *micrantha* (Balansa) Keng f.; *Ottochloa nodosa* auct. non (Kundosa) Dandy: Check List HK Pl. 1993.]

習性：蔓生草本。
產地：香港各地。生於山谷、林邊濕地。
分佈：廣東、廣西、雲南、福建、臺灣。印度、斯里蘭卡、緬甸、馬來西亞、菲律賓。

黍屬 *Panicum* L.

短葉黍 Panic Grass

***Panicum brevifolium* L.**

習性：一年生草本。
產地：香港各地。多生於陰濕地和林緣。
分佈：福建、廣東、廣西、貴州、江西、雲南。非洲和亞洲熱帶地區。

藤竹草

***Panicum incommutatum* Trin.** (*Panicum sarmentosum* auct. non Roxb.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：多年生草本。
產地：銅鑼灣、鳳園、長洲。生於林地草叢中。
分佈：廣東、廣西、雲南、江西、福建和臺灣。印度、馬來西亞、菲律賓、印度尼西亞。

大黍 Guineagrass

****Panicum maximum* Jacq.**

習性：多年生草本。
產地：香港各地。
分佈：原產非洲熱帶地區。我國廣東、臺灣等地有栽培作飼料、並有逸生。

心葉稷 (山黍) Vine Panic Grass

***Panicum notatum* Retz.**

習性：多年生草本。
產地：新界。常生於林緣。
分佈：廣東、廣西、雲南、西藏、福建和臺灣。菲律賓、印度尼西亞。

水生黍 Aquatic Panic Grass

***Panicum paludosum* Roxb.**

習性：多年生草本。

產地：新界。多生於靜水或池邊淤泥中。
分佈：廣東、廣西、福建、臺灣、雲南。印度、馬來西亞及大洋洲。

鋪地黍 Panic Grass

***Panicum repens* L.**

習性：多年生草本。
產地：香港各地。生於海邊、溪邊以及潮濕之處。
分佈：中國東南各地。廣佈世界熱帶和亞熱帶。

雀稷屬 *Paspalum* L.

兩耳草 Hilo Grass

****Paspalum conjugatum* Berg.**

習性：多年生草本。花果期：5-9月。
產地：香港各地。生於田野、林緣、潮濕草地。
分佈：海南、廣西、雲南、臺灣。全世界熱帶及溫暖地區有分佈。
用途：飼料。

毛花雀稷

****Paspalum dilatatum* Poir.**

習性：多年生草本。花果期：5-7月。
產地：新界。生於路旁草地。
分佈：湖北、浙江、江蘇、臺灣。全世界熱帶和溫暖地區。
用途：飼料、牧草。

長葉雀稷

***Paspalum longifolium* Roxb.**

習性：多年生草本。
產地：蓮塘尾。生於潮濕山坡田邊。
分佈：廣東、廣西、雲南、臺灣。印度、馬來西亞至大洋洲及日本。

雙穗雀稷 Knotgrass

***Paspalum paspaloides* (Michx.) Scribn.** (*Paspalum distichum* auct. non L.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：多年生草本。

產地：香港各地。生於田野路旁。
分佈：海南、廣西、雲南、湖北、江蘇、臺灣。世界熱帶和亞熱帶地區均有分佈。
用途：優良牧草。

圓果雀稗 Ditch Millet

Paspalum orbiculare Forst

習性：多年生草本。
產地：香港各地。生於荒坡、路旁、草地及田邊。
分佈：華南、華東和雲南、貴州等省區。亞洲東南部至大洋洲。

鴨嘴草 India Paspalum, Kodo Millet

Paspalum scrobiculatum L.

習性：多年生或一年生草本。
產地：香港各地。生於路旁草地或低濕處。
分佈：海南、廣西、雲南、臺灣。全世界熱帶地區。
用途：飼料、作物。

絲毛雀稗 Ditch Millet

***Paspalum urvillei** Steud.

習性：多年生草本。花果期：5-10月。
產地：香港島、新界。生於路邊和荒地。
分佈：臺灣引種。原產巴西；世界較溫暖的地區已歸化。

海雀稗 Ditch Millet

†**Paspalum vaginatum** Sw.

習性：多年生草本。花果期：6-9月。
產地：香港各地。
分佈：海南、雲南、臺灣。全世界熱帶亞熱帶地區。

狼尾草屬 *Pennisetum* Rich.

狼尾草 Plume Grass

Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng.

習性：多年生草本。
產地：香港各地。生於田岸、荒地、道旁及小山坡上。
分佈：東北、華北、華東、西南各省。熱帶

亞洲及東南亞地區。

用途：作編織及造紙的原料。

御穀 American Pennisetum

†***Pennisetum mezianum** Leeke

習性：一年生草本。
產地：栽培。
分佈：原產非洲、亞洲和美洲引種。我國河北有栽培。
用途：牧草、食用。

多穗狼尾草 Missiongrass

***Pennisetum polystachyon** (L.) Schult.

習性：多年生草本。
產地：新界。
分佈：原產非洲，現廣佈於熱帶地區。
用途：飼料。

象草（紫狼尾草） Napier Grass

***Pennisetum purpureum** Schum.

習性：多年生草本。
產地：栽培。
分佈：廣東、廣西、雲南、四川、江西有引種。原產非洲，引種至印度、緬甸、大洋洲及美洲。
用途：優良飼料。

茅根屬 *Perotis* Ait.

茅根

Perotis indica (L.) Kuntze

習性：一年生草本或多年生草本。花果期：夏秋季。
產地：香港。生於濕潤草地上。
分佈：海南、廣東、臺灣。東南亞。

大花茅根 Large-flower Perotis

Perotis macrantha Honda [*Perotis indica* auct. non (L.) Kuntze: Check List HK Pl. 1993.]

習性：一年生或多年生草本。花果期 6-11月。
產地：深水灣、西貢大灣。生於潮濕的海邊平原或沙土草地。

分佈：我國東南沿海一帶，東南至臺灣、南至海南。

藹草屬 *Phalaris* L.

藹草 Canarygrass

**Phalaris canariensis* L.

習性：多年生草本。

產地：清水灣。生於林下、潮濕草地或水濕處。

分佈：全國各地（歸化）。原產馬達加斯加及非洲北部，在世界各地廣泛歸化。

用途：飼料、造紙。

蘆葦屬 *Phragmites* Trin.

蘆葦 Common Redgrass

Phragmites australis (Cav.) Steud.
(*Phragmites communis* Trin.)

習性：多年生草本。

產地：新界、大嶼山。生於海灘、河岸和池沼。

分佈：全球廣佈。

卡開蘆 Karka Reed

Phragmites karka (Retz.) Trin. ex Steud.

習性：多年生草本。

產地：米埔、大嶼山、青山。生於海灘、河岸、池沼及路旁濕潤處。

分佈：我國南部、西部。亞洲熱帶地區、澳大利亞北部。

用途：固堤、觀賞、造紙。

剛竹屬 *Phyllostachys* Sieb. & Zucc.

人面竹（羅漢竹） Fishpole Bamboo

**Phyllostachys aurea* A. & C. Riviere

習性：小喬木狀、散生。

產地：嘉道理農場有栽培。

分佈：黃河流域以南各省區。

用途：觀賞。

桂竹 Timber Bamboo

**Phyllostachys bambusoides* Sieb. & Zucc.

習性：喬木狀、散生。

產地：扯旗山、香港動植物公園、大嶼山昂平有栽培。

分佈：黃河流域以南各省區。

用途：觀賞。

筠竹

**Phyllostachys glauca* f. *yunzhu* J. L. Lu

習性：小喬木狀、散生。

產地：大嶼山龍仔有栽培。

分佈：山西、陝西、河南等省。

用途：觀賞。

篔簹竹（白筍竹、花竹） Broom Bamboo

Phyllostachys nidularia Munro

習性：灌木狀、散生。

產地：西貢、馬鞍山、梅子林、茅坪、沙田、大埔、大帽山、大嶼山等地。生於灌叢、林下。

分佈：長江流域以南各省區。

用途：筍用。

紫竹 Black Bamboo

**Phyllostachys nigra* (Lodd. ex Lindl.) Munro

習性：灌木狀或小喬木狀、散生。

產地：香港動植物公園、中文大學校園、嘉道理農場、大嶼山龍仔有栽培。

分佈：我國南北各省區均有栽培。

用途：觀賞。

綠皮黃筋竹

**Phyllostachys sulphurea* cv. *Houzeau*

[*Phyllostachys viridis* cv. *Houzeau*]

習性：小喬木狀、散生。

產地：大嶼山龍仔有栽培。

分佈：山東、江蘇、浙江、江西、河南。

用途：觀賞。

烏哺雞竹 Elegant Bamboo

**Phyllostachys vivax* McClure

習性：喬木狀、散生。

產地：大嶼山龍仔有栽培。

分佈：江蘇、浙江。

早熟禾屬 *Poa* L.

早熟禾 Annual Bluegrass

Poa annua L.

習性：一年生或二年生草本。

產地：沙田。生於路邊、河邊及溝邊的陰濕處。

分佈：全國各地。全球性雜草。

用途：飼料。

金髮草屬 *Pogonatherum* P. Beauv.

金絲草 Crinite *Pogonatherum*

Pogonatherum crinitum (Thunb.) Kunth

習性：多年生草本。

產地：香港各地。生於田埂山地、路旁、河邊、溪邊、石縫貧瘠土或灌木下濕潤地。

分佈：華南、華中、華東、西南各省區。日本、中南半島、印度。

用途：藥用、牧草。

棒頭草屬 *Polypogon* Desf.

長芒棒頭草

Polypogon monspeliensis (L.) Desf.

習性：一年生草本。花果期：5—10月。

產地：香港。生於潮濕地及淺流水中。

分佈：全國各地。廣佈於世界熱帶和溫帶地區。

單序草屬 *Polytrias* Hack.

單序草

**Polytrias indica* (Houtt.) Veldk. (*Polytrias amaura* Kuntze)

習性：多年生草本。

產地：跑馬地、淺水灣。生於向陽的砂石草坡上。

分佈：亞洲東南部。

假金髮草屬 *Pseudopogonatherum* A. Camus

筆草 *Pseudopogonatherum*

Pseudopogonatherum contortum (Brongn.)

A. Camus

習性：一年生草本。

產地：中文大學校園。多生於山坡草地。

分佈：自越南經馬來西亞至大洋洲。

刺葉假金髮草

Pseudopogonatherum setifolium (Nees) A. Camus

習性：一年生草本。

產地：沙田、粉嶺。生於山坡和路旁。

分佈：華南、華東和雲南。馬來西亞及印度尼西亞。

矢竹屬 *Pseudosasa* Makino ex Nakai

矢竹 Arrow Bamboo

**Pseudosasa japonica* (Sieb. & Zucc.) Makino ex Nakai

習性：灌木狀、散生。

產地：香港動植物公園有栽培。

分佈：原產日本。

用途：觀賞。

紅毛草屬 *Rhynchelytrum* Nees

紅毛草 Creeping *Rhynchelytrum*

Rhynchelytrum repens (Willd.) Hubb.

習性：多年生草本。

產地：香港各地。

分佈：我國廣東、廣西、臺灣等省有引種。原產南非。

筒軸茅屬 *Rottboellia* L. f.

筒軸茅 Itchgrass

Rottboellia exaltata L. f. [*Rottboellia chinensis* (Lour.) W. Clayton]

習性：一年生草本。

產地：香港各地。生於田野、路旁草叢中。

分佈：華南、西南和福建、臺灣等省區。熱帶非洲、亞洲、大洋洲。

甘蔗屬 *Saccharum* L.

斑茅 (大密) Reedlike Sugarcane

Saccharum arundinaceum Retz.

習性：多年生草本。

產地：香港各地。

分佈：華南、華中、華東和陝西南部。印度、緬甸、泰國、越南、馬來西亞。

用途：飼料。

甘蔗 Sugar Cane

***Saccharum officinarum** L.

習性：多年生草本。

產地：栽培。

分佈：原產印度，現廣泛栽培於全世界熱帶和亞熱帶地區。

用途：制糖、造紙等的原料。

甜根子草（割手密） Wild Cane

Saccharum spontaneum L.

習性：多年生草本。

產地：香港各地。生於平原和山坡，河邊溪流岸邊，礫石沙灘荒洲上。

分佈：熱帶至亞熱帶的廣大區域。

用途：造紙、飼料。

囊穎草屬 *Sacciolepis* L.

囊穎草（滑草） Indian Cupscale

Sacciolepis indica (L.) A. Chase

習性：一年生草本。

產地：香港各地。常見於稻田邊、林下等地。

分佈：華東、華南、西南、中南各省區。印度至日本及大洋洲。

赤竹屬 *Sasa* Makino & Shibata

菲黃竹

***Sasa auricoma** E. G. Camus

習性：矮小灌木狀、散生。

產地：香港公園有栽培。

分佈：廣東、廣西、浙江、江蘇有栽培。原產日本。

用途：觀賞。

光笹竹 Subglabrous Cane

†**Sasa subglabra** McClure

習性：灌木狀、散生。

產地：火炭。生於丘陵。

分佈：香港特有。

裂稈草屬 *Schizachyrium* Nees

裂稈草 *Schizachyrium*

Schizachyrium brevifolium (Sw.) Nees ex Büse

習性：一年生草本。花果期：7—12月。

產地：香港各地。生於山坡草地。

分佈：全國各地。廣佈於全世界溫暖地區。

紅裂稈草 *Sanguine Schizachyrium*

Schizachyrium sanguineum (Retz.) Alston

習性：多年生草本。

產地：香港各地。生於山坡、路旁的陰濕處。

分佈：廣東、廣西、雲南、四川、西藏、江西、福建。印度、緬甸、斯里蘭卡、馬來西亞。

思筭竹屬 *Schizostachyum* Nees

苗仔竹 Bushy Bamboo

Schizostachyum dumetorum (Hance) Munro

習性：半攀援灌木狀、叢生。

產地：香港島、九龍、新界、大嶼山。生於林下或灌叢中。

分佈：廣東。

用途：觀賞。

沙羅單竹

***Schizostachyum funghomii** McClure

習性：喬木狀、叢生。

產地：上水有栽培。

分佈：廣東、廣西、雲南。

用途：觀賞、造紙、編織。

思筭竹

***Schizostachyum pseudolima** McClure

習性：喬木狀、叢生。

產地：上水有栽培。

分佈：海南。越南。

用途：編織、觀賞。

狗尾草屬 *Setaria* P. Beauv.

大狗尾草

†*Setaria faberii* Herrm.

習性：一年生草本。

產地：沙田。生於山坡、路旁、田園或荒野。

分佈：華南、華中、華東和四川、黑龍江等省區。日本西南至南海諸島。

用途：牲畜飼料。

莠狗尾草

†*Setaria geniculata* (Lam.) P. Beauv.

習性：多年生草本。

產地：香港各地。生於山坡、曠野或路邊。

分佈：廣東、廣西、福建、臺灣、雲南、江西、湖南。兩半球的熱帶和亞熱帶。

金色狗尾草 Yellow Bristlegrass

Setaria glauca (L.) Beauv. [*Setaria pumila* (Poir.) Roem. & Schult.]

習性：一年生草本。

產地：葵涌。生於林邊、山坡、路邊和荒蕪胡田園。

分佈：全國各地。歐亞大陸的溫暖區域，美洲及澳大利亞有引種。

用途：飼料、牧草。

梁（小米、穀子） Millet

**Setaria italica* (L.) P. Beauv.

習性：一年生草本。

產地：栽培。

分佈：栽培於歐亞大陸的溫帶和熱帶。

粟

†**Setaria italica* var. *germarica* (Mill.) Schrad.

習性：一年生草本。

產地：清水灣栽培。

分佈：中國南北各地。

用途：食用。

褐毛狗尾草

Setaria pallidifusca (Schumach.) Stapf & Hubb.

習性：多年生草本。

產地：黃竹坑、西貢。生於山坡、林下陰濕處。

分佈：華南、華中、華東、西南各省區。原產非洲、廣佈于大洋洲、美洲和亞洲。

棕葉狗尾草 Palmgrass

Setaria palmifolia (Koen.) Stapf

習性：多年生草本。

產地：香港各地。生於山坡谷地或林下潮濕處。

分佈：華南、華中、華東、西南各省區。原產非洲、廣佈大洋洲、美洲、亞洲的熱帶和亞熱帶地區。

用途：食用、藥用。

皺葉狗尾草

Setaria plicata (Lam.) T. Cooke

習性：多年生草本。花果期：6—10月。

產地：香港。生於山坡林下或路邊草地上。

分佈：華南、西南、華東。印度、尼泊爾、斯里蘭卡、馬來西亞和日本。

倒刺狗尾草 Bristly foxtail

Setaria verticillata (L.) P. Beauv.

習性：多年生草本。

產地：逢吉鄉。

分佈：熱帶地區廣佈。

唐竹屬 *Sinobambusa* Makino ex Nakai

唐竹 Temple Bamboo

**Sinobambusa tootsik* (Sieb.) Makino

習性：小喬木狀、散生。

產地：扯旗山、香港大學校園、沙田有栽培。

分佈：廣東、廣西、福建。越南。

用途：觀賞。

高粱屬 *Sorghum* Moench

高粱 *Sorghum*

***Sorghum bicolor (L.) Moench**

習性：一年生草本。花果期：6-9 月。
產地：栽培。
分佈：世界各地廣泛栽培。

石茅 (亞刺伯高粱) Johnson Grass

***Sorghum halepense (L.) Pers.**

習性：多年生草本。花果期：夏秋季。
產地：馬料水、大埔。生於山谷、河邊、荒地或耕地中。
分佈：廣東、臺灣、四川 (外來歸化種)。原產地中海地區，現廣佈於世界各地。

光高粱 Glossy Wild Sorghum

Sorghum nitidum (Vahl) Pers.

習性：多年生草本。
產地：新界。生於向陽山坡草叢中。
分佈：華南、華中、華東、西南大部分省區。斯里蘭卡、印度、中南半島、日本、菲律賓及大洋洲。

擬高粱 False Sorghum

***Sorghum propinquum (Kunth) Hitchc.**

習性：多年生草本。
產地：掃桿埔栽培。生於河岸邊或濕潤地。
分佈：廣東、臺灣。中南半島、馬來半島、菲律賓及印度尼西亞。

蘇丹草

†*Sorghum sudanense (Piper) Stapf

習性：一年生草本。花果期：7-9 月。
產地：掃桿埔栽培。
分佈：原產蘇丹，熱帶亞熱帶地區廣泛栽培。
用途：飼料。

稗蓋屬 Sphaerocaryum Nees

稗蓋 Malacca Sphaerocaryum

Sphaerocaryum malaccense (Trin.) Pilger

習性：一年生草本。
產地：香港各地。生於灌叢或草地。
分佈：華南、華東和雲南。印度、斯里蘭卡、馬來西亞、菲律賓、越南、緬甸。

鬣刺屬 Spinifex L.

鬣刺 Littoral Spinegrass

Spinifex littoreus (Burm. f.) Merr.

習性：多年生草本。
產地：浪茄、大浪西灣、咸田灣、大灣、大嶼山。生於海邊、沙灘。
分佈：廣東、廣西、福建、臺灣。印度、斯里蘭卡、馬來西亞。
用途：固沙植物。

鼠尾粟屬 Sporobolus R. Br.

鼠尾粟 Australian Smut-grass

Sporobolus fertilis (Steud.) W. D. Clayton

習性：多年生草本。
產地：香港各地。生於田野路邊及山坡草地、山谷濕處。
分佈：華東、華中、華南。印度、斯里蘭卡，泰國、緬甸、越南、馬來西亞、菲律賓。

鹽地鼠尾粟 Seashore Dropgrass

Sporobolus virginicus (L.) Kunth

習性：多年生草本。
產地：香港各地。生於海邊或海灘鹽地上。
分佈：廣東、福建、浙江、臺灣等省。西半球的熱帶區域。

鈍葉草屬 Stenotaphrum Trin.

光鈍葉草 Glabrous Stenotaphrums

***Stenotaphrum dimidiatum (L.) Brongn.**

習性：多年生草本。
產地：大潭、大帽山、稔樹灣。草地栽培。
分佈：印度。

鈍葉草 Centipede Grass

Stenotaphrum helferii Munro ex Hook. f.

習性：多年生草本。花果期秋季。
產地：香港島、清水灣。生於濕潤草地、林緣或疏林中。
分佈：廣東、雲南。緬甸、馬來西亞等亞洲熱帶地區也有。

菅屬 *Themeda* Forssk.

黃背草

Themeda japonica (Willd.)Tanaka (*Themeda triandra* auct. non Forssk.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：多年生草本。

產地：香港島、新界。生於乾燥的山坡、草地、路旁、林緣等地。

分佈：新疆、青海、內蒙古。日本、朝鮮。

用途：造紙、蓋屋。

菅

Themeda villosa (Poir.) A. Camus. [*Themeda gigantea* var. *villosa* (Poir.) Hack.; *Themeda gigantea* auct. non (Cav.) Hack.: Check List HK Pl. 1993.]

習性：多年生草本。花果期 8 月至翌年 1 月。

產地：新界。生於山坡灌叢、草地或林緣向陽處。

分佈：華南、華中、西南各省區。印度、中南半島、馬來西亞及菲律賓。

菵雷草屬 *Thuarea* Pers.

菵雷草

Thuarea involuta (Forst.) R. Br. ex Roem.

習性：多年生草本。花果期：4—12 月。

產地：平洲。生於海岸沙灘。

分佈：海南、廣東、臺灣。日本、東南亞、大洋洲和馬達加斯加。

棕葉蘆屬 *Thysanolaena* Nees

棕葉蘆 Tigergrass

Thysanolaena agrostis Nees [*Thysanolaena maxima* (Roxb.) Kuntze; *Thysanolaena latifolia* (Han.) Honda]

習性：多年生草本。

產地：香港各地。生於濕潤草地及林緣。

分佈：廣東、廣西、雲南、貴州、臺灣。印度、印度尼西亞。

用途：造紙。

小麥屬 *Triticum* L.

普通小麥 Wheat

****Triticum aestivum*** L.

習性：一年生草本。

產地：栽培。

分佈：我國南北各地廣為栽培。

用途：糧食。

玉蜀黍屬 *Zea* L.

玉蜀黍 Maize, Indian Corn

****Zea mays*** L.

習性：一年生草本。

產地：栽培。

分佈：我國各地均有栽培。全世界熱帶和溫帶地區廣泛種植。

用途：糧食。

結萇草屬 *Zoysia* Willd.

溝葉結縷草 Manila Grass

Zoysia matrella (L.) Merr.

習性：多年生草本。花果期 7-10 月。

產地：新界。生於海岸沙灘上。

分佈：海南、廣東、臺灣。亞洲和大洋洲的熱帶地區。

中華結縷草

Zoysia sinica Hance

習性：多年生草本。花果期 5-10 月。

產地：馬鞍山、青山。生於海邊沙灘、河岸、路旁和草叢中。

分佈：華南、華東和河北、遼寧等省區。日本。

細葉結縷草 Mascarene Grass

****Zoysia tenuifolia*** Willd.

習性：多年生草本。花果期 8-12 月。

產地：栽培。

分佈：中國南部。熱帶亞洲，歐美各國普遍引種。

361. 香蒲科 Typhaceae

香蒲屬 *Typha* L.

水燭 Narrow leaf Cattail

†**Typha angustifolia* L.

習性：多年生草本。

產地：栽培。

分佈：南北各地。亞洲、歐洲、北美、大洋洲。

用途：藥用。

362. 鳳梨科 Bromeliaceae

蜻蜓鳳梨屬 *Aechmea* Ruiz & Pavón

蜻蜓鳳梨 Urnplant

Aechmea fasciata (Lindl.) Baker

習性：常綠多年生草本。

產地：栽培。

分佈：原產巴西，現已廣泛栽培。並有銀邊 cv. *Albo-marginata*, 斑葉 cv. *Variegata* 等許多園藝品種。

鳳梨屬 *Ananas* Mill.

鳳梨（鳳梨） Pineapple

**Ananas comosus* (L.) Merr.

習性：草本。

產地：栽培。

分佈：雲南、廣西、海南、廣東、福建。原產熱帶美洲。

用途：水果。

水塔花屬 *Billbergia* Thunb.

水塔花 Fool proof plant

**Billbergia pyramidalis* Lindl.

習性：草本。花期：9月。

產地：栽培。

分佈：原產熱帶美洲，現各熱帶地區常見栽培。

用途：觀賞。

姬鳳梨屬 *Cryptanthus* Otto & A.
Dietr.

三色鳳梨 Rainbow star

**Cryptanthus bromelioides* cv. *Tricolor*

習性：草本。

產地：栽培。

分佈：原產巴西，現各熱帶地區常見栽培。

用途：觀賞。

王鳳梨屬 *Vriesea* Lindl.

紅票 *Vriesea*

**Vriesea fosteriana* L. B. Sm.

習性：草本。

產地：栽培。

分佈：原產熱帶美洲。

用途：觀賞。

火劍 Flaming-sword

Vriesea splendens (Brongn.) Len

習性：草本。

產地：栽培。

分佈：原產熱帶美洲。

用途：觀賞。

363. 旅人蕉科 Streliziaceae

旅人蕉屬 *Ravenala* Adans.

旅人蕉 Traveller's palm

**Ravenala madagascariensis* Sonn.

習性：喬木。

產地：栽培。

分佈：原產馬達加斯加，現各熱帶地區常見栽培。

用途：觀賞。

鶴望蘭屬 *Strelitzia* Aiton

大鶴望蘭（扇蕉） Big bird of paradise

**Strelitzia nicolai* Regel & Koern.

習性：喬木。

產地：栽培。

分佈：原產非洲，現各熱帶地區常見栽培。

用途：觀賞。

鶴望蘭（天堂鳥蕉） Bird of paradise

**Strelitzia reginae* Aiton

習性：多年生草本。花期：冬天。

產地：栽培。
分佈：原產非洲南部，現熱帶地區常有栽培。
用途：觀賞。

365. 芭蕉科 Musaceae

芭蕉屬 *Musa* L.

香蕉 Dwarf banana

†**Musa acuminata* cv. *Cavendishii*

習性：多年生草本。花期：全年。

產地：栽培。

分佈：原產中國南部，現許多國家均有栽培。

用途：水果。

野蕉 Wild banana

†*Musa balbisiana* Colla

習性：多年生草本。

產地：大帽山。生於山地濕潤處。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南。亞洲南部、東南部。

紅蕉 Flowering banana

†**Musa coccinea* Andr.

習性：多年生草本。花期：幾全年。

產地：栽培。

分佈：雲南、廣西、廣東。

用途：觀賞。

大蕉（甘蕉） Common banana

**Musa* × *paradisiaca* L. (*Musa paradisiaca*
var. *sapientum* Kuntze)

習性：多年生草本。花期：全年。

產地：栽培。

分佈：雲南、廣西、海南、廣東、福建、臺灣。原產印度、馬來西亞等地。

用途：水果。

367. 薑科 Zingiberaceae

山薑屬 *Alpinia* Roxb.

距花山薑 India galangal

Alpinia calcarata Rosc.

習性：多年生草本。花期：5-9月。

產地：清水灣、大坳門、田下村。生於林下或栽培。

分佈：廣東、印度、斯里蘭卡。

用途：觀賞。

紅豆蔻 Great galangal

Alpinia galanga (L.) Swartz

習性：多年生草本。花期：5-8月；果期：9-11月。

產地：扯旗山、城門、麻南笏、松仔園、沙螺洞、涌尾、南涌等地。生於次生林或灌叢中。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、福建。亞洲熱帶地區廣佈。

用途：藥用。

草豆蔻 Katsumadai galangal

Alpinia hainanensis K. Schum. (*Alpinia katsumadai* Hayata)

習性：多年生草本。花期：4-6月；果期：5-8月。

產地：香港各地。生於山地林中。

分佈：海南、廣東、廣西。

用途：藥用。

山薑

†*Alpinia japonica* Miq.

習性：多年生草本。

產地：大東山。

分佈：東南至西南各省區。日本。

用途：藥用。

箭稈風 Jianganfeng

†*Alpinia jianganfeng* T. L. Wu

習性：多年生草本。花期：4-6月；果期：6-11月。

產地：大東山。生於荒坡、灌叢或疏林中。

分佈：海南、廣東、廣西。

用途：藥用。

華山薑 Chinese galangal

Alpinia oblongifolia Hayata [*Alpinia chinensis*
auct. non (Retz.) Rosc.: Check List HK
Pl. 1993.]

習性：多年生草本。花期：5-7 月；果期：6-12
月。

產地：香港島、大帽山、竹角。生於林下。

分佈：中國西南部至東南部各省區。

用途：藥用。

高良薑 Galngal

Alpinia officinarum Hance

習性：多年生草本。花期：4-9 月；果期：5-11
月。

產地：大坳門、清水灣、東龍島。生於荒坡、
灌叢或疏林中。

分佈：海南、廣東、廣西。

用途：藥用。

密苞山薑 Dense bract glangal

Alpinia stachyoides Hance

習性：多年生草本。花期：5-8 月；果期：8-12
月。

產地：香港各地。生於密林中。

分佈：廣東、廣西、貴州、雲南、江西。

用途：藥用。

豔山薑 Shell ginger

Alpinia zerumbet (Pers.) Burt & Smith

習性：多年生草本。花期：4-6 月；果期：7-10
月。

產地：香港各地。

分佈：中國西南部至東南部各省區。

用途：觀賞。

花葉豔山薑 Variegated shell ginger

***Alpinia zerumbet** cv. *Variegata*

習性：多年生草本。花期：4-6 月；果期：7-10
月。

產地：香港。栽培。

分佈：華南有栽培。熱帶地區常見栽培。

用途：觀賞。

薑黃屬 *Curcuma* L.

郁金 Aromatic tumeric

Curcuma aromatica Salisb.

習性：多年生草本。花期：4-6 月。

產地：城門、茅坪、大埔。

分佈：中國西南部至東南部各省區。亞洲東
南部廣泛栽培。

用途：香料、藥用。

薑黃

***Curcuma longa** L.

習性：多年生草本。

產地：香港。栽培。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、四川、江
西、福建、臺灣。

用途：藥用、染料。

火炬薑屬 *Etingera* Giseke

火炬薑 Torch ginger

†***Etingera elatior** (Jack) R. M. Smith

習性：多年生草本。花期：5 月。

產地：栽培。

分佈：雲南、廣東有引種。原產馬來西亞，
亞洲熱帶地區常見栽培。

用途：觀賞。

薑花屬 *Hedychium* Koen.

紅薑花 Scarlet ginger-lily

†***Hedychium coccineum** Buch.-Ham.

習性：多年生草本。花期：6-8 月；果期：10
月。

產地：栽培。

分佈：廣西、雲南、西藏。生於林中。

用途：觀賞。

薑花 Butterfly lily

***Hedychium coronarium** Koen.

習性：多年生草本。花期：8-12 月。

產地：栽培。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、四川、湖
南、臺灣。熱帶亞洲至澳大利亞。

用途：觀賞、藥用。

印度薑花 Kahii ginger

***Hedychium gardenianum** Wall.

習性：多年生草本。花期：6月。

產地：栽培。

分佈：廣東、雲南有引種。原產印度。

用途：觀賞。

山柰屬 *Kaempferia* L.

花葉山柰 Pretty resurrection lily

†***Kaempferia pulchra** Ridl.

習性：多年生草本。花期：6月。

產地：栽培。

分佈：廣東。熱帶亞洲。

用途：觀賞。

土田七屬 *Stahlianthus* Kuntze

土田七 (薑三七) *Involucrate stahlianthus*

***Stahlianthus involucratus** (King ex Bak.)

Craib

習性：多年生草本。花期：5-6月。

產地：動植物公園。栽培。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、福建。印度、錫金。

用途：觀賞、藥用。

薑屬 *Zingiber* Boehm.

珊瑚薑 Coral ginger

†**Zingiber corallinum** Hance

習性：多年生草本。花期：5-8月；果期：8-10月。

產地：大帽山、大浪西灣。生於密林中或栽培。

分佈：海南、廣東、廣西。

全唇薑

Zingiber integrilabrum Hance

習性：多年生草本。花期：4月。

產地：歌賦山。生於林下。

分佈：香港特有。

囊荷 *Mioga ginger*

†**Zingiber mioga** (Thunb.) Rosc.

習性：多年生草本。花期：4-10月。

產地：大東山。生於山谷中陰濕處。

分佈：華東至華南及貴州。日本。

用途：藥用、食用。

薑 *Ginger*

***Zingiber officinale** (Willd.) Rosc.

習性：多年生草本。花期：秋季。

產地：栽培。

分佈：中國中部、東南部至西南部各省區栽培。熱帶亞洲廣為栽培。

用途：調味、藥用。

陽荷 *Striolate ginger*

†**Zingiber striolatum** Diels

習性：多年生草本。花期：7-9月；果期：9-11月。

產地：大帽山。生於林下。

分佈：廣東、廣西、貴州、四川、湖南、湖北、江西。

紅球薑 *Wild ginger*

Zingiber zerumbet (L.) Smith

習性：多年生草本。花期：7-9月；果期：10月。

產地：大潭篤、薄扶林、貝璐道、寶雲道、鳳園。

分佈：雲南、廣西、海南、廣東。亞洲熱帶地區廣佈。

用途：觀賞、藥用。

368. 閉鞘薑科 *Costaceae*

閉鞘薑屬 *Costus* L.

閉鞘薑 *Craiper ginger*

Costus speciosus (Koen.) Smith

習性：多年生草本。花期：7-9月；果期：9-11月。

產地：歌賦山、大坑道、動植物公園。生於疏林下。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、臺灣。熱帶亞洲。

用途：藥用。

369. 美人蕉科 *Cannaceae*

美人蕉屬 *Canna* L.

大美人蕉 *Common garden canna*

**Canna* × *generalis* L. H. Bailey (*Canna* × *orchioides* L. H. Bailey)

習性：多年生草本。花期：夏、秋季。

產地：栽培。

分佈：全國及世界各地。

用途：觀賞。品種頗多，常見的有紅花美人蕉 'President' (高稈、紅花)、花葉美人蕉 'Striatus' (葉脈黃色，花橙紅)、矮稈美人蕉 'Scarlet Beauty' (矮稈、紅花)、'King Humbert' (古銅色葉，橙紅色花)等。

粉美人蕉

†**Canna glauca* L.

習性：多年生草本。花期：夏秋季。

產地：栽培。

分佈：全國各地。原產南美洲及西印度群島。

用途：觀賞。

美人蕉 *Indian canna*

**Canna indica* L.

習性：多年生草本。花期：3-12月。

產地：栽培。

分佈：全國各地常見栽培。原產印度。

用途：觀賞、藥用。

370. 竹芋科 *Marantaceae*

肖竹芋屬 *Calathea* G. Meyer

肖竹芋 *Calathea*

**Calathea ornata* (Lindl.) Koen.

習性：多年生草本。花期：5-6月。

產地：栽培。

分佈：臺灣有栽培。原產南美。

用途：觀賞。

絨葉肖竹芋 (斑葉肖竹芋) *Zebra plant*

**Calathea zebrina* (Sims) Lindl.

習性：多年生草本。花期：5-6月。

產地：栽培。

分佈：廣東、臺灣。原產巴西。

用途：觀賞。

竹芋屬 *Maranta* L.

竹芋 *Arrowroot*

**Maranta arundinacea* L.

習性：多年生草本。花期：夏秋季。

產地：栽培。

分佈：華南常見栽培。原產熱帶美洲，現廣植於各熱帶地區。

用途：食用。

花葉竹芋 *Maranta*

**Maranta bicolor* Ker

習性：多年生草本。花期：夏秋季。

產地：栽培。

分佈：廣東、廣西有栽培。原產巴西。

用途：觀賞。

柘葉屬 *Phrynium* Willd.

尖苞柘葉

Phrynium placentarium Lour.

習性：多年生草本。花期：2-5月。

產地：大埔。

分佈：雲南、貴州、廣西、海南、廣東。亞洲南部至東南部。

柘葉

Phrynium rheedei Suresh & Nicols.

(*Phrynium capitatum* Willd.)

習性：多年生草本。花期：2-7月。

產地：大帽山、馬鞍山。生於林下。

分佈：廣東、廣西、雲南。印度、越南。

紫背竹芋屬 *Stromanthe* Sond.

紫背竹芋 *Stromanthe*

**Stromanthe sanguinea* Sond.

習性：多年生草本。

產地：栽培。

分佈：廣東有栽培。原產巴西。

用途：觀賞。

371. 田葱科 Philydraceae

田葱屬 *Philydrum* Banks ex Gaertn.

田葱 *Woolly Philydrum*

Philydrum lanuginosum Banks ex Gaertn.

習性：多年生草本。花期：6-12月。

產地：爛泥灣、大欖涌、西貢、咸田、榕樹澳、橫臺山、大嶼山。

分佈：海南、廣東、廣西、福建、臺灣。亞洲南部至澳大利亞。

用途：藥用。

372. 雨久花科

Pontederiaceae

鳳眼藍屬 *Eichhornia* Kunth

鳳眼藍（大水萍、水浮蓮） *Water Hyacinth*

****Eichhornia crassipes*** (C. Mart.) Solms-Laub.

習性：水生草本。花期：夏秋季。

產地：栽培或野生。生於池塘或河涌。

分佈：原產熱帶美洲，現廣佈於長江、黃河流域及華南各地。

用途：飼料。

雨久花屬 *Monochoria* C. Presl

箭葉雨久花 *Monochoria*

Monochoria hastata (L.) Solms-Laub.

習性：水生草本。花期：8月至翌年3月。

產地：粉嶺。生於水田、池塘。

分佈：華南各地。亞洲東南部。

用途：飼料。

鴨舌草 *Duck's tongue grass*

Monochoria vaginalis (Burm. f.) Kunth

習性：水生草本。花期：6月至翌年4月。

產地：沙田、大環、社山村、大蠓。生於水田或濕地上。

分佈：全國各地。印度至馬來西亞、朝鮮。

用途：飼料。

373. 血皮草科

Haemodoraceae

劍葉草屬 *Xiphidium* Aubl.

劍葉草

†****Xiphidium coeruleum*** Aubl.

習性：草本。

產地：香港動植物公園有栽培。

分佈：原產西印度群島。

用途：觀賞。

375. 百合科 Liliaceae (incl. Amaryllidaceae)

百子蓮屬 *Agapanthus* L'Herit.

百子蓮 *African Lily*

****Agapanthus africanus*** (L.) Hoffm.

習性：多年生草本。

產地：栽培。

分佈：南非、南美、地中海。

用途：觀賞。

葱屬 *Allium* L.

分葱（香葱） *Schallot*

****Allium ascalonicum*** L.

習性：草本。

產地：栽培。

分佈：溫帶和亞熱帶。

用途：食用。

洋葱 *Onion*

****Allium cepa*** L.

習性：多年生草本。

產地：栽培。

分佈：溫帶和亞熱帶廣為栽培，原產西亞。

用途：食用。

蕎頭 *Chinese Onion*

****Allium chinense*** G. Don

習性：多年生草本。

產地：栽培。

分佈：溫帶和亞熱帶廣為栽培，原產中國。

用途：食用、藥用。

葱 Welsh Onion

***Allium fistulosum** L.

習性：多年生草本。

產地：栽培。

分佈：廣佈溫帶至亞熱帶（栽培）。

用途：蔬食。

寬葉韭

†***Allium hookeri** Thwaites

習性：多年生草本。

產地：栽培。

分佈：華南、西南。印度、不丹。

用途：菜用、藥用。

大蒜 Leek

***Allium porrum** L.

習性：多年生草本。

產地：栽培。

分佈：廣為栽培、溫帶至亞熱帶。

用途：食用、藥用。

蒜頭 Garlic

***Allium sativum** L.

習性：多年生草本。

產地：栽培。

分佈：廣為栽培。原產西亞、歐洲。

用途：食用、藥用。

韭 Chinese chives

***Allium tuberosum** Rottl. ex Spreng.

習性：多年生草本。

產地：栽培。

分佈：廣為栽培，原產中國東部和南部。

用途：食用。

六出花屬 *Alstroemeria* L.

***Alstroemeria psittacina** Lehm.

習性：草本。

產地：栽培。

分佈：原產熱帶美洲。

用途：觀賞。

天門冬屬 *Asparagus* L.

天門冬 Wild asparagus

Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr.

習性：攀援狀亞灌木。花期：夏季。

產地：香港各地。

分佈：中國東南部。越南。

用途：藥用、觀賞。

非洲天門冬 Springer Asparagus

***Asparagus densiflorus** cv. **Sprengeri**

習性：攀援狀亞灌木。花期：5-6月；果期：
11月。

產地：栽培。

分佈：全國各地常見，公園栽培。原產非洲南部。

用途：觀賞。

文竹 *Asparagus fern*

†**Asparagus setaceus** (Kunth) Jessop

習性：攀援狀灌木。花期：6月。

產地：栽培。

分佈：原產非洲南部，現世界各地均有栽培。

用途：觀賞。

蜘蛛抱蛋屬 *Aspidistra* Ker-Gawl.

蜘蛛抱蛋（一葉蘭） Cast-iron plant

Aspidistra elatior Blume (*Aspidistra lurida*
auct. non Ker-Gawl.: Check List HK Pl.
1993.)

習性：多年生草本。花期：2-6月。

產地：香港島、大嶼山。

分佈：全國各地公園常有栽培。日本。

用途：觀賞。品種有 'Maculata'、'Variegata'。

小花蜘蛛抱蛋 Small flower aspidistra

Aspidistra minutiflora Stapf

習性：多年生草本。花期：7-10月。

產地：大帽山、大嶼山。生於石壁上。

分佈：貴州、廣西、廣東。

用途：觀賞。

紫點蜘蛛抱蛋

Apidistra punctata Lindl.

習性：多年生草本。花期：2月。

產地：香港島。

分佈：廣東。

用途：觀賞。

白絲草屬 *Chionographis* Maxim.

中國白絲草 *Chinese chionographis*

Chionographis chinensis Krause

(*Chionographis japonica* auct. non Maxim.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：多年生草本。花期：4-5月；果期：6月。

產地：馬鞍山。

分佈：廣西、廣東、湖南、福建。

吊蘭屬 *Chlorophytum* Ker-Gawl.

吊蘭 Bracket plant

***Chlorophytum comosum** (Thunb.) Baker

習性：多年生草本。花期：4-5月；果期：8月。

產地：栽培。

分佈：原產非洲南部。全國各地常有栽培。

用途：觀賞。

小花吊蘭 Small flower bracket plant

Chlorophytum laxum R. Br.

習性：多年生草本。花期：5月；果期：6-8月。

產地：柴灣、大潭篤、大嶼山。生於林下陰處。

分佈：海南、廣東。

用途：觀賞。

君子蘭屬 *Clivia* Lindl.

君子蘭 Scarlet Kaffirlily

***Clivia miniata** Regel

習性：多年生草本。

產地：栽培。

分佈：非洲南部。

用途：觀賞。

文殊蘭屬 *Crinum* L.

文殊蘭 *Chinese Crinum*

Crinum asiaticum var. **sinicum** (Roxb. ex Herb.) Baker

習性：多年生粗壯草本。花期：夏季。

產地：大浪西灣、咸田灣、大灣、浪茄、大嶼山；也有園林栽培。生於海濱地區或河邊沙地。

分佈：福建、臺灣、廣東、廣西。

用途：藥用；觀賞。

西南文殊蘭 (大葉文殊蘭) *Broadleaf Crinum*

†***Crinum latifolium** L.

習性：多年生粗壯草本。花期：夏季。

產地：栽培。

分佈：廣西、貴州、雲南。越南、印度、馬來西亞。

用途：觀賞。

仙茅屬 *Curculigo* Gaertn.

大葉仙茅 *Large-leaved curculigo*

Curculigo capitulata (Lour.) Kuntze

習性：多年生草本。花期：5-6月；果期：8-9月。

產地：柏架山、大嶼山。生於林下陰濕處。

分佈：海南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、西藏、福建、臺灣。南亞至東南亞。

仙茅 *Golden-eyed grass*

Curculigo orchoides Gaertn.

習性：多年生草本。花期：4-9月。

產地：香港各地。生於林下。

分佈：華南、華東、西南等省區。亞洲東南部、日本。

用途：藥用。

曲花屬 *Cyrtanthus* Aiton

南非百合 South African Lily

**Cyrtanthus mackenii* Hook. f.

習性：草本。

產地：栽培。

分佈：原產南非。

用途：觀賞。

山菅蘭屬 *Dianella* Lam.

山菅蘭 *Dianella*

Dianella ensifolia (L.) DC.

習性：多年生草本。花期：3-7 月。

產地：香港各地。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、福建、浙江、臺灣。馬達加斯加、熱帶亞洲至澳大利亞。

用途：有毒植物！

萬壽竹屬 *Disporum* Salisb.

萬壽竹（山竹花） Canton fairy bells

**Disporum cantoniense* (Lour.) Merr.

習性：多年生草本。花期：5-7 月；果期：8-11 月。

產地：栽培。

分佈：中國西南部至東南部。印度、泰國。

用途：藥用。

寶鐸草 Fairy bells

Disporum sessile D. Don

習性：多年生草本。花期：3-5 月；果期：6-11 月。

產地：大帽山、馬鞍山。生於林下或灌叢中。

分佈：西南、華南、華東、華北。

用途：藥用。

斑葉草屬 *Drimiopsis* Lindl. & Paxt.

斑葉草 *Drimiopsis*

**Drimiopsis saundersiae* Baker

習性：多年生草本。花期：5-6 月。

產地：栽培。

分佈：原產南非。

用途：觀賞。

南美蘭屬 *Eucharis* Planch. & Linden

南美蘭 Amazon Lily

**Eucharis* × *grandiflora* Planch. & Linden

習性：多年生草本。

產地：栽培。

分佈：原產南美洲。

用途：觀賞。

Eurycles Salisb. ex Schult. & Schult. f.

**Eurycles sylvestris* Salisb

習性：草本。

產地：栽培。

分佈：馬來西亞、澳大利亞。

用途：觀賞。

嘉蘭屬 *Gloriosa* L.

春嘉蘭 Glory lily

**Gloriosa rothschildiana* O'Brien

習性：藤本。花期：早春。

產地：栽培。

分佈：原產非洲。

用途：觀賞。

嘉蘭 Crisped Glory lily

**Gloriosa superba* L.

習性：藤本。花期：夏、秋。

產地：栽培。

分佈：海南、雲南。越南、印度、斯里蘭卡、非洲。

用途：觀賞。有毒植物！

網球花屬 *Haemanthus* L.

網球花 Bloodlily

**Haemanthus multiflorus* Martyn

習性：多年生草本。

產地：栽培。

分佈：熱帶非洲。

用途：觀賞。

繡球百合 Katherine Bloodlily

†***Haemanthus katherinae** Baker

習性：草本。

產地：栽培。

分佈：熱帶南非。

用途：觀賞。

萱草屬 *Hemerocallis* L.

黃花菜 Citron Daylily

†***Hemerocallis citrina** Baroni

習性：多年生草本。花果期：5-8 月。

產地：栽培。

分佈：秦嶺以南各省區。

用途：食用。

萱草 Daylily

***Hemerocallis fulva** (L.) L.

習性：多年生草本。花期：6-9 月。

產地：栽培。

分佈：秦嶺以南各省區。朝鮮。

用途：觀賞。花有毒！

朱頂蘭屬 *Hippeastrum* Herb.

花朱頂蘭 Barbados Lily

***Hippeastrum vittatum** Ait.

習性：多年生草本。

產地：栽培。

分佈：南美、秘魯。

用途：觀賞。

玉簪屬 *Hosta* Tratt.

玉簪 Fragrant plantainlily

†***Hosta plantaginea** (Lam.) Aschers.

習性：多年生草本。花、果期：8-10 月。

產地：栽培。

分佈：廣東、湖南、湖北、四川、福建、浙江、江蘇、安徽。

用途：藥用。

紫萼 Blue plantainlily

***Hosta ventricosa** (Salisb.) Stearn

習性：多年生草本。花期：6-7 月；果期：7-9 月。

產地：栽培。

分佈：華南、華東、華中至西南。

用途：觀賞。

Hyline Herb.

***Hyline worsleyi** Mallett

習性：多年生草本。

產地：栽培。

分佈：巴西。

用途：觀賞。

水鬼蕉屬 *Hymenocallis* Salisb.

水鬼蕉 (蜘蛛蘭) American *Hymenocallis*, Spider Lily

***Hymenocallis littoralis** (Jacq.) Salisb.

習性：多年生草本。

產地：栽培。

分佈：熱帶美洲。

用途：觀賞。

百合屬 *Lilium* L.

野百合 (淡紫百合) Chinese lily

Lilium brownii F. E. Brown ex Mieliez

習性：多年生草本。花期：5-6 月；果期：9-10 月。

產地：紫羅蘭山、城門、大帽山、清水灣、飛鵝山、青衣島。

分佈：秦嶺以南各省區。

用途：食用、觀賞。

卷丹 Tiger lily

***Lilium lancifolium** Thunb. (*Lilium tigrinum* Ker-Gawl.)

習性：多年生草本。花期：7-8 月；果期：9-10 月。

產地：栽培。

分佈：南北各地有栽培或野生。朝鮮、日本。

用途：食用。

麝香百合 White trumpet lily

***Lilium longiflorum** Thunb.

習性：多年生草本。花期：5-6 月；果期：9-10

月。
產地：栽培。
分佈：臺灣、日本。
用途：觀賞。

美麗百合（鹿子百合） Japanese lily

***Lilium speciosum** Thunb.

習性：多年生草本。花期：6-8 月；果期：10 月。
產地：栽培。
分佈：原產日本。
用途：觀賞。

山麥冬屬 *Liriope* Lour.

山麥冬（麥門冬） Lily turf

Liriope spicata (Thunb.) Lour.

習性：多年生草本。花期：5-7 月；果期：8-10 月。
產地：香港各地。野生或栽培。
分佈：華北以南各地。越南、日本。
用途：觀賞。

石蒜屬 *Lycoris* Herb.

忽地笑（脫衣換錦） Golden *Lycoris*,
Chinese Amaryllis

***Lycoris aurea** (L'Herit.) Herb.

習性：多年生草本。
產地：栽培。
分佈：廣東、廣西、雲南、四川、湖南、湖北、福建、臺灣。日本、緬甸。
用途：藥用。

石蒜 Shorttube *Lycoris*

***Lycoris radiata** (L'Herit.) Herb.

習性：多年生草本。
產地：栽培。
分佈：秦嶺以南各省區。日本。
用途：藥用；觀賞。

水仙屬 *Narcissus* L.

水仙 *Narcissus*

***Narcissus tazetta** var. **chinensis** Roem.

習性：多年生草本。
產地：栽培。
分佈：浙江、福建沿海。
用途：藥用、觀賞。

Nerine Herb.

†***Nerine filifolia** Baker

習性：多年生草本。
分佈：栽培。
分佈：南非。
用途：觀賞。

假蔥屬 *Nothoscordum* Kunth

***Nothoscordum gracile** (Aiton) Stearn

習性：多年生草本。
產地：香港（植物園）栽培。
分佈：原產中美洲。
用途：觀賞。

沿階草屬 *Ophiopogon* Ker-Gawl.

花葉沿階草 Jaburan lilyturf

†***Ophiopogon jaburan** (Sieb.) Lodd.

習性：多年生草本。花、果期：3-7 月。
產地：栽培。
分佈：原產日本。
用途：觀賞。

麥冬（沿階草） Blue grass

Ophiopogon japonicus (L. f.) Ker-Gawl.

習性：多年生草本。花期：5-8 月；果期：8-9 月。
產地：大嶼山。
分佈：西南、華南、華東、河南、河北、陝西。越南、印度、日本。
用途：藥用。

廣東沿階草 Guangdong lilyturf

†***Ophiopogon reversus** Huang

習性：多年生草本。花期：9-10 月；果期：12 至翌年 3 月。
產地：紫羅蘭山、柏架山、大帽山、大埔。
生於林下蔭濕處。

分佈：海南。

全能花屬 *Pancratium* L.

全能花 Towflower *Pancratium*

**Pancratium biflorum* Roxb.

習性：多年生草本。

產地：栽培。

分佈：印度。

用途：觀賞。

重樓屬 *Paris* L.

華重樓（重樓） Love apple

Paris polyphylla Sm. var. *chinensis* (Franch.)

Hara

習性：多年生草本。花期：5-7月；果期：8-10月。

產地：大嶼山、大東山、石澳道。生於林下陰濕處。

分佈：西南、華南、華中、華東、臺灣。

球子草屬 *Peliosanthes* Andr.

大蓋球子草

Peliosanthes macrostegia Hance

習性：多年生草本。花期：5-6月；果期：8-9月。

產地：大帽山。生於灌叢下或栽培。

分佈：廣東、廣西、貴州、雲南、四川、臺灣。

吉祥草屬 *Reineckia* Kunth

吉祥草 Pink reineckia

**Reineckia carnea* (Andr.) Kunth

習性：多年生草本。花、果期：7-11月。

產地：栽培。

分佈：西南、華中、華東。

用途：藥用、觀賞。

綿棗兒屬 *Scilla* L.

綿棗兒（天蒜） Squill

Scilla scilloides (Lindl.) Druce [*Scilla sinensis* (Lour.) Merr.]

習性：多年生草本。花、果期：7-11月。

產地：鶴咀、紫羅蘭山、大潭篤、扯旗山。

分佈：中國南北均有。朝鮮、日本、俄羅斯。

龍頭花屬 *Sprekelia* Heister

龍頭花（火燕蘭） Aztecilily

Sprekelia formosissima (L.) Herb.

習性：多年生草本。

產地：栽培。

分佈：墨西哥。

用途：觀賞。

異蕊草屬 *Thysanotus* R. Br.

異蕊草 Chinese frienge lily

Thysanotus chinensis Benth.

習性：多年生草本。花、果期：5-12月。

產地：香港仔、粉嶺、掃管笏。

分佈：廣東、福建、亞洲東南部至澳大利亞。

蒜味草屬 *Tulbaghia* L.

蒜味草 Society garlic

**Tulbaghia violacea* Harv.

習性：多年生草本。花期：6月。

產地：栽培。

分佈：原產南非。

用途：觀賞。

鬱金香屬 *Tulipa* L.

鬱金香 Tulipa

**Tulipa gesneriana* L.

習性：多年生草本。花期：4-5月。

產地：栽培。

分佈：中國大城市公園有引種。可能起源於歐洲和中亞。

用途：觀賞。

開口箭屬 *Tupistra* Ker-Gawl.

彎蕊開口箭 Watt tupistra

†*Tupistra wattii* (C. B. Clarke) Hook. f.

習性：多年生草本。花期：2-5月。

產地：大帽山。生於林下。

分佈：廣東、廣西、貴州、雲南、四川。

Vallota Salisb. ex Herb.

**Vallota speciosa* Th. Dur. & Schinz..

習性：多年生草本。
產地：栽培。
分佈：南非。
用途：觀賞。

藜蘆屬 *Veratrum* L.

黑紫藜蘆 Japanese falsehellebore
Veratrum japonicum (Baker) Loes. f.
[*Veratrum maackii* subsp. *formosanum*
(Loes.) J. H. Zimmerm.]

習性：多年生草本。花期：2-8 月；果期：7-10 月。
產地：柏架山、大帽山、大東山、鳳凰山。
生於林下或草地上。
分佈：西南、華南至華東、臺灣。

葱蓮屬 *Zephyranthes* Herb.

葱蓮 (玉簾) Autumn Zephyrlily
**Zephyranthes candida* (Lindl.) Herb.

習性：多年生草本。
產地：栽培。
分佈：南美。
用途：觀賞。

韭蓮 (風雨花) Rosepink Zephyrlily
**Zephyranthes grandiflora* Lindl.

習性：多年生草本。
產地：栽培。
分佈：南美。
用途：觀賞。

玫瑰葱蓮 Cuban Zephyrlily
†**Zephyranthes rosea* Lindl.

習性：多年生草本。
產地：栽培。
分佈：南美。
用途：觀賞。

376. 鳶尾科 *Iridaceae*

射干屬 *Belamcanda* Adans.

射干 Black-berry lily
**Belamcanda chinensis* (L.) DC.

習性：多年生草本。花期：6-8 月；果期：7-9 月。
產地：栽培。
分佈：全國各地。越南、印度、日本、俄羅斯、朝鮮。
用途：藥用。

雄黃蘭屬 *Crocsmia* Planch.

雄黃蘭 Montbretia
**Crocsmia* × *crocsmiflora* (Burb. & Dean)
N. E. Br.
習性：多年生草本。花期：7-8 月；果期：9-10 月。
產地：栽培。
分佈：南北大城市有引種。
用途：觀賞。

香雪蘭屬 *Freesia* Ecklon ex Klatt

香雪蘭 *Freesia*
**Freesia refracta* Klatt
習性：多年生草本。花期：4-5 月；果期：6-9 月。
產地：栽培。
分佈：國內各大城市有引種。原產南非。
用途：觀賞。

唐菖蒲屬 *Gladiolus* L.

唐菖蒲 *Gladiolus*
**Gladiolus* × *gandavensis* van Houtte
習性：多年生草本。花期：7-9 月；果期：8-10 月。
產地：栽培。
分佈：國內各大城市有引種。
用途：觀賞、藥用。

鳶尾屬 *Iris* L.

蝴蝶花 Frenched iris
†**Iris japonica* Thunb.
習性：多年生草本。花期：3-4 月；果期：5-6 月。
產地：栽培。
分佈：西南、華南、華中、華東和甘肅、陝

西等省區。日本。
用途：藥用。

小花鳶尾 Hong Kong iris

Iris speculatrix Hance

習性：多年生草本。花期：5月；果期：7-8月。

產地：鶴咀、大潭、大東山、蒲台島。生於濕潮草地、林下。

分佈：西南、華南至華東。

鳶尾 Crested iris

***Iris tectorum** Maxim.

習性：多年生草本。花期：4-5月；果期：6-8月。

產地：栽培。

分佈：西南、華南、華東、華北。

用途：觀賞、藥用。

肖鳶尾屬 *Moraea* Mill.

肖鳶尾 African iris

***Moraea iridioides** L.

習性：多年生草本。花期：4-5月；果期：6-8月。

產地：栽培。

分佈：熱帶非洲。

用途：觀賞。

新瑪麗雅屬 *Neomarica* Sprag.

新瑪麗雅 Walking iris

***Neomarica northiana** (Schneev.) Sprag.

習性：多年生草本。花期：4月。

產地：動植物公園、城門。栽培。

分佈：原產巴西。

用途：觀賞。

庭菖蒲屬 *Sisyrinchium* L.

***Sisyrinchium rosulatum** E. P. Brick.

習性：多年生草本。

產地：大東山。逸為野生。

分佈：原產南美洲。

南非鳶尾屬 *Sparaxis* Ker-Gawl.

南非鳶尾 Large flower wandflower

***Sparaxis grandiflora** Ker-Gawl.

習性：多年生草本。花期：3月。

產地：栽培。

分佈：原產南非。

用途：觀賞。

虎皮花屬 *Trigridia* Juss.

虎皮花

***Trigridia pavonia** (L. f.) Ker-Gawl.

習性：多年生草本。花期：7月。

產地：栽培。

分佈：原產危地馬拉、墨西哥。

用途：觀賞。

378. 蘆薈科 *Aloeaceae*

蘆薈屬 *Aloe* L.

蘆薈 Chinese aloe

***Aloe vera** var. **chinensis** (Haw.) Berg.

習性：多年生草本。花期：春季。

產地：栽培。

分佈：華南、印度。

用途：藥用、觀賞。

火把花屬 *Kniphofia* Moench.

火把花 Torch lily

***Kniphofia uvaria** Hook.

習性：多年生草本。花期：3月。

產地：栽培。

分佈：原產南部非洲。

用途：觀賞。

379. 龍舌蘭科 *Agavaceae*

龍舌蘭屬 *Agave* L.

龍舌蘭 Century plant

†***Agave americana** L.

習性：多年生草本。

產地：栽培。

分佈：華南有栽培。原產美洲。

用途：觀賞、纖維。品種有金邊龍舌蘭

‘Marginata’。

狹葉龍舌蘭 Narrow leaf century plant

***Agave angustifolia** Haw.

習性：多年生草本。

產地：栽培。

分佈：熱帶地區常見栽培。

用途：觀賞。

朱蕉屬 *Cordyline* Comm. ex Juss.

朱蕉 Tree of King

***Cordyline fruticosa** (L.) A. Cheval [*Cordyline terminalis* (L.) Kunth]

習性：多年生灌木狀。花期：8月。

產地：栽培。

分佈：海南、廣東、廣西、福建、臺灣。亞洲熱帶地區廣泛栽培。

用途：觀賞。

龍血樹屬 *Dracaena* Vand. ex L.

長花龍血樹 Narrow leaf dracaena

†***Dracaena angustifolia** Roxb.

習性：多年生草本。花期：春季。

產地：栽培。

分佈：海南、雲南、臺灣。亞洲東南部。

用途：觀賞、纖維。

龍血樹（龍樹） Dragon tree

***Dracaena draco** L.

習性：多年生草本。

產地：栽培。

分佈：原產加那利群島。

用途：觀賞、藥用。

巴西鐵樹 Fragrant dragon

***Dracaena fragrans** (L.) Ker-Gawl.

習性：多年生草本。

產地：栽培。

分佈：原產非洲。

用途：觀賞。品種有金邊巴西鐵樹‘Massangiana’、銀邊巴西鐵樹‘Rothiana’。

紅邊鐵樹 Madagascar dragon

***Dracaena marginata** Lam.

習性：喬木狀。

產地：栽培。

分佈：原產馬達加斯加。

用途：觀賞。

分枝鐵樹 Song of India

†***Dracaena reflexa** cv. **Variegata** [*Pleomele reflexa* (Lam.) N. E. Br.]

習性：灌木狀。

產地：栽培。

分佈：原產馬達加斯加。熱帶地區常見栽培。

用途：觀賞。

辛氏龍樹 Belgium evergreen

***Dracaena sanderiana** Sander ex M. T. Mast.

習性：灌木狀。

產地：栽培。

分佈：原產非洲。熱帶地區常見栽培。

用途：觀賞。

縫線麻屬 *Furcraea* Vent.

縫線麻 Giant Cabuya, Green Aloe

†***Furcraea foetida** (L.) Haw. (*Furcraea gigantea* Vent.)

習性：多年生草本。

產地：栽培。

分佈：原產美洲。

用途：觀賞。品種有花葉縫線麻‘Striata’。

晚香玉屬 *Polianthes* L.

晚香玉 Tuberose

***Polianthes tuberosa** L.

習性：多年生草本。花期：8-9月。

產地：栽培。

分佈：華南有栽培。熱帶地區常見栽培；原產墨西哥。

用途：芳香植物。

虎尾蘭屬 *Sansevieria* Thunb.

圓柱虎尾蘭 *Spear sansevieria*

**Sansevieria cylindrica* Bojer

習性：多年生草本。

產地：栽培。

分佈：熱帶地區常見栽培。原產非洲。

用途：觀賞。

虎尾蘭 Snake plant

**Sansevieria trifasciata* Prain

習性：多年生草本。花期：7-8月。

產地：栽培。

分佈：海南、廣東有栽培。原產非洲。現熱帶地區常見栽培。

用途：觀賞、纖維。品種有金邊虎尾蘭 'Laurentii'。

絲蘭屬 *Yucca* L.

大絲蘭 Palm lily

**Yucca gloriosa* L.

習性：多年生草本。花期：5-8月。

產地：栽培。

分佈：熱帶地區常見栽培。原產北美。

用途：觀賞。

382. 蒟蒻薯科 *Taccaceae*

裂果薯屬 *Schizocapsa* Hance

裂果薯 Lobed Fruit Tacca

Schizocapsa plantaginea Hance [*Tacca plantaginea* (Hance) Drenth]

習性：多年生草本。花期：5-8月。

產地：淺水灣、金夫人馳馬徑。

分佈：廣東、廣西、貴州、雲南、湖南、福建、江西。泰國、越南、老撾。

用途：藥用。

383. 百部科 *Stemonaceae*

百部屬 *Stemona* Lour.

大百部 (百部) *Stemona*

Stemona tuberosa Lour.

習性：多年生草本。花期：5-8月。

產地：柏架山。生於林下蔭濕處。

分佈：長江流域以南各省區。印度、中南半島、菲律賓。

用途：藥用。

384. 菝葜科 *Smilacaceae*

肖菝葜屬 *Heterosmilax* Kunth

肖菝葜

Heterosmilax japonica var. *gaudichaudiana* (Kunth) Maxim.

習性：攀援灌木。花期：6-8月；果期：7-11月。

產地：香港各地。生於山坡、路旁陽處。

分佈：海南、廣東、廣西、福建。越南。

菝葜屬 *Smilax* L.

灰葉菝葜 Greyleaf greenbrier

Smilax astrosperma Wang & Tang

習性：攀援灌木。花期：3月。

產地：大帽山、大東山。生於疏林中。

分佈：海南、廣西。

菝葜 Greenbrier

Smilax china L.

習性：攀援灌木。花期：2-5月；果期：9-11月。

產地：香港各地。生於灌叢、山坡等處。

分佈：長江流域以南各省區。緬甸、泰國、越南、菲律賓。

筐條菝葜 Long-leaved greenbrier

Smilax corbularia Kunth

習性：攀援灌木。花期：5-7月；果期：12月。

產地：香港各地。生於林下或灌叢中。

分佈：雲南、海南、廣西、廣東。越南、緬甸。

土茯苓 (光葉菝葜) Glabrous greenbrier

Smilax glabra Roxb.

習性：攀援灌木。花期：7-11月；果期：11

月至翌年4月。

產地：香港各地。生於林下或灌叢中。

分佈：長江流域以南各省區。印度、越南、泰國。

用途：藥用。

暗色菝葜 Opaque greenbrier

Smilax lanceifolia var. **opaca** A. DC. (*Smilax lanceifolia* auct non Roxb.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：攀援灌木。花期：9-11月；果期：11月至翌年4月。

產地：西貢、大埔、盧吉道、夏力道、大嶼山。生於林下或灌叢中。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、貴州、湖南、江西、福建、臺灣、浙江。中南半島至印度尼西亞。

385. 薯蕷科 Dioscoreaceae

薯蕷屬 *Dioscorea* L.

參薯 Winged Yam

***Dioscorea alata** L.

習性：藤本。花期：11月至翌年1月；果期：12月至翌年1月。

產地：栽培。

分佈：長江以南廣為栽培。原產孟加拉。

用途：食用；藥用。

山藥 Chinese Yam

Dioscorea batatas Decne.

習性：藤本。花期：5—7月；果期：7—8月。

產地：栽培。

分佈：我國南北各地均有栽培。東亞。

用途：食用。

大青薯 (邊氏薯蕷) Bentham's Yam

Dioscorea benthamii Prain & Burkill

習性：藤本。花期：5-6月；果期：7-9月。

產地：馬鞍山、大嶼山、西貢、石澳。生於次生林或灌叢中。

分佈：廣東、廣西、福建、臺灣。

黃獨 Airpotato

Dioscorea bulbifera L. (*Dioscorea sativa* auct. non L.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：藤本。花期：7-10月；果期：8-11月。

產地：香港島、大埔滘、林村。生於次林中或路旁。

分佈：華南、華東、西南及河南、陝西、甘肅。

用途：藥用。

薯蕷

Dioscorea cirrhosa Lour.

習性：藤本。花期：4-6月；果期：7月至翌年1月。

產地：香港各地。生於次林中。

分佈：華南、華東、西南各省區。

用途：染料、釀酒及藥用。

山薯 Ford's Yam

Dioscorea fordii Prain & Burkill (*Dioscorea batatas* auct. non Decne.: Check List HK Pl. 1993.)

習性：藤本。花期：10月至翌年11月。

產地：香港島、大埔、鳳園、大嶼山。

分佈：廣東、廣西、湖南、福建、浙江。

福州薯蕷 Foochow Yam

†**Dioscorea futschauensis** Uline ex R. Knuth

習性：藤本。花期：6-7月；果期：7-10月。

產地：東平洲。生於次生林或灌叢中。

分佈：廣東、廣西、湖南、福建、浙江。

用途：藥用。

白薯蕷 White Yam

Dioscorea hispida Dennst.

習性：藤本。花期：4-5月；果期：7-9月。

產地：香港島、鳳園、蓮澳。生於低海拔次生林中。

分佈：廣東、廣西、福建、雲南、西藏。

用途：塊莖爲外用藥，但有劇毒。

五葉薯蕷 Five-leaved Yam

Dioscorea pentaphylla L.

習性：藤本。花期：8-10月；果期：11月至翌年2月。

產地：馬鞍山、青山。生於林緣或路旁。

分佈：海南、廣東、廣西、江西、湖南、福建、臺灣、雲南、西藏。

褐苞薯蕷 Brownbract Yam

Dioscorea persimilis Prain & Burkill

習性：藤本。花期：7月至翌年1月；果期：9月至翌年1月。

產地：大埔、林村、西貢、大鴉洲。

分佈：廣東、廣西、湖南、雲南、貴州。

387. 水玉簪科

Burmanniaceae

水玉簪屬 *Burmannia* L.

頭花水玉簪 Champion *Burmannia*

Burmannia championii Thw.

習性：一年生腐生草本。花期：6-7月。

產地：紫羅蘭山。腐生於樹根上。

分佈：廣東。斯里蘭卡、馬來西亞、印度尼西亞、日本。

三品一枝花 (雛錫杖) Blue burmannia

Burmannia coelestis D. Don

習性：一年生草本。花期：10-11月。

產地：上水。生於濕地上。

分佈：廣東、廣西、雲南、貴州、江西、浙江。亞洲熱帶地區廣佈。

纖草 Ito *Burmannia*

Burmannia itoana Makino

習性：一年生腐生草本。花期：11月。

產地：大潭、城門。生於林下。

分佈：海南、廣東、廣西、臺灣。日本。

香港水玉簪 Hong Kong *Burmannia*

Burmannia pusilla var. *hongkongensis* Jonk.

習性：一年生草本。花期：8-11月。

產地：大潭、河背。

分佈：中國東南部各省區。

亭立 (華氏水玉簪) Wallich's *Burmannia*

Burmannia wallichii (Miers) Hook. f.

習性：一年生腐生草本。花期：10-11月。

產地：鶴咀、大埔滘。

分佈：海南。印度、緬甸至馬來半島、日本。

389. 蘭科 Orchidaceae

脆蘭屬 *Acampe* Lindl.

多花脆蘭(蕉蘭) Banana Orchid

Acampe rigida (Buch.-Ham. ex J. E. Sm.) P.

Hunt

習性：附生草本。花期：8-9月；果期：10-11月。

產地：石澳、東涌、大嶼山。附生於林中樹幹上或岩石上。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、貴州。熱帶亞洲、非洲。

纓花蘭屬 *Acanthephippium* Blume

中華纓花蘭(纓花蘭) Chinese Jug Orchid

Acanthephippium sinense Rolfe

習性：地生草本。花期：4月。

產地：大帽山。

分佈：廣東。

開唇蘭屬 *Anoectochilus* Blume

小片齒唇蘭

Anoectochilus abbreviatus (Lindl.) Seidenf.

習性：地生草本。花期：秋。

產地：地點不詳。生於山坡或溝谷林下陰濕處。

分佈：海南、廣東、廣西。尼泊爾、印度、泰國。

香港金線蘭 (容氏開唇蘭) Hong Kong

Jewel Orchid

Anoectochilus yungianus S. Y. Hu

習性：地生草本。花期：11月至次年1月。
產地：大帽山、馬鞍山。生於林下陰濕處。
分佈：香港特有種。

無葉蘭屬 *Aphyllorchis* Blume

無葉蘭

Aphyllorchis montana Reichb. f.

習性：腐生草本。
產地：沙田。
分佈：海南、廣西、雲南、臺灣。

牛齒蘭屬 *Appendicula* Blume

牛齒蘭 Ladder Orchid

Appendicula cornuta Blume

習性：附生草本。花期：7-8月；果期：9-10月。
產地：柏架山、馬鞍山、大埔滘、黃龍坑。
生於林中岩石上。
分佈：海南、廣東、廣西、雲南。南亞至東南亞。

竹葉蘭屬 *Arundina* Blume

竹葉蘭 Bamboo Orchid

Arundina graminifolia (D. Don) Hochr. (*Arundina chinensis* var. *major* S. Y. Hu)

習性：地生草本。花期：7—12月。
產地：香港各地。
分佈：廣佈於華中、華南、西南及浙江、福建、臺灣等省。熱帶亞洲。
用途：藥用、觀賞。

白芨屬 *Bletilla* Reichb. f.

白芨 Common Bletilla

**Bletilla striata* (Thunb. ex A. Murray) Reichb. f.

習性：地生草本。花期：2—3月。
產地：栽培。
分佈：陝西、甘肅、長江流域各省及華南的北部。朝鮮、日本。
用途：藥用、觀賞。

苞葉蘭屬 *Brachycorythis* Lindl.

短距苞葉蘭 (短盔蘭) Shortspur *Brachycorythis*

Brachycorythis galeandra (Reichb. f.) Summ.

習性：地生草本。花期：6—7月。
產地：扯旗山、馬鞍山、城門。生於山坡下或溝邊陰濕處。
分佈：廣東、廣西、貴州、雲南、四川、湖南、臺灣。

石豆蘭屬 *Bulbophyllum* Thouars

赤唇石豆蘭

Bulbophyllum affine Lindl.

習性：附生草本。花期：5—7月。
產地：大嶼山。生於溪邊石上。
分佈：海南、廣東、廣西、雲南、四川、臺灣。越南、老撾、泰國、印度及日本。

芳香石豆蘭 (馥石蘭) *Ambrosira* Orchid

Bulbophyllum ambrosium (Hance) Schltr.

習性：附生草本。花期：3—5月。
產地：大嶼山、東涌、扯旗山。
分佈：福建、廣東、海南、雲南。

二色石豆蘭 (二色卷瓣蘭) Two-coloured *Bulbophyllum*

Bulbophyllum bicolor Lindl. [*Cirrhopetalum bicolor* (Lindl.) Rolfe]

習性：附生草本。花期：5月。
產地：大帽山。
分佈：香港特有。

直唇石豆蘭 (直唇卷瓣蘭) Straight-lipped *Bulbophyllum*

Bulbophyllum delitescens Hance [*Cirrhopetalum delitescens* (Hance) Rolfe]

習性：附生草本。花期：2—7月。
產地：扯旗山、鶴咀、大帽山。生於林中樹幹上或山谷溪邊岩石上。
分佈：海南、廣東、雲南、西藏、福建。印

度、越南。

廣東石豆蘭

†*Bulbophyllum kwangtungense* Schltr.
(*Bulbophyllum radiatum* auct. non Lindl.:
Check List HK. Pl. 1993.)

習性：附生草本。花期：5-8 月。

產地：香港島、荃灣、沙田、大埔、大嶼山。
分佈：雲南、貴州、廣西、廣東、湖南、江
西、福建、浙江。

齒瓣石豆蘭

Bulbophyllum levinei Schltr.

習性：附生草本。花期：5-8 月。

產地：大帽山。生於林中樹幹上或溝谷岩石
上。
分佈：廣東、廣西、湖南、江西、福建、浙
江。

香石豆蘭（密花石豆蘭） Densely-flowered
Bulbophyllum

Bulbophyllum odoratissimum (Sm.) Lindl.

習性：附生草本。花期：2-6 月。

產地：大帽山。
分佈：福建、廣東、廣西、四川、雲南、西
藏。尼泊爾、錫金、不丹、印度、緬
甸、泰國、老撾、越南。

斑唇卷瓣蘭

Bulbophyllum pectenveners (Gagnep.)
Seidenf.

習性：附生草本。花期：4-9 月。

產地：沙田。生於石上。
分佈：海南、廣西、湖北、福建、臺灣、安
徽。越南、老撾。

虎斑卷瓣蘭 Tiger *Bulbophyllum*

Bulbophyllum retusiusculum var. *tigrinum*
(Hance) Z. H. Tsi [*Cirrhopetalum*
tigrinum (Hance) Rolfe; *Bulbophyllum*
tigrinum Hance]

習性：附生草本。花期：9—11 月。

產地：大帽山。生於石上。

分佈：廣東。

短足石豆蘭 Hong Kong *Bulbophyllum*

Bulbophyllum stenobulbon Par. & Reichb. f.
(*Bulbophyllum youngseyeanum* S. Y.
Hu & Barretto; *Bulbophyllum hastatum*
auct. non Tang & Wang; Check List HK
Pl. 1993.)

習性：附生草本。花期：1—5 月。

產地：大帽山。生於林中樹幹上或岩石上。
分佈：廣東、雲南。錫金、不丹、緬甸、泰
國、老撾、越南。

香港卷瓣蘭

Bulbophyllum tseanum (S. Y. Hu & Barretto)
Z. H. Tsi (*Cirrhopetalum tseanum* S. Y.
Hu & Barretto)

習性：附生草本。花期：4 月。

產地：沙田、沙頭角。生於岩石上。

蝦脊蘭屬 *Calanthe* R. Br.

二列葉蝦脊蘭（八仙蘭） Yellow-flowered
Calanthe

Calanthe formosana Rolfe (*Calanthe*
patsinensis S. Y. Hu)

習性：地生草本。花期：10—11 月。

產地：大埔滘、八仙嶺、沙頭角。生於林下
陰濕處。

分佈：海南、臺灣。

鈎距蝦脊蘭 Common *Calanthe*

Calanthe graciliflora Hayata
(*Calanthe discolor* auct. non Lindl.:
Check List HK Pl. 1993.)

習性：地生草本。花期：3-5 月。

產地：大東山。

分佈：廣東、湖南、湖北、江西、安徽、浙
江、四川、臺灣。

長距蝦脊蘭 Forest *Calanthe*

Calanthe sylvatica (Thou.) Lindl. (*Calanthe*

masuca Lindl. var. *sinensis* Rendle)

習性：地生草本。花期：4-9 月。

產地：扯旗山、馬鞍山、大嶼山。生於林下陰濕處。

分佈：廣東、廣西、雲南、西藏、湖南、臺灣。尼泊爾、印度、泰國、馬來西亞、印度尼西亞、日本。

用途：觀賞。

三褶蝦脊蘭 (白花蝦脊蘭) *Triplicate Calanthe*

Calanthe triplicata (Willemet) Ames

習性：地生草本。花期：3—7 月。

產地：深水灣、沙田、沙頭角、大嶼山。生於林下。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、福建、臺灣。亞洲熱帶地區、澳大利亞、馬達加斯加。

用途：觀賞。

黃蘭屬 *Cephalantheropsis*
Guillaumin

嶺南黃蘭 *Slender Calanthe*

Cephalantheropsis gracilis (Lindl.) S. Y. Hu

習性：地生草本。花期：11—3 月。

產地：扯旗山、城門水塘、八仙嶺。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、福建、臺灣。印度、緬甸、老撾、泰國、馬來西亞。

叉柱蘭屬 *Cheirostylis* Blume

中華叉柱蘭 *Large Caterpillar Orchid*

Cheirostylis chinensis Rolfe

習性：附生草本。花期：5—6 月。

產地：新界。生於林下溪旁石上或地上。

分佈：廣西、貴州、臺灣。菲律賓。

粉紅叉柱蘭

Cheirostylis jamesleungii S. Y. Hu & Barretto

習性：地生草本。花期：3 月。

產地：大嶼山。生於海拔 600 米的長苔蘚的石凹中或濕土上。

分佈：香港特有種。

琉球叉柱蘭

Cheirostylis liukuensis Masam.

習性：地生草本。花期：1—2 月。

產地：沙田。生於山谷。

分佈：臺灣。日本。

箭藥叉柱蘭 *Monter's Caterpillar Orchid*

Cheirostylis monteiroi S. Y. Hu & Barretto

習性：地生草本。花期：3—5 月。

產地：香港島（紫羅蘭山）。生於海拔 300 米的溪旁陡壁林下。

分佈：香港特有種。

大魯閣叉柱蘭 *Bride's Pool Caterpillar Orchid*

Cheirostylis tatewakii Masamuni ex S. S. Ying (*Cheirostylis clibborndyeri* S. Y. Hu & Barretto)

習性：附生草本。花期：1 月。

產地：香港各地。生於山坡林下。

分佈：臺灣。

隔距蘭屬 *Cleisostoma* Blume

尖喙隔距蘭 (福氏隔距蘭) *Rostrate Cleisostoma*

Cleisostoma fordii Hance [*Cleisostoma nostiata* (Lindl.) Garay]

習性：附生草本。花期：7—8 月。

產地：南涌、二澳。生於林中樹幹上或陰濕岩石上。

分佈：海南、廣東、廣西、貴州、雲南。泰國、老撾、越南。

大序隔距蘭 *Paniculate Cleisostoma*

Cleisostoma paniculatum (Ker-Gawl.) Garay [*Sarcanthus paniculatus* (Ker-Gawl.) Lindl.]

習性：附生草本。花期：5-9 月。

產地：大嶼山。

分佈：海南、廣東、廣西、貴州、雲南、四

川、西藏、江西、福建、臺灣。泰國、越南、印度。

廣東隔距蘭 (柱葉隔距蘭) Terete
Cleisostoma

***Cleisostoma simondii* var. *guangdongense* Z. H. Tei** (*Cleisostoma teres* auct. non Garay: Check List HK Pl. 1993.)

習性：附生草本。花期：5—11月。

產地：香港各地。

分佈：廣東、海南、福建。

紅花隔距蘭

***Cleisostoma williamsonii* (Reichb. f.) Garay**
[*Cleisostoma hongkongensis* (Rolfe) Garay]

習性：附生草本。花期：4—6月。

產地：馬鞍山。生於林中樹幹上。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南。熱帶亞洲。

貝母蘭屬 *Coelogyne* Lindl.

流蘇貝母蘭 Fimbriate *Coelogyne*

***Coelogyne fimbriata* Lindl.** (*Coelogyne leungiana* S. Y. Hu; *Coelogyne primulina* G. Barretto)

習性：附生草本。花期3—10月。

產地：香港各地。生於林中樹幹上。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、西藏、江西。錫金、印度、越南、泰國、老撾、柬埔寨、馬來西亞。

隱柱蘭屬 *Cryptostylis* R. Br.

隱柱蘭 Spider-like *Cryptostylis*

***Cryptostylis arachnites* (Blume) Hassk.**

習性：地生草本。花期：4月。

產地：香港島、西貢。

分佈：廣東、廣西、臺灣。東南亞、南亞以及南太平洋島嶼。

蘭屬 *Cymbidium* Sw.

紋瓣蘭 Aloeleaf *Cymbidium*

****Cymbidium aloifolium* (L.) Sw.** [*Cymbidium*

pendulum (Roxb.) Sw.]

習性：附生草本。花期：4—6月。

產地：栽培。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、貴州。熱帶亞洲。

用途：觀賞。

建蘭 Swordleaf *Cymbidium*

***Cymbidium ensifolium* (L.) Sw.**

習性：地生草本。花期：8—10月。

產地：香港島、大帽山、馬鞍山、大嶼山。

分佈：華東、中南、西南、臺灣。南亞至東南亞、日本。

用途：觀賞。

寒蘭 Smoothlip *Cymbidium*

†****Cymbidium kanran* Makino**

習性：地生草本。花期：11—2月。

產地：馬鞍山。

分佈：華東、華南、西南、臺灣。日本、韓國。

用途：觀賞。

兔耳蘭 Lanceolate *Cymbidium*

***Cymbidium lancifolium* Hook.** (*Cymbidium maclehoseae* S. Y. Hu)

習性：地生草本。花期：4月。

產地：大帽山。生於疏林下。

分佈：海南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、西藏、湖南、福建、浙江、臺灣。日本、印度、印度尼西亞。

用途：觀賞。

墨蘭 Chinese *Cymbidium*

***Cymbidium sinense* (Andr.) Willd.**
[*Cymbidium sinense* var. *albo-juncundissimum* (Hayata) Masamune]

習性：地生草本。花期：10-3月。

產地：大帽山、大東山。

分佈：華東、華南、西南、臺灣。印度、緬甸、老撾、越南、柬埔寨、泰國、日

本。
用途：觀賞。

石斛屬 *Dendrobium* Sw.

劍葉石斛 *Sword-leaved Dendrobium*

Dendrobium acinaciforme Roxb.

習性：附生草本。花期：2月。

產地：大嶼山。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、福建。緬甸、老撾、越南、柬埔寨、泰國、印度。用途：觀賞。

鈎狀石斛 *Hooked Dendrobium*

Dendrobium aduncum Wall. ex Lindl.

習性：附生草本。花期：6—8月。

產地：沙田。

分佈：海南、廣東、廣西、貴州、雲南、湖南。印度、緬甸、泰國、越南。

用途：觀賞、藥用。

美花石斛 *Loddiges Dendrobium*

Dendrobium loddigesii Rolfe

習性：附生草本。花期：4—5月。

產地：香港島、大嶼山。

分佈：海南、廣東、廣西、貴州、雲南。老撾、越南。

用途：觀賞、藥用。

金釵石斛 *Noble Dendrobium*

****Dendrobium nobile*** Lindl.

習性：附生草本。花期：4月。

產地：栽培。

分佈：華南、西南和湖北、臺灣。錫金、尼泊尔、不丹、印度、緬甸、老撾、泰國、越南。

用途：藥用、觀賞。

蛇舌蘭屬 *Diploprora* Hook. f.

蛇舌蘭 *Champion's Diploprora*

Diploprora championii (Lindl.) Hook. f.

習性：附生草本。花期：2-8月；果期：3-9月。

產地：香港各地。附生於林中樹幹上或岩石上。

分佈：海南、廣西、雲南、福建、臺灣。錫金、印度、緬甸、泰國、越南。

雙袋蘭屬 *Disperis* Sw.

香港雙袋蘭（象鼻蘭） *Lantau Disperis*

Disperis lantauensis S. Y. Hu

習性：附生草本。花期：7月。

產地：飛鵝山、大東山。生於草坡上。

分佈：香港特有種。

樹蘭屬 *Epidendrum* L.

樹蘭

****Epidendrum ibaguense*** H. B. & K.

習性：附生草本。花期：夏季。

產地：引種栽培。

分佈：原產熱帶美洲。

虎舌蘭屬 *Epipogium* J. Gmelin ex Borkh.

虎舌蘭 *Common Epipogium*

Epipogium roseum (D. Don) Lindl.

習性：腐生草本。花期：5月。

產地：扯旗山。生於林下蔭蔽處。

分佈：海南、廣東、雲南、西藏、臺灣。尼泊尔、錫金、印度、泰國。

毛蘭屬 *Eria* Lindl.

半柱毛蘭 *Corner Eria*

Eria cornerii Reichb. f.

習性：地生草本。花期：8-9月；果期：10-12月。

產地：大帽山、柏架山。

分佈：臺灣、福建、海南、廣東、廣西、貴州、雲南。越南、日本（琉球群島）。

香港毛蘭

Eria gagnepainii Hawkes & Heller

習性：地生草本。花期：2-4月。

產地：沙田。

分佈：海南、雲南、西藏。越南。

白綿毛蘭 Downy Eria

Eria lasiopetala (Willd.) Ormerod [*Eria pubescens* (Hook.) Steud; *Eria flava* Lindl.]

習性：附生草本。花期：11—4月。

產地：火炭、大埔。附生於林中樹幹或岩石上。

分佈：海南。印度。

對莖毛蘭

†**Eria pusilla** (Griff.) Lindl.

習性：附生草本。花期：10-11月。

產地：大帽山。附生於林中樹幹或岩石上。

分佈：廣東、廣西、雲南、西藏、福建。印度、緬甸、越南、泰國。

玫瑰毛蘭 Rosy Eria

Eria rosea Lindl.

習性：附生草本。花果期：1—5月。

產地：馬鞍山、烏蛟騰、大嶼山。附生於林中樹幹或岩石上。

分佈：海南、廣東。

小毛蘭 Tiny Eria

Eria sinica (Lindl.) Lindl. [*Eria pusilla* auct. non (Griff.) Lindl.: Benth.: Fl. Hongk. 353. 1861.]

習性：附生草本。花期：10-11月。

產地：大帽山、大嶼山。

分佈：海南。

美冠蘭屬 *Eulophia* R. Br. ex Lindl.

黃花美冠蘭 Yellowflower *Eulophia*

Eulophia flava (Lindl.) Hook. f.

習性：地生草本。花期：3—10月。

產地：大潭、鶴咀、大嶼山、南丫島。

分佈：海南、廣西。尼泊爾、印度、緬甸、越南、泰國。

用途：觀賞。

美冠蘭 Pale purple *Eulophia*

Eulophia graminea Lindl. (*Eulophia sinensis* Miq.)

習性：地生草本。花期：4—8月。

產地：林村、蠔涌。

分佈：海南、廣東、廣西、貴州、雲南、安徽、臺灣。熱帶亞洲。

用途：觀賞。

無葉美冠蘭 Hong Kong *Eulophia*

Eulophia zollingerii (Reichb. F.) S. S. Smith (*Eulophia yushuiana* S. Y. Hu)

習性：地生草本。花期：5—6月。

產地：新界、清水灣。生於疏林下。

分佈：雲南、廣西、廣東、江西、臺灣。印度、斯里蘭卡、馬來西亞、印度尼西亞。日本及琉球群島。

盆距蘭屬 *Gastrochilus* D. Don

黃松盆距蘭

Gastrochilus japonicus (Makino) Schltr. (*Gastrochilus holttumianus* S. Y. Hu & Barreto)

習性：附生草本。

產地：香港島。生於林中樹幹上。

分佈：臺灣。日本（琉球群島）。

地寶蘭屬 *Geodorum* Jackson

地寶蘭（密花地室蘭） Dense-flowered *geodorum*

Geodorum densiflorum (Lam.) Schltr.

習性：地生草本。花期：6—7月。

產地：黃泥涌、香港仔、西貢。生於林下溪旁。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、貴州、臺灣。菲律賓。熱帶亞洲。

斑葉蘭屬 *Goodyera* R. Br.

多葉斑葉蘭 Many-leaved Rattlesnake-Plantain

Goodyera foliosa (Lindl.) Benth. ex Hook. f.

習性：地生草本。花期：9月至翌年1月。

產地：大帽山。

分佈：廣東、雲南。緬甸。

白花多葉斑葉蘭

Goodyera foliosa var. **alba** S. Y. Hu & Barretto

習性：草本。

產地：荃灣。生於溪邊。

分佈：香港特有。

高斑葉蘭 Tall Rattlesnake-Plantain

Goodyera procera (Ker-Gawl.) Hook.

習性：地生草本。花期：3—4月。

產地：香港各地。

分佈：華南、華東、西南。斯里蘭卡、南亞至東南亞、菲律賓、日本。

用途：藥用。

歌綠斑葉蘭 (香港斑葉蘭) Youngsay's Rattlesnake-Plantain

Goodyera seikoomontana Yamamoto
(*Goodyera youngsayei* S. Y. Hu & Barretto)

習性：地生草本。

產地：八仙嶺。生於林下陰濕處。

分佈：香港特有種。

綠花斑葉蘭 Green-flowered Rattlesnake-Plantain

Goodyera viridiflora (Blume) Blume
[*Goodyera cordata* (Lindl.) Hook. f.]

習性：地生草本。花期：8—11月。

產地：薄扶林、大帽山。生於林下陰濕處。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、江西、福建、臺灣。東亞至東南亞、菲律賓、澳大利亞。

小小斑葉蘭

Goodyera yanmeishanensis T. P. Lin

習性：地生草本。花期：8-9月。

產地：柏架山。

分佈：臺灣。

玉鳳花屬 *Habenaria* Willd.

毛葶玉鳳花 Cilia Orchid

Habenaria ciliaris Kraenzl.

習性：地生草本。花期：7-9月。

產地：香港島。生於山坡或溝邊林下陰處。

分佈：海南、廣東、廣西、貴州、湖北、湖南、江西、福建、浙江、臺灣。

香港玉鳳花 Hongkong *Habenaria*

Habenaria coulousii Barretto

習性：地生草本。花期：10月。

產地：大潭。生於海拔300米左右的山坡或林下。

分佈：香港特有種。

鵝毛玉鳳花 (齒片鸞蘭) Toothed *Habenaria*

Habenaria dentata (Sw.) Schltr.

習性：地生草本。花期：7-9月。

產地：香港各地。

分佈：長江流域以南各省區。尼泊爾、錫金、印度、緬甸、越南、老撾、泰國、柬埔寨、日本。

用途：觀賞。

天使蘭(仙子蘭) Fairy Orchid

Habenaria leptoloba Benth.

習性：地生草本。花期：8月。

產地：鶴咀、香港仔、粉嶺。生於林下陰濕處或草地上。

分佈：廣東。

坡參 Tongue *Habenaria*

Habenaria linguella Lindl.

習性：地生草本。花期：6—9月。

產地：香港島、大帽山、馬鞍山、粉嶺、大嶼山。生於山坡林下或草地。

分佈：廣東、廣西、雲南、貴州。越南。

腎葉玉鳳花 Kidney-leaved *Habenaria*

Habenaria reniformis (D. Don) Hook. f.

習性：地生草本。花期：7—8月。

產地：柏架山、扯旗山、西貢。
分佈：海南、廣東。尼泊爾、印度、越南、
柬埔寨、泰國。

橙黃玉鳳花 (紅人蘭) Redclawed Habenaria
Habenaria rhodochella Hance

習性：地生草本。花期：7—9月。
產地：香港仔、大帽山、蠔涌、飛鵝山、大
嶼山。生於山坡或溝谷林下。
分佈：海南、廣東、廣西、貴州、湖南、江
西、福建。越南、老撾、柬埔寨、泰
國、馬來西亞、菲律賓。
用途：觀賞。

翻唇蘭屬 *Hetaeria* Blume

白肋翻唇蘭 (亮葉翻唇蘭)

Hetaeria cristata Blume
習性：地生草本。花期：9-10月。
產地：香港島、荃灣、大埔、沙頭角。生於
山坡林下。
分佈：臺灣。日本、菲律賓、印度尼西亞。

卵葉翻唇蘭 Shinyleaf *Hetaeria*

Hetaeria nitida Ridl.
習性：地生草本。花期：4月。
產地：香港島。
分佈：新加坡、泰國。

羊耳蒜屬 *Liparis* Rich.

鏹翅羊耳蒜 Bhutan Twayblade

Liparis bootanensis Griff. (*Liparis*
ruybarrettoi S. Y. Hu & Barretto)
習性：附生草本。花期：10—1月。
產地：大帽山、馬鞍山、北大刀岩、大嶼山。
分佈：海南、廣東、廣西、雲南、四川、湖
南、福建、臺灣。錫金、不丹、印度、
緬甸、越南、泰國、馬來西亞、印度
尼西亞、菲律賓、日本。

銹色羊耳蒜 Rusty-leaf Twayblade

†**Liparis ferruginea** Lindl.
習性：地生草本。花期：5-6月。

產地：榕樹澳。生於潮濕地。
分佈：海南、福建。泰國、柬埔寨、馬來西
亞、印度尼西亞。

見血青(脈羊耳蒜) Nerved Twayblade

Liparis nervosa (Thunb. ex A. Murray) Lindl.
習性：地生草本。花期：1—5月。
產地：香港各地。
分佈：華南、華東、西南各省區。熱帶、亞
熱帶地區廣佈。
用途：藥用。

紫花羊耳蒜

Liparis nigra Seidenf.
習性：地生草本。花期：2-5月。
產地：西貢、大嶼山。
分佈：海南、廣東、廣西、雲南、臺灣。

香花羊耳蒜 Fragrant Twayblade

Liparis odorata (Willd.) Lindl.
習性：地生草本。花期：4—7月。
產地：大東山。
分佈：華南、華東、西南各省區。印度、緬
甸、老撾、泰國、越南、日本。

扇唇羊耳蒜 Fan-lipped Twayblade

Liparis stricklandiana Reichb. f.
習性：附生草本。花期：10-次年1月。
產地：大帽山。生於山坡林下。
分佈：海南、廣東、廣西、雲南。不丹、錫
金、印度。

長莖羊耳蒜(綠花羊耳蒜) Green-flowered
Twayblade

Liparis viridiflora (Blume) Lindl.
習性：附生草本。花期：9—11月。
產地：大潭、大帽山。生於山坡林下。
分佈：海南、廣東、雲南、四川、西藏、臺
灣。南亞及東南亞。

血葉蘭屬 *Ludisia* A. Rich.

石蠶(異色血葉蘭) *Discolor ludisia*

Ludisia discolor (Ker-Gawl.) A. Rich.

習性：地生或附石草本。花期：2—3 月。

產地：香港島、青山、大嶼山。生於林下陰濕處。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南。緬甸、泰國、越南、馬來西亞、印度尼西亞和大西洋的納吐納群島。

用途：藥用、觀賞。

沼蘭屬 *Malaxis* Soland. ex Sw.

紫盾沼蘭 *Crimson-shield* Addermouth Orchid

Malaxis acuminata D. Don [*Malaxis allanii* S. Y. Hu; *Malaxis biloba* (Lindl.) Ames]

習性：地生草本。花期：6 月。

產地：沙田、大潭。

分佈：廣東、貴州、雲南、臺灣。尼泊爾、印度、緬甸、越南、老撾、印度尼西亞、爪哇、菲律賓、澳大利亞。

闊葉沼蘭 *Broadleaf* Addermouth Orchid

Malaxis latifolia J. E. Sm. (*Malaxis parvissima* S. Y. Hu & Barreto)

習性：地生草本。花期：5—7 月。

產地：大帽山、烏蛟騰、大東山。

分佈：海南、廣東、雲南。印度、越南、馬來西亞、澳大利亞。

球柄蘭屬 *Mischobulbum* Schltr.

心葉球柄蘭 *Heartleaf* *Mischobulbum*

Mischobulbum cordifolium (Hook. f.) Schltr.

習性：地生草本。花期：5—7 月。

產地：大嶼山。生於林下陰濕處。

分佈：廣東、廣西、雲南、福建、臺灣。越南。

用途：觀賞。

雲葉蘭屬 *Nephelaphyllum* Blume

雲葉蘭 *Cristate* *Nephelaphyllum*

Nephelaphyllum tenuiflorum Blume

(*Nephelaphyllum cristatum* Rolfe)

習性：地生草本。花期：6—7 月。

產地：扯旗山、馬鞍山、大嶼山。生於林下。

分佈：海南、廣東。

用途：觀賞。

芋蘭屬 *Nervilia* Comm. ex Gaudich.

毛葉芋蘭

Nervilia plicata (Andr.) Schltr. [*Nervilia fordii* auct. non (Hance) Schltr.: Check List HK Pl. 1993.]

習性：地生草本。花期：5—8 月。

產地：大潭、香港仔。生於林下。

分佈：廣東、廣西、四川、雲南。泰國、越南、印度、緬甸、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓等。

用途：藥用。

三蕊蘭屬 *Neuwildia* Blume

三蕊蘭

Neuwildia singaporeana (Baker) Rolfe

習性：地生草本。花期：5—6 月。

產地：香港島。生於林下。

分佈：海南、雲南。越南、泰國、新加坡、印度尼西亞。

粉口蘭屬 *Pachystoma* Blume

粉口蘭 *Pulescent* *Pachystoma*

Pachystoma pubescens Blume [*Pachystoma chinense* (Lindl.) Reichb. f.]

習性：地生草本。花期：3—5 月。

產地：奇力山、馬鞍山、西貢、粉嶺、大嶼山。

分佈：海南、廣東、廣西、貴州、雲南、臺灣。熱帶亞洲。

兜蘭屬 *Paphiopedilum* Pfitz.

卷萼兜蘭 *Rolledsepal* *Paphiopedilum*

†***Paphiopedilum appletonianum** Rolfe

習性：地生草本。花期：3—5 月。

產地：栽培。

分佈：海南、廣西。泰國、越南、老撾、柬埔寨、印度。

用途：觀賞。

杏黃兜蘭 Apricot-yellow Paphiopedilum

†***Paphiopedilum armeniacum** Chen & Liu

習性：地生草本。花期：3—5月。

產地：栽培。

分佈：雲南、緬甸。

用途：觀賞。

帶葉兜蘭 Hirsute Paphiopedilum

†***Paphiopedilum hirsutissimum** (Lindl. ex Hook.) Stein

習性：地生或附生草本。花期：4—5月。

產地：栽培。

分佈：廣西、貴州、雲南。印度。

用途：觀賞。

麻栗坡兜蘭 Malipo Paphiopedilum

†***Paphiopedilum malipoense** S. C. Chen & Tsi

習性：地生草本。花期：5月。

產地：栽培。

分佈：廣西、貴州、雲南。

用途：觀賞。

硬葉兜蘭 Stiff-leaved Paphiopedilum

†***Paphiopedilum micranthum** Tang & Wang

習性：地生或半附生草本。花期：4—5月。

產地：栽培。

分佈：廣西、貴州、雲南。越南。

用途：觀賞。

雪白兜蘭 Snow-white Paphiopedilum

†***Paphiopedilum niveum** (Reichb. f.) Stein

習性：地生草本。花期：7月。

產地：栽培。

分佈：馬來西亞。

用途：觀賞。

飄帶兜蘭 Parish's Paphiopedilum

†***Paphiopedilum parishii** (Reichb. f.) Stein

習性：地生草本。花期：6—8月。

產地：栽培。

分佈：雲南、泰國、緬甸。

用途：觀賞。

紫紋兜蘭 (兜蘭) Hong Kong Lady's Slipper
Orchid

Paphiopedilum purpuratum (Lindl.) Stein

習性：地生草本。花期：11—5月。

產地：香港島、大帽山、大嶼山。生於林下腐殖土豐富的多石之地。

分佈：廣東、廣西、雲南。越南。

用途：觀賞。

紫毛兜蘭 Shaggy Paphiopedilum

†***Paphiopedilum villosum** (Lindl.) Stein

習性：地生草本。花期：1—3月。

產地：栽培。

分佈：雲南、緬甸、老撾、越南、泰國。

用途：觀賞。

白蝶蘭屬 Pecteilis Rafin.

白蝶蘭 (鵝毛白蝶花) Common Pecteilis

Pecteilis susannae (L.) Rafin.

習性：地生草本。花期：6—7月。

產地：香港島、大帽山。生於林下、溝邊或草坡。

分佈：海南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、福建、江西、浙江。尼泊爾、緬甸、印度、馬來西亞、印度尼西亞。

用途：觀賞。

肥根蘭屬 Pelexia Poir. Ex Lindl.

肥根蘭

Pelexia oblique (J. J. Sm.) Garay (*Manniella hongkongensis* S. Y. Hu & Barretto)

習性：地生草本。花期：9月。

產地：新界。生於山谷。

分佈：印度尼西亞。

闊蕊蘭屬 Peristylus Blume

長鬚闊蕊蘭 Long Tentacle Orchid

Peristylus calcaratus (Rolfe) S. Y. Hu

習性：地生草本。花期：8月。

產地：青衣、東涌。生於山坡草地或林下。

分佈：廣東、廣西、雲南、江蘇、浙江、江西、臺灣、湖南。中南半島各國。

稠密闊蕊蘭 Dense Peristylus

Peristylus densus (Lindl.) Santap. & Kapad.
[*Peristylus stenostachyus* (Lindl. ex Benth.) Kraenzl.]

習性：地生草本。花期：6月。

產地：扯旗山、大嶼山。生於山坡林下或草叢中。

分佈：廣東、廣西、貴州、雲南、江西、福建、浙江。印度、緬甸、泰國、越南、孟加拉。

闊蕊蘭 Green-flowered peristylus

Peristylus goodyeroides (D. Don) Lindl.

習性：地生草本。花期：6—8月。

產地：香港島、大嶼山。生於林下、灌叢或山坡草地上。

分佈：廣東、廣西、貴州、雲南、四川、湖北、湖南、浙江、江西、臺灣。不丹、尼泊爾、印度、緬甸、老撾、越南、泰國、柬埔寨、馬來西亞、菲律賓、印度尼西亞、新幾內亞。

撕唇闊蕊蘭

Peristylus lacertiferus (Lindl.) J. J. Sm.
[*Peristylus spiranthes* (Schauer) S. Y. Hu; *Peristylus spiranthes* var. *taipoensis* S. Y. Hu]

習性：地生草本。花期：7—8月。

產地：香港各地。生於林下、灌叢或山坡草地上。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、四川福建。

觸鬚闊蕊蘭 Club-spurred Tentacle Orchid

Peristylus tentaculatus (Lindl.) J.J.Sm.

習性：地生草本。花期：9—1月。

產地：香港各地。生於山坡濕地或荒地。

分佈：海南、廣東、廣西、浙江、福建。越南、泰國、柬埔寨。

用途：藥用。

鶴頂蘭屬 Phaius Lour.

鶴頂蘭 Common Phaius

Phaius tankervilleae (Banks ex L'Herit.) Blume (*Phaius tandervilleae* f. *veronica* S. Y. Hu & Barretto)

習性：地生草本。花期：2—9月。

產地：大帽山、西貢。

分佈：海南、廣東、廣西、雲南、西藏、福建、臺灣。亞洲熱帶亞熱帶地區及大洋洲。

用途：觀賞。

蝴蝶蘭屬 Phalaenopsis Blume

蝴蝶蘭 Moth Orchid

***Phalaenopsis amabilis** (L.) Blume

習性：附生草本。花期：4—5月。

產地：栽培。

分佈：菲律賓、臺灣。

用途：觀賞。

石仙桃屬 Pholidota Lindl. ex Hook.

細葉石仙桃 Slender-leaf Pholidota

Pholidota cantonensis Rolfe

習性：附生草本。花期：5—6月。

產地：大埔、大嶼山。

分佈：廣東、廣西、江西、福建、浙江、臺灣。

石仙桃 Chinese Pholidota

Pholidota chinensis Lindl.

習性：附生草本。花期：9—次年1月。

產地：香港各地。

分佈：海南、廣東、廣西、貴州、雲南、西藏、福建、浙江。

用途：觀賞、藥用。

舌唇蘭屬 *Platanthera* L. C. Rich.

尾瓣舌唇蘭 Chinese *Platanthera*

Platanthera mandarinorum Reichb. f.

習性：地生草本。花期：3—7月。

產地：大帽山。

分佈：華南、華東、西南及河南、山東等省區。日本、朝鮮。

小舌唇蘭 Lesser *Platanthera*

Platanthera minor Reichb. f. [*Platanthera angustata* auct. non (Blume) Lindl.:
Check List HK Pl. 1993.]

習性：地生草本。花期：4—6月。

產地：大帽山、城門、馬鞍山、大東山。

分佈：東北、長江流域各省區、臺灣、福建、廣東、廣西、海南。朝鮮、日本。

筒距舌唇蘭

Platanthera tipuloides (L. f.) Lindl.

習性：地生草本。花期：5—7月。

產地：地點不詳。生於林下。

分佈：湖南、江西、福建、浙江、安徽。朝鮮、日本、俄羅斯。

寄樹蘭屬 *Robiquetia* Gaudich.

小葉寄樹蘭

Robiquetia succisa (Lindl.) Seidenf. & Garay

習性：附生草本。花期：6-9月。

產地：新界。

分佈：廣東、廣西、雲南、福建。

苞舌蘭屬 *Spathoglottis* Blume

苞舌蘭 Buttercup Orchid

Spathoglottis pubescens Lindl. (*Spathoglottis fortunii* Lindl.)

習性：地生草本。花期：7—9月。

產地：香港各地。

分佈：華南、西南和湖南等省區。印度、緬甸、泰國、中南半島。

用途：觀賞。

綬草屬 *Spiranthes* L. C. Rich.

香港綬草 Hong Kong *Spiranthes*

Spiranthes hongkongensis S. Y. Hu & Barretto

習性：地生草本。花期：3—4月。

產地：慈雲山、城門、西貢、大嶼山、南丫島。

分佈：廣東、貴州、雲南、浙江、福建、山東。日本、澳大利亞。

綬草 Ladies Tresses

Spiranthes sinensis (Pers.) Ames

習性：地生草本。花期：2—6月。

產地：香港各地。生於田畦和草地中。

分佈：全國各省區。東亞、南亞至東南亞以及澳大利亞。

帶唇蘭屬 *Tainia* Blume

帶唇蘭 Dunn *Tainia*

Tainia dunnii Rolfe

習性：地生草本。花期：3-4月。

產地：大東山、鳳凰山。

分佈：廣東、廣西、貴州、湖南、江西、福建、浙江、臺灣。

香港帶唇蘭（香港安蘭） Purple Bulb Orchid

Tainia hongkongensis (Rolfe) Tang & Wang
[*Ania hongkongensis* (Rolfe) Tang & Wang]

習性：地生草本。花期：3—4月。

產地：黃龍坑、淺水灣、馬鞍山。生於林下。

分佈：廣東、福建。

南方帶唇蘭

Tainia ruybarrettoi (S. Y. Hu & Barretto)

Z. H. Tsi (*Ania ruybarrettoi* S. Y. Hu & Barretto)

習性：地生草本。花期：3月。

產地：西貢、八仙嶺、沙頭角。常生於竹林下。

分佈：廣西。

矮柱蘭屬 *Thelasis* Blume

矮柱蘭 Dwarf *Thelasis*

Thelasis pygmaea (Griff.) Blume (*Thelasis hongkongensis* Rolfe)

習性：附生草本。花期：4-10 月。

產地：鶴咀。

分佈：海南、廣東、雲南、臺灣。東亞至東南亞、菲律賓。

白點蘭屬 *Thrixspermum* Lour.

白點蘭 Common *Thrixspermum*

Thrixspermum centipeda Lour.

習性：附生草本。花期：8—9 月。

產地：青山。

分佈：海南、廣東、雲南。錫金、印度、緬甸、中南半島、印度尼西亞。

竹莖蘭屬 *Tropidia* Lindl.

仙茅竹莖蘭 Bamboo-stemmed Orchid

Tropidia curculigoides Lindl.

習性：地生草本。花期：7—8 月。

產地：香港島。

分佈：海南、廣西、雲南、西藏、臺灣。印度、錫金、緬甸、越南、柬埔寨、泰國、馬來西亞、印度尼西亞。

萬帶蘭屬 *Vanda* Jones

大花萬帶蘭 Large-flowered *Vanda*

****Vanda coerulea*** Griff. ex Lindl.

習性：附生草本。花期：10—11 月。

產地：栽培。

分佈：貴州、雲南。印度、緬甸、泰國。

用途：觀賞。

二尾蘭屬 *Vrydagzynea* Blume

二尾蘭 Bare *Vrydagzynea*

Vrydagzynea nuda Blume

習性：地生草本。

產地：香港島、大嶼山。生於林下陰濕處。

分佈：海南、臺灣。印度尼西亞。

線柱蘭屬 *Zeuxine* Lindl.

纖細線柱蘭 Slender *Zeuxine*

Zeuxine gracilis (Breda) Blume

習性：地生草本。花期：10 月。

產地：扯旗山、柏架山、馬鞍山、大帽山。

分佈：海南、雲南。

白花線柱蘭 White Flower *Zeuxine*

Zeuxine parviflora (Ridl.) Seidenf. (*Zeuxine leucochila* Schltr.)

習性：地生草本。花期：2-4 月。

產地：西貢。生於林下陰濕處。

分佈：海南、雲南、臺灣。泰國、馬來西亞、緬甸、老撾、柬埔寨、越南、菲律賓、日本。

線柱蘭 Common *Zeuxine*

Zeuxine strateumatica (L.) Schltr.

習性：地生草本。花期：1—4 月。

產地：扯旗山、馬鞍山、深涌、粉嶺。

分佈：廣東、廣西、雲南、四川、湖北、福建、臺灣。日本熱帶亞洲。

